



# الرياضيات

الصف الثامن - كتاب الطالب

الفصل الدراسي الثاني

8

فريق التأليف

د. عمر محمد أبوغليون (رئيساً)

نبيل محمد حسان      نور محمد عمايرة      إبراهيم أحمد عمايرة      هبة ماهر التميمي

الناشر: المركز الوطني لتطوير المناهج

يسرك المركز الوطني لتطوير المناهج استقبال آرائكم وملحوظاتكم على هذا الكتاب عن طريق العنوان الآتي:

٠٦-٥٣٧٦٢٦٢ / ٢٣٧      ٠٦-٥٣٧٦٢٦٦      P.O.Box: 2088 Amman 11941


[f @nccdjor](https://www.facebook.com/nccdjor)      [@ feedback@nccd.gov.jo](mailto:feedback@nccd.gov.jo)      [g www.nccd.gov.jo](http://www.nccd.gov.jo)

قررت وزارة التربية والتعليم تدريس هذا الكتاب في مدارس المملكة الأردنية الهاشمية جميعها، بناءً على قرار المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج في جلسته رقم (5/2021)، تاريخ 7/12/2021 م، وقرار مجلس التربية والتعليم رقم (159/2021) تاريخ 21/12/2021 م بدءاً من العام الدراسي 2021 / 2022 م.

© HarperCollins Publishers Limited 2021.

- Prepared Originally in English for the National Center for Curriculum Development. Amman - Jordan  
- Translated to Arabic, adapted, customised and published by the National Center for Curriculum Development. Amman - Jordan

**ISBN: 978 - 9923 - 41 - 380 - 7**



375.001

الأردن. المركز الوطني لتطوير المناهج

الرياضيات الصف الثامن: كتاب الطالب (الفصل الدراسي الثاني) / المركز الوطني لتطوير المناهج. - ط 2؛ مزيدة

ومنقحة - عمان: المركز، 2022

(173) ص.

ر.إ.: 2022/4/2076

الوصفات: /تطوير المناهج/ /المقررات الدراسية/ /مستويات التعليم/ /المناهج/

يتحمل المؤلف كامل المسئولية القانونية عن محتوى مصنفه، ولا يعبر هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة الوطنية.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, sorted in retrieval system, or transmitted in any form by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the publisher or a license permitting restricted copying in the United Kingdom issued by the Copyright Licensing Agency Ltd, Barnard's Inn, 86 Fetter Lane, London, EC4A 1EN.

British Library Cataloguing -in- Publication Data

A catalogue record for this publication is available from the Library.

م 2025 – 2022 / 1442 هـ

الطبعة الأولى (التجريبية)

م 2025 – 2022

أعيدت طباعته

## المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد؛ فانطلاقاً من إيمان المملكة الأردنية الهاشمية الراسخ بأهمية تنمية قدرات الإنسان الأردني، وتسليحه بالعلم والمعرفة؛ سعى المركز الوطني لتطوير المناهج بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم إلى تحديث المناهج الدراسية وتطويرها، لتكون معيناً على الارتقاء بمستوى الطلبة المعرفي، ومجاراة الأقران في الدول المتقدمة. ولما كانت الرياضيات إحدى أهم المواد الدراسية التي تنمو لدى الطلبة مهارات التفكير وحل المشكلات، فقد أُولى المركز هذا المبحث عنايةً كبيرةً، وحرص على إعداد كتب الرياضيات وفق أفضل الطرائق المُتبعة عالمياً على أيدي خبرات أردنية؛ لضمان انسجامها مع القيم الوطنية الراسخة، وتلبية لاحتياجات طلبتنا.

روعي في إعداد كتب الرياضيات تقديم المحتوى بصورة سلسة، ضمن سياقات حياتية شائقة، تزيد رغبة الطلبة في التعلم، ووظفت فيها التكنولوجيا لتسهيل في جعل الطلبة أكثر تفاعلاً مع المفاهيم المقدمة لهم. كما يعني بإبراز خطة حل المسألة، فأفرد لها دروساً مستقلة تتبع للطلبة التدريب على أنواع مختلفة من هذه الخطط وتطبيقاتها في مسائل متنوعة. لقد احتوت الكتب على مشروع لكل وحدة؛ لتعزيز تعلم الطلبة المفاهيم والمهارات الواردة فيها وإثرائها. ولأنَّ التدريب المكثف على حل المسائل يُعدُّ إحدى أهم طرائق ترسیخ المفاهيم الرياضية وزيادة الطلاقة الإجرائية لدى الطلبة؛ فقد أُعدَّ كتاب التمارين على نحو يُقدِّم للطلبة ورقة عمل في كل درس، تُحلُّ بوصفها واجباً منزلياً، أو داخل الغرفة الصفيَّة إن توافر الوقت الكافي. ولأنَّنا ندرك جيداً حرص الكوادر التعليمية الأردنية على تقديم أفضل ما لديها للطلبة؛ فقد جاء كتاب التمارين أداةً مساعدةً توفر عليها جهد إعداد أوراق العمل وطباعتها.

من المعلوم أنَّ الأرقام العربية تُستخدم في معظم مصادر تعليم الرياضيات العالمية، ولا سيما على شبكة الإنترنت، التي أصبحت أداةً تعليميةً مهمَّةً؛ لما تزخر به من صفحات تُقدِّم محتوى تعليمياً تفاعلياً ذا فائدة كبيرة. وحرصاً منا على ألا يفوت طلبتنا أي فرصة، فقد استعملنا في هذا الكتاب الأرقام العربية؛ لجسر الهُوَّة بين طلبنا والمحتوى الرقمي العلمي، الذي ينمو بتسارع في عالم يخطو نحو التعليم الرقمي بوتيرة متسارعة.

ونحن إذ نقدم هذا الكتاب، نأمل أن ينال إعجاب أبنائنا الطلبة والكوادر التعليمية الأردنية، ويجعل تعليم الرياضيات وتعلُّمها أكثر متعةً وسهولةً، ونعد بأن نستمر في تحسين هذا الكتاب في ضوء ما يصلنا من ملاحظات.

<b>الوحدة 6</b> أنظمة المعادلات الخطية ..... 38	<b>الوحدة 5</b> المتباينات الخطية ..... 6
مشروع الوحدة: الأشجار سريعة النمو ..... 39	مشروع الوحدة: درجات الغليان والانصهار ..... 7
<b>الدرس 1</b> حل نظام من معادلتين خطيتين بيانياً ..... 40	<b>الدرس 1</b> كتابة المتباينات وتمثيلها ..... 8
معلم برمجية جيو جيبرا: تمثيل نظام من معادلتين خطيتين بيانياً ..... 47	<b>الدرس 2</b> حل المتباينات بالجمع والطرح ..... 15
<b>الدرس 2</b> حل نظام من معادلتين خطيتين بالتعويض ..... 48	<b>الدرس 3</b> حل المتباينات بالضرب والقسمة ..... 22
<b>الدرس 3</b> حل نظام من معادلتين خطيتين بالحذف ..... 56	<b>الدرس 4</b> حل المتباينات متعددة الخطوات ..... 29
اختبار نهاية الوحدة ..... 66	اختبار نهاية الوحدة ..... 36



# قائمة المحتويات

<b>الوحدة 8</b> الأشكال ثلاثية الأبعاد ..... 114	<b>الوحدة 7</b> الأشكال ثنائية الأبعاد ..... 68
مشروع الوحدة: الأشكال ثلاثية الأبعاد ..... 115	مشروع الوحدة: المنساخ ..... 69
<b>الدرس 1</b> رسم الأشكال ثلاثية الأبعاد ..... 116	<b>الدرس 1</b> إثبات توازي المستقيمات وتعامدها ..... 70
<b>الدرس 2</b> المقاطع والمجسمات الدورانية ..... 124	<b>الدرس 2</b> متوازي الأضلاع ..... 77
<b>الدرس 3</b> حجم الكرة ومساحة سطحها ..... 132	<b>الدرس 3</b> تمييز متوازي الأضلاع ..... 84
اختبار نهاية الوحدة ..... 140	<b>الدرس 4</b> حالات خاصة من متوازي الأضلاع ..... 91
<b>الوحدة 9</b> الإحصاء والاحتمالات ..... 142	<b>الدرس 5</b> تشابه المثلثات ..... 99
مشروع الوحدة: جمع البيانات، وتحليلها ..... 143	<b>الدرس 6</b> التمدد ..... 106
<b>الدرس 1</b> الرباعيات ..... 144	اختبار نهاية الوحدة ..... 112
<b>الدرس 2</b> اختيار التمثيل الأنسب ..... 154	
<b>الدرس 3</b> عد النواتج ..... 161	
<b>الدرس 4</b> احتمال الحوادث المركبة ..... 166	
اختبار نهاية الوحدة ..... 172	

# الوحدة 5

## المتباينات الخطية

### ما أهمية هذه الوحدة؟

للمتباينات أهمية كبيرة في حياتنا اليومية، ويمكن عن طريقها التعبير عن الحد الأقصى والأدنى لكتير من المواقف، فمثلاً تحدد إدارة السير الحد الأقصى للسرعة المسموح بها على الطرق؛ للحد من الحوادث المرورية، وتقليل الأثر البيئي لحركة المرور من ضوضاء السيارات والانبعاثات.



### سأتعلم في هذه الوحدة:

- تعرّف مفهوم المتباينة.
- حلّ متباينات خطية بمتغير واحد بخطوة واحدة، وتمثيل حلّها على خط الأعداد.
- حلّ متباينة خطية بمتغير واحد بأكثر من خطوة، وتمثيل حلّها على خط الأعداد.

### تعلّمت سابقاً:

- ✓ المقارنة بين الأعداد الحقيقية، وترتيب مجموعة منها تنازلياً أو تصاعدياً.
- ✓ تعين قيم على خط الأعداد، واستعماله في إجراء عمليات حسابية عليها.
- ✓ حلّ معادلات خطية بمتغير واحد.

# مشروع الوحدة: درجات الغليان والانصهار



أضيف عموداً إلى الجدول؛ لأكتب فيه متابينات تمثل درجات الحرارة التي تكون عندها المادة سائلة.

4

استعمل المعادلة  $C = \frac{5(F - 32)}{9}$  لكتابه المتابينات التي في الجدول باستعمال درجات الحرارة الفهرنهايتية، حيث  $C$  تمثل درجة الحرارة بالسليسيوس و  $F$  تمثل درجة الحرارة بالفهرنهايت، ثم أحل هذه المتابينات وأمثلها على خط الأعداد.

5

أبحث في شبكة الإنترنت عن درجات غليان كل من المواد التي اخترتها سابقاً، ثم أضيف عموداً إلى الجدول وأكتب فيه درجات الغليان بالسليسيوس.

6

استعمل المعادلة الواردة في النقطة 5 لكتابه متابينات لدرجات الغليان بالفهرنهايت، ثم أحلها وأمثل حلها على خط الأعداد.

7

أعد عرضاً تقديميًّا يتضمن المواد التي اخترته، وصورة لكل منها، والجدول الذي أعددته.

8

أقدم أمام طلبة صفي العرض التقديمي الذي أعددته، مَعَ توضيح الفرق بين درجات الانصهار والغليان.

## عرض النتائج:

أستعد ومجموعي لتنفيذ مشروعنا الخاص الذي سننظف فيه المتابينات؛ لنجد درجات الحرارة التي تكون عندها المواد صلبة أو سائلة أو في حالة الغليان.

## خطوات تنفيذ المشروع:

- أبحث في شبكة الإنترنت عن درجات انصهار مجموعة من المواد ضمن الشروط الآتية:
  - مادة درجة انصهارها سالبة.
  - مادة درجتا انصهارها أكثر من  $100^{\circ}\text{C}$  وأقل من  $2000^{\circ}\text{C}$ .
  - مادة درجتا انصهارها أكثر من  $2000^{\circ}\text{C}$ .



أنشئ جدولًا أكتب فيه أسماء المواد ودرجات انصهار كل منها بالسليسيوس.

اسم المادة	درجة الانصهار $^{\circ}\text{C}$

- أضيف عموداً إلى الجدول؛ لأكتب فيه متابينات تمثل درجات الحرارة التي تكون عندها المادة صلبة.

## أستكشف



ترصد كاميرا سرعة السيارات في أحد الشوارع، ومن تزيد سرعته على  $90 \text{ km/h}$  يعاقب بمخالفة مرورية، ما الجملة الرياضية التي تعبر عن الحد الأقصى للسرعة المسموح بها في هذا الشارع؟

## فكرة الدرس

أتعرفُ المتباينة، وأمثلُها على خط الأعداد.

## المصطلحات

المتباينة، حل المتباينة

**المتباينة** (inequality) جملة رياضية تقارن بين مقدارين، وتشمل أحد الرموز  $<$ ,  $>$ ,  $\leq$ ,  $\geq$

رموز المتباينات				
الرمز	$<$	$>$	$\leq$	$\geq$
بالكلمات	<ul style="list-style-type: none"> <li>أصغر من</li> <li>يقل عن</li> <li>أقل من</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>أكبر من</li> <li>يزيد على</li> <li>أكبر من</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>أصغر من أو يساوي</li> <li>أقل من أو يساوي</li> <li>على الأقل</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>أكبر من أو يساوي</li> <li>أكبر من أو يساوي</li> <li>على الأقل</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>لا يزيد على</li> <li>لا يقل عن</li> </ul>

## مثال 1

أكتب متباينة تمثل كل جملة مما يأتي:

2 عدد مطروح منه 4 أكبر من 120

المتغير: ليكن  $h$  يمثل العدد.

المتباينة:  $h - 4 > 120$

1 عدد أصغر من 15

المتغير: ليكن  $a$  يمثل العدد.

المتباينة:  $a < 15$

4 عدد طلبة صفي لا يقل عن 20

المتغير: ليكن  $n$  يمثل عدد طلبة صفي.

المتباينة:  $n \geq 20$

3 كتلتني أقل من أو تساوي 48 kg

المتغير: ليكن  $w$  يمثل كتلتني.

المتباينة:  $w \leq 48$

## الوحدة 5

أتحقق من فهمي: 

6 عدد مضافٌ إليه 10 أقلٌ من 36 –

5 عدد أكبرٌ من 100

8 عدد طلبة مدرستي لا يقلُّ عن 200 طالبٍ.

7 كتلة حقيتي أكبرٌ من أو تساوي 10 kg

يمكنُ استعمال المتبادرات للتعبير عن كثيرٍ من المواقف الحياتية.

مثال 2: من الحياة 



أكتب المبادرة التي تمثل كل جملة مما يأتي:

1 انتخابٌ: يحقُّ للمواطن الأردني التصويت في الانتخابات النيابية الأردنية إذا كان عمرُه لا يقلُّ عن 18 عاماً.

بالكلمات  عمرُ المواطن لا يقلُّ عن 18

المتغير  ليكن  $x$  يمثل عمرَ المواطن.

المبادرة   $x \geq 18$



طيرانٌ: يُسمحُ لراكب الدرجة السياحية على متن الخطوط الجوية الملكية الأردنية في الرحلة بين عمان وتونس حمل حقيبة واحدة لا تزيد كتلتها على 23 kg

بالكلمات  كتلة الحقيبة لا تزيد على 23

المتغير  ليكن  $y$  يمثل كتلة الحقيبة.

المبادرة   $y \leq 23$

## تحقق من فهمي:

**3** رياضة: يجب أن يقل طول لاعب كرة السلة المحترف عن 170 cm.

**4** سيارات: يتسع خزان الوقود في السيارات الصغيرة L 60 على الأكثر.

**حل المباينة** (solution of an inequality) هو أي عدد يجعل المباينة صحيحة؛ لذا يمكن أن يكون للمباينة أكثر من حل، ويمكنني التحقق من أن قيمة ما تمثل أحد حلول المباينة بتعويضها عن المتغير الذي تحتويه المباينة.

### مثال 3

أبين ما إذا كانت القيمة المعطاة تمثل أحد حلول المباينة أم لا في كل مما يأتي:

**1**  $2x - 1 > 5, x = 4$

$$2x - 1 > 5$$

أكتب المباينة

$$2(4) - 1 > 5$$

أعوض عن  $x$  بـ 4

$$7 > 5 \quad \checkmark$$

أبسط

بما أن  $2x - 1 > 5$  صحيحة عند  $x = 4$ ، فإن العدد 4 يمثل أحد حلول المباينة.

**2**  $6 - y < 6, y = -2$

$$6 - y < 6$$

أكتب المباينة

$$6 - (-2) < 6$$

أعوض عن  $y$  بـ -2

$$8 < 6 \quad \times$$

أبسط

بما أن  $6 - y < 6$  ليست صحيحة عند  $y = -2$ ، فإن العدد -2 لا يمثل حلًا للمباينة.

**3**  $12 \leq 9 - 3a, a = -1$

$$12 \leq 9 - 3a$$

أكتب المباينة

$$12 \leq 9 - 3(-1)$$

أعوض عن  $a$  بـ -1

$$12 \leq 12 \quad \checkmark$$

أبسط

بما أن  $12 \leq 9 - 3a$  صحيحة عند  $a = -1$ ، فإن العدد -1 يمثل أحد حلول المباينة.

## الوحدة 5

أتحقق من فهمي:

4  $2s + 5 > 10, s = 3$

5  $7 < 1 - 2d, d = 4$

6  $10 \geq 2 - 8k, k = -1$

يصعب أحياناً كتابة القييم جميعها التي تجعل المتباينة صحيحة؛ لذا يمكن تمثيل تلك القييم على خط الأعداد، ويكون ذلك بوضع دائرة مفتوحة (○) أو مغلقة (●) للدلالة على بداية القييم، ثم وضع سهم إلى اليمين أو اليسار؛ لإظهار اتجاه القييم.


تُستعمل دائرة المفتوحة إذا كان رمز المتباينة  $>$  أو  $<$ ، وهذا يعني أن نقطة بداية القييم ليست ضمن حلول المتباينة، أما دائرة المغلقة فستُستعمل إذا كان رمز المتباينة  $\leq$  أو  $\geq$ ، وهذا يعني أن نقطة بداية القييم ضمن حلول المتباينة.

### مثال 4

أمثل كل متباينة مما يأتي على خط الأعداد:

1  $x < 3$


الدائرة المفتوحة تعني أن العدد 3 ليس ضمن حلول المتباينة.



أضع دائرة مفتوحة على العدد 3، ثم أرسم سهماً باتجاه اليسار.

2  $y \geq 2$

الدائرة المغلقة تعني أن العدد 2 ضمن حلول المتباينة.



أضع دائرة مغلقة على العدد 2، ثم أرسم سهماً باتجاه اليمين.

3  $a > 1$

4  $z \geq -4$


5  $n < -3$

أتحقق من فهمي:


تعلّمْتُ في المثالِ السابق تمثيلَ متباينةً على خطّ الأعداد، ويمكنني أيضًا تحديدُ المتباينةِ مِنْ تمثيلها على خطّ الأعداد.

## مثال 5

أكتبُ المتباينةَ الممثلةً على خطّ الأعداد في كُلّ ممّا يأتي:





توجد دائرةً مفتوحةً عند العدد 1 واتجاه السهم إلى اليمين، وهذا يدلّ على أنَّ حلولَ المتباينةِ هي الأعدادُ الأكبرُ مِنْ 1، وباستعمالِ المتغير  $x$  فإنَّ المتباينةَ هي:  $x > 1$



توجد دائرةً مغلقةً عند العدد 4 واتجاه السهم إلى اليسار، وهذا يدلّ على أنَّ حلولَ المتباينةِ هي الأعدادُ الأقلُّ مِنْ 4 أو تساوي 4، وباستعمالِ المتغير  $k$  فإنَّ المتباينةَ هي:  $k \leq 4$

أتحققُ من فهمي: 



أكتبُ المتباينةَ التي تمثلُ كُلَّ جملةٍ ممّا يأتي:

**اتدرب — وأحل المسائل** 

1 عددٌ لا يقلُّ عنْ 6

2 عمرُ حنينَ 7 سنواتٍ على الأكثَرِ.

3 بعدَ 3 سنواتٍ مِنَ الآنَ يكونُ عمرُ ديمَةَ 12 سنةً على الأقلّ.

4 طولُ هاشمٍ أَقْلُّ مِنْ 150 cm

5 أقصى ارتفاعٍ للسياراتِ التي تمرُّ تحتَ هذا الجسرِ هو 5 m

6 عددٌ مطروحٌ مِنْهُ 5 أَكْبَرُ مِنْ -8

7 ثلاثةً أمثالٍ عددٍ مضاعفًا إِلَيْهِ 10 أَقْلُّ مِنْ أو يساوي 7

## الوحدة 5

**جامعت**: يحق للطالب التقدم للالتحاق بكلية الصيدلة إذا كان معدّله في امتحان الثانوية العامة لا يقل عن 80% أكتب المتباينة التي تمثل هذه الجملة.



**علوٌ**: يبدأ الماء بالتحول من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة عند درجة حرارة  $0^{\circ}\text{C}$  أو أقل. أكتب المتباينة التي تمثل هذه الجملة.

**صحّة**: يحتاج جسم الإنسان إلى 1600 سعرة حرارية يومياً على الأقل؛ ليقوم بوظائفه الحيوية. أكتب المتباينة التي تمثل هذه الجملة.

أبيّن ما إذا كانت القيمة المعطاة تمثل أحد حلول المتباينة أم لا في كل مما يأتي:

11)  $3x + 1 > 5, x = 2$

12)  $4z + 3 < -6, z = 0$

13)  $\frac{8-u}{u} \geq -9, u = -1$

14)  $18-n > 4, n = 12$

15)  $5r \leq 35, r = 7$

16)  $\frac{3m}{6} - 2 > 3, m = 8$

17)  $-5 \div s < -1, s = 10$

18)  $17 > 2y, y = 7$

أمثل كل متباينة مما يأتي على خط الأعداد:




19)  $y > -4$

20)  $h < 3$

21)  $n \leq 11$

22)  $t \geq 9$

أكتب المتباينة الممثلة على خط الأعداد في كل مما يأتي:



8

9

10

### معلومة

درجة التجمد هي الدرجة التي يصبح السائل عندها صلباً.

### أتذكر

اتبع أولويات العمليات الحسابية بعد تعويض القيمة المعطاة.

## معلومة



**فيزياء:** وفقاً لقوانين الفيزياء لا يمكن لأي جسم السير بسرعة أكبر من سرعة الضوء البالغة  $300000 \text{ km/s}$  تقريراً. أكتب متابينةً تعبّر عن سرعة الأجسام مقارنة بسرعة الضوء، وأمثلها على خط الأعداد.

26

يمكن للعين البشرية رؤية الضوء الذي يتراوح طوله الموجي بين 380 و700 نانومتر، ويسمى هذا النطاق الطيف المرئي، وللحيوانات طيف مرئي آخر.

أعود إلى فقرة (أستكشف) بدايةً الدرس، وأحل المسألة.

27

## مهارات التفكير العليا


**أكتشف الخطأ:** تقول سارة: إن أكبر عدد كلّي يحقق المتابينة  $3 - x < 4$  هو العدد  $-4$ .

أكتشف الخطأ في ما تقوله سارة، وأصحّحه.

28

**تبير:** أكتب متابينةً تعبّر عن الجملة الآتية، وأبّرر إجابتي:

"مساحة الشكل الآتي لا تزيد على  $18 \text{ cm}^2$ ."




## أتذكر

لحساب مساحة الشكل المركب، أقسّمه إلى أشكال بسيطة، كالمثلث والمرربع والمستطيل، ثم أحسب مساحة كلٍّ من هذه الأشكال وأجمعها.

**مسألة مفتوحة:** أكتب موقعاً حياتياً يمثل المتابينة الممثلة على خط الأعداد الآتي:

30



أكتب

كيف أحدد ما إذا كان العدد يمثل أحد حلول المتابينة أم لا؟

31



## استكشف

قرص صلب سعة تخزينه 180 جيجابايت، استعمل منها 112 جيجابايت. أكتب متباعدة وأحلها؛ لأجد الحد الأقصى لحجم البيانات التي يمكن تخزينها على ما تبقى من سعة القرص.

## فكرة الدرس

أحل متبادرات باستعمال خصائص الجمع أو الطرح، وأمثل الحل على خط الأعداد.

## المطلاث

متباعدة مكافئة

تعلمت سابقاً باستعمال خصائص المساواة لحل المعادلات، ويمكنني أيضاً حل المتبادرات باستعمال خصائص المتبادرات التي يمكن بتطبيقها إيجاد متباعدة مكافئة (equivalent inequality) للمتباعدة الأصلية. والمتباعدة المكافئة هي متبادرات لها الحل نفسه.

## خاصية الجمع للمتبادرات

## مفهوم أساسي


- **بالكلمات:** إذا أضيف العدد نفسه إلى كل من طرفي متباعدة صحيحة، فإن المتباعدة الناتجة تبقى صحيحة.
- **بالمعنى:** العبارتان الآتيتان صحيحتان لأي أعداد حقيقة  $a$  و  $b$  و  $c$  :

إذا كانت  $a > b$ ، فإن  $a + c > b + c$

إذا كانت  $a < b$ ، فإن  $a + c < b + c$

تبقى هذه الخاصية صحيحة في حالتي  $\leq$  و  $\geq$

يوضح المخطط أدناه طريقة واحدة لتخيل خاصية الجمع للمتبادرات عندما  $c > 0$



أحل كل متباعدة مما يأتي، وأمثل الحل على خط الأعداد، ثم أتحقق من صحته:

1  $x - 12 < -10$

$$x - 12 < -10$$

المتباعدة الأصلية


$$x - 12 + 12 < -10 + 12$$

أضيف 12 إلى طرفي المتباعدة

$$x < 2$$

أبسط

إذن، الحل هو  $x < 2$ ، وتمثيله على خط الأعداد على النحو الآتي:



أتحقق من صحة الحل:

لتحقق من صحة الحل، أعرض بدلاً من  $x$  في المتباعدة الأصلية عدداً أصغر من 2، مثلاً (-1).

$$x - 12 < -10$$

المتباعدة الأصلية

$$(-1) - 12 < -10$$

أعرض عن  $x$  بـ -1

$$-13 < -10 \quad \checkmark$$

أبسط

2  $7 \leq y - 4$

$$7 \leq y - 4$$

المتباعدة الأصلية


$$7 + 4 \leq y - 4 + 4$$

أجمع 4 إلى طرفي المتباعدة

$$11 \leq y$$

أبسط

إذن، الحل هو  $y \geq 11$  أو  $11 \geq y$ ، وتمثيله على خط الأعداد على النحو الآتي:



## الوحدة 5

أتحقق من صحة الحل :

لأتحقق من صحة الحل، أعرض بدلاً من  $y$  في المتباعدة الأصلية عدداً أكبر من 11، مثلاً (20).

$$7 \leq y - 4$$

المتباعدة الأصلية

$$7 \stackrel{?}{\leq} 20 - 4$$

أعرض عن  $y$  بـ 20

$$7 \leq 16 \quad \checkmark$$

أبسط

أتحقق من فهمي: 

3  $x - 4 < 1$

4  $y - 6 \geq -10$

تعلّمت في المثال السابق حل المتباعدة باستعمال خاصية الجمع للمتباعدة التي يمكن بها إيجاد متباعدة مكافئة للمتباعدة الأصلية، ويمكن أيضاً حل المتباعدة باستعمال خاصية الطرح للمتباعدة.

### خاصية الطرح للمتباعدة

### مفهوم أساسي



• **بالكلمات:** إذا طرح العدد نفسه من طرفٍ متباعدة صحيحة، فإن المتباعدة الناتجة تبقى صحيحة.


• **بالرموز:** العبارتان الآتيتان صحيحتان لأي أعداد حقيقة  $a$  و  $b$  و  $c$  :

إذا كانت  $a > b$ ، فإن  $a - c > b - c$

إذا كانت  $a < b$ ، فإن  $a - c < b - c$

تبقى هذه الخاصية صحيحة في حالتي  $\leq$  و  $\geq$

يوضح المخطط أدناه طريقة واحدة لتخيل خاصية الطرح للمتباعدة عندما  $c > 0$



أحل كل متباعدة مما يأتي، وأمثل الحل على خط الأعداد، ثم أتحقق من صحته:

1  $m + 5 \geq 10$

$$m + 5 \geq 10$$

المتباعدة الأصلية


$$m + 5 - 5 \geq 10 - 5$$

أطرح 5 من طرفي المتباعدة

$$m \geq 5$$

أبسط

إذن، الحل هو  $m \geq 5$ ، وتمثيله على خط الأعداد على النحو الآتي:



أتحقق من صحة الحل:

لأتحقق من صحة الحل، أعوض بدلاً من  $m$  في المتباعدة الأصلية عدداً أكبر من 5، مثلاً (10).

$$m + 5 \geq 10$$

المتباعدة الأصلية

$$10 + 5 \stackrel{?}{\geq} 10$$

أعوض عن  $m$  بـ 10

$$15 \geq 10 \quad \checkmark$$

أبسط

2  $a + \frac{1}{2} < 2$

$$a + \frac{1}{2} < 2$$

المتباعدة الأصلية

$$a + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} < 2 - \frac{1}{2}$$

أطرح  $\frac{1}{2}$  من طرفي المتباعدة


$$a < \frac{4}{2} - \frac{1}{2}$$

بتوحيد المقامات

$$a < \frac{3}{2}$$

أبسط

إذن، الحل هو  $a < \frac{3}{2}$ ، وتمثيله على خط الأعداد على النحو الآتي:



## الوحدة 5

أتحقق من صحة الحلّ:

لأتحقق من صحة الحلّ، أعوّض بدلًا من  $a$  في المتباينة الأصلية عدًّا أصغرً من  $\frac{3}{2}$  ، مثلًا (0).

$$a + \frac{1}{2} < 2$$

المتباينة الأصلية

$$0 + \frac{1}{2} < 2$$

أعوّض عن  $a$  بـ 0

$$\frac{1}{2} < 2 \quad \checkmark$$

أبسط

أتحقق من فهمي: 

3  $2 + x \geq 6$

4  $5 > y + 12$

يمكن استعمال المتباينات وحلّها في كثير من التطبيقات الحياتية.



### مثال 3: من الحياة



**كرة قدم:** لعب أحد نوادي كرة القدم ثلاث مبارياتٍ في ثلاثة ملاعب مختلفة، وبجمهور يزيد على 25000 شخصٍ. إذا كان عدد الجمهور في الملعب الأول 9500 شخصٍ، وفي الملعب الثاني 7000 شخصٍ. أكتب متباينةً وأحلّها؛ لأجد عدد الجمهور في الملعب الثالث.

عدد الجمهور في الملعب الأول وعدد الجمهور في الملعب الثاني 25000  
وعدد الجمهور في الملعب الثالث يزيد على

بالكلمات

ليكن  $x$  يمثل عدد الجمهور في الملعب الثالث.

المتغير

$$9500 + 7000 + x > 25000$$

المتباينة

$$9500 + 7000 + x > 25000$$

المتباينة الأصلية

$$16500 + x > 25000$$

أبسط

$$16500 - 16500 + x > 25000 - 16500$$

أطرح 16500 من طرفِ المتباينة

$$x > 8500$$

أبسط

إذن، عدد الجمهور في الملعب الثالث أكثر من 8500 شخصٍ.

## أتحقق من فهمي:



**سيارات**: تريد ملک شراء سيارة لا يقل ثمنها عن 15000 JD، وقد وفرت 13500 JD. أكتب متباينة وأحلها، لأجد المبلغ المتبقى عليها لشراء السيارة.

## أتدرب وأحل المسائل

أحل كل متباينة مما يأتي، وأمثل الحل على خط الأعداد، ثم أتحقق من صحته:

1  $v - 6 < -3$

2  $y - 11 \geq 0$

3  $h - 7.8 > -2.8$

4  $0 \leq n - 8$

5  $k - 4 \geq -5$

6  $s - \frac{2}{3} < 4$

أحل كل متباينة مما يأتي، وأمثل الحل على خط الأعداد، ثم أتحقق من صحته:

7  $y + 5 < 11$

8  $-1 \geq 3 + b$

9  $8.1 < y + 6.1$

10  $2.4 \leq 6.4 + n$

11  $-8 \leq 8 + x$

12  $1 \frac{1}{4} + w > 3$

أكتب المتباينة التي تمثل كل جملة مما يأتي، ثم أحلها:

عدد مضاد إليه 7 أكبر من 20

عدد مطروح منه 9 أكبر من -5

العدد 6 أقل من أو يساوي مجموع عدد 15

### معلومة

مندوب المبيعات هو الشخص الذي يروج منتجات الشركات، وعادةً يتقاضى أجراً نسبية من مبيعاته؛ لتشجيعه على زيادة المبيعات، فكلما زادت مبيعاته زادت أجراً.

**تسويق**: يخطط مندوب مبيعات إحدى شركات

تصنيع الأدوية لتسويق 200 عبوة دواء على


الأقل في أسبوع. إذا تمكّن من تسويق 30 عبوة

في اليوم الأول من الأسبوع، فاكتُب متباينة وأحلها؛ لأجد عدد العبوات التي يحتاج

المندوب إلى تسويقها في الأيام المتبقية من الأسبوع ليصل إلى هدفه.



## الوحدة 5



**هندسة:** إذا كان طول قاعدة المثلث المجاور أقل من ارتفاعه، فما القيم الممكنة للمتغير  $x$ ؟

17

**ميزانية شهرية:** يتلقى موظف راتبًا شهريًا مقداره 560 JD، يوفر منه 100 JD شهريًا، ويدفع 20 JD اشتراكًا شهريًا في أحد مراكز اللياقة البدنية ويصرف باقي الراتب. أكتب متباعدة وأحللها لأجد الحد الأعلى للمبلغ الذي يمكن للموظف صرفه شهريًا.

18



**زواحف:** يحتاج حيوان أبو بريص الفهد إلى أن تكون درجة الحرارة في منطقة تعرّضه للشمس على الأقل. إذا كانت درجة الحرارة الحالية  $24^{\circ}\text{C}$ ، فأكتب متباعدة وأحللها لأجد  $k$  يجب أن ترتفع درجة الحرارة لتلبي حاجة ذلك الحيوان.

19

أعود إلى فقرة (استكشف) بداية الدرس، وأحلل المسألة.

20

### مهارات التفكير العليا

**مسألة مفتوحة:** أكتب ثلاثة متباعدات مكافئة للمتباعدة  $-2 < y$

21

**اكتشف الخطأ:** أنظر إلى الحل الآتي، وأكتشف الخطأ الوارد فيه، وأصحّحه:

22



$$\begin{aligned}
 -10 + x &\geq -9 \\
 -10 + 10 + x &\geq -9 \\
 x &\geq -9
 \end{aligned}$$

كيف أستعمل خاصيّي الجمع والطرح للمتباعدات في حلّ متباعدة؟



23

### معلومة

السّحالي من ذوات الدم البارد، فهي تعتمد على درجة حرارة الشمس لرفع درجة حرارة جسدها الداخلية، ولتحفيز عملية التمثيل الغذائي الخاص بها.

## أستكشف



حصل كمال على علامتي 93 ، 90 في الاختبارين: الأول، والثاني، من مادة العلوم. أكتب متبادرات وأحلها؛ لأجد الحد الأدنى للعلامة التي يجب أن يحصل عليها في الاختبار الثالث ليكون معدل علاماته 90 على الأقل.



## فكرة الدرس

أحل متبادراتٍ باستعمال خصائص الضرب أو القسمة، وأمثل الحل على خط الأعداد.

تعلّمتُ سابقاً استعمال خصائص المساواة لحل المعادلات، ومنها خاصيّة الضرب، ويمكنني أيضاً حل المتبادرات باستعمال خاصيّة الضرب للمتبادرات.

## خاصيّة الضرب للمتبادرات

## مفهوم أساسيٌّ



## الضرب في عدد موجب

- بالكلمات:** إذا ضرب كل من طرفي متبادراتٍ صحيحةٍ في عدد موجب، فإنَّ المتبادرة الناتجة تبقى صحيحةً.
- بالرموز:** العبارتان الآتیتان صحيحتان لأي عددين حقيقيين  $a$  و  $b$  ولأي  $c > 0$ :
  - إذا كانت  $b > a$ ، فإن  $bc > ac$
  - إذا كانت  $b < a$ ، فإن  $bc < ac$

## الضرب في عدد سالب

- بالكلمات:** إذا ضرب كل من طرفي متبادراتٍ صحيحةٍ في عدد سالب، فإنَّه يتغيّر اتجاه رمز المتبادرة لجعل المتبادرة الناتجة صحيحةً أيضاً.
- بالرموز:** العبارتان الآتیتان صحيحتان لأي عددين حقيقيين  $a$  و  $b$  ولأي  $c < 0$ :
  - إذا كانت  $b > a$ ، فإن  $bc < ac$
  - إذا كانت  $b < a$ ، فإن  $bc > ac$

تبقى هذه الخاصيّة صحيحةً في حالتي  $\leq$  و  $\geq$

## الوحدة 5

### مثال 1

أحل كل متباينة مما يأتي، وأمثل الحل على خط الأعداد، ثم أتحقق من صحته:

$$1 \quad 1 \quad \frac{x}{8} > -5$$

$$\frac{x}{8} > -5$$

المتباينة الأصلية


$$8 \left( \frac{x}{8} \right) > 8 (-5)$$

أضرب طرفي المتباينة في 8

$$x > -40$$

أبسط

إذن، الحل هو  $-40 < x$ ، وتمثيله على خط الأعداد على النحو الآتي:



أتحقق من صحة الحل:

لأتحقق من صحة الحل، أعوّض بدلًا من  $x$  في المتباينة الأصلية عدًّا أكبر من 40، مثلاً (0).

$$\frac{x}{8} > -5$$

المتباينة الأصلية

$$\frac{0}{8} > -5$$

أعوّض عن  $x$  بـ 0

$$0 > -5 \quad \checkmark$$

أبسط

$$2 \quad 2 \quad \frac{y}{-3} \leq 4$$

$$\frac{y}{-3} \leq 4$$

المتباينة الأصلية


$$-3 \left( \frac{y}{-3} \right) \geq -3 (4)$$

أضرب طرفي المتباينة في -3، وأغيّر اتجاه رمز المتباينة

$$y \geq -12$$

أبسط

إذن، الحل هو  $-12 \geq x$ ، وتمثيله على خط الأعداد على النحو الآتي:



## أتحقق من صحة الحل :

لأتحقق من صحة الحل ، أuwض بدلاً من  $u$  في المتباينة الأصلية عدداً أكبر من 12 ، مثلاً (0).

$$\frac{y}{-3} \leq 4$$

المتباينة الأصلية

$$\frac{0}{-3} \stackrel{?}{\leq} 4$$

أuwض عن  $u$  بـ 0

$$0 \leq 4 \quad \checkmark$$

أبسط

## أتحقق من فهمي :

3  $\frac{y}{3} > -1$

4  $-\frac{4}{7}m < 8$

إن حل المتباينات باستعمال خاصية القسمة مشابه لحلها باستعمال خاصية الضرب ، حيث إنه عند قسمة طرفي المتباينة على عدد موجب يبقى اتجاه رمز المتباينة كما هو ، أمّا عند قسمة طرفي المتباينة على عدد سالب ، فإنه يتغيّر اتجاه رمز المتباينة.

### خاصية القسمة للمتباينات

### مفهوم أساسى



القسمة على عدد موجب

• **بالكلمات:** إذا قسم كل من طرفي متباينة صحيحة على عدد موجب ، فإن المتباينة الناتجة تبقى صحيحة.

• **بالرموز:** العبارتان الآتيتان صحيحتان لأي عددين حقيقيين  $a$  و  $b$  ولأي  $c > 0$  :

$$\frac{a}{c} > \frac{b}{c} \quad \text{إذا كانت } a > b, \text{ فإن }$$

$$\frac{a}{c} < \frac{b}{c} \quad \text{إذا كانت } a < b, \text{ فإن }$$

القسمة على عدد سالب

• **بالكلمات:** إذا قسم كل من طرفي متباينة صحيحة على عدد سالب ، فإنه يتغيّر اتجاه رمز المتباينة لجعل المتباينة الناتجة صحيحة أيضاً.

• **بالرموز:** العبارتان الآتيتان صحيحتان لأي عددين حقيقيين  $a$  و  $b$  ولأي  $c < 0$  :

$$\frac{a}{c} < \frac{b}{c} \quad \text{إذا كانت } a > b, \text{ فإن }$$

$$\frac{a}{c} > \frac{b}{c} \quad \text{إذا كانت } a < b, \text{ فإن }$$

تبقي هذه الخاصية صحيحة في حالتي  $\leq$  و  $\geq$

## الوحدة 5

### مثال 2

أحل كل متباعدةً مما يأتي، وأمثل الحل على خط الأعداد، ثم أتحقق من صحته:

1  $3m \leq -24$

$$3m \leq -24$$

المتباعدة الأصلية


$$\frac{3m}{3} \leq \frac{-24}{3}$$

أقسم طرفي المتباعدة على 3

$$m \leq -8$$

أبسط

إذن، الحل هو  $m \leq -8$ ، وتمثيله على خط الأعداد على النحو الآتي:



أتحقق من صحة الحل:

لأتحقق من صحة الحل، أعرض بدلاً من  $m$  في المتباعدة الأصلية عدداً أقل من  $-8$ ، مثلاً  $-10$ .

$$3m \leq -24$$

المتباعدة الأصلية

$$3(-10) \stackrel{?}{\leq} -24$$

أعرض عن  $m$

$$-30 \leq -24 \quad \checkmark$$

أبسط

2  $-7k > -56$

$$-7k > -56$$

المتباعدة الأصلية


$$\frac{-7k}{-7} < \frac{-56}{-7}$$

أقسم طرفي المتباعدة على 7، وأغير اتجاه رمز المتباعدة

$$k < 8$$

أبسط

إذن، الحل هو  $k < 8$ ، وتمثيله على خط الأعداد على النحو الآتي:



أتحقق من صحة الحل:

لتحقق من صحة الحل، أعرض بدلاً من  $k$  في المتباينة الأصلية عدداً أصغر من 8، مثلاً (1).

$$-7k > -56$$

المتباينة الأصلية

$$-7(1) > -56$$

أعرض عن  $k$  بـ 1


$$-7 > -56 \quad \checkmark$$

أبسط

أتحقق من فهمي:

3  $4d < 8$

4  $-2y \leq -14$



يمكن استعمال المتباينات في كثير من التطبيقات الحياتية.

سجاد: تملك سارة JD 100، وترغب بشراء سجاداً جديدةً تغطي أرضية غرفتها المبوبة أبعادها في الشكل المجاور. أكتب متباينةً وأحلّها لتمثل ثمن المتر المربع الواحد من السجاد الذي يمكن لسارة أن تشتريه.

بما أنَّ أرضية الغرفة مربعة الشكل، فإنه يمكن إيجاد مساحتها على النحو الآتي:

$$A = s^2 = 4^2 = 16$$

إذن، مساحة أرضية الغرفة  $16 \text{ m}^2$

وبما أنَّ سارة ترغب بشراء سجاداً تغطي أرضية الغرفة، فإنَّ مساحة هذه السجاد يجب أن تكون  $16 \text{ m}^2$  ولإيجاد ثمن السجاد أضرب مساحتها في ثمن المتر المربع الواحد من السجاد.

سعر السجاد أقل من أو يساوي JD 100

بالكلمات

ليكن  $x$  ثمن المتر المربع الواحد من السجاد، إذن سعر السجاد  $16x$

المتغير

$16x \leq 100$

المتباينة

## الوحدة 5

$$16x \leq 100$$

$$\frac{16x}{16} \leq \frac{100}{16}$$

$$x \leq 6.25$$

المتباعدة الأصلية

أقسم طرق المتباعدة على 16

أبسط

إذن، يمكن لسارة شراء سجادة ثمن المتر المربع الواحد منها على الأكثر JD 6.25.

### أتحقق من فهمي:

**عمل:** يتقاضى أحمـد 2.5 JD عن كل ساعة عمل، أكتب متباعدة وأحلـها، لإيجـاد عـدـ الساعـات الـتي يـجـب أـن يـعـمـلـ فيها حتى يـتقـاضـي 400 JD على الأـقـلـ.

### أتدرب وأحل المسائل

أحلـ كلـ متبـاعـةـ مـمـا يـأـتـيـ، وـأـمـثـلـ الـحـلـ عـلـىـ خـطـ الـأـعـدـادـ، ثـمـ أـتـحـقـقـ مـنـ صـحـيـةـ:

1  $\frac{u}{3} > -2$

2  $-4x \leq 12$

3  $\frac{1}{6}t < -\frac{1}{3}$

4  $-\frac{2}{5}w \geq 4$

5  $\frac{n}{5} \leq 0.8$

6  $-5 > \frac{c}{-4.5}$

أحلـ كلـ متبـاعـةـ مـمـا يـأـتـيـ، وـأـمـثـلـ الـحـلـ عـلـىـ خـطـ الـأـعـدـادـ، ثـمـ أـتـحـقـقـ مـنـ صـحـيـةـ:

7  $-13x \geq 26$

8  $-20 \leq 10n$

9  $5b > -15$

10  $144 < 12d$

11  $-3m > -33$

12  $-3.9c \leq 43.68$

أكتب متباعدة تمثل كل جملة ممـا يـأـتـيـ، ثـمـ أـحـلـهاـ:

14 عدد مقسوم على 4 لا يزيد على 8

خمسة أمثال عدد أقل من 45

13

15 عدد مقسوم على 2 لا يقل عن 5

ثلاثة أمثال عدد أكبر من 18

16

**مدارسُ:** لا يقلُّ ثلاثةً أخماسٍ عددُ الطالباتِ في مدرسةٍ فاطمةَ عنْ 165 طالبةً. أكتبْ متباعدةً وأحلُّها؛ لأجدَ أقلَّ عددٍ ممكِّنٍ لطالباتِ المدرسةِ.



17

**حديقةُ:** يريُّ طارقُ تبليطَ مِنطقةٍ مُسطيلةٍ

الشكلُ في حديقةِ منزلهِ مساحتُها  $15 \text{ m}^2$ ، ويملُكُ فقطُ 75 JD، أكتبْ متباعدةً وأحلُّها؛ لتمثِّلَ ثمنَ المترِ المربعِ الواحدِ مِنَ البلاطِ الَّذِي يمكِّنُ لطريقِ أَنْ يشتريُهُ.

**أفَكُّ**

بعضُ أنواعِ البلاطِ مربعُ الشكْلِ أوْ سداسيٌّ منتظمٌ، فهلْ يمكِّنُ أَنْ يكونَ البلاطُ خماسيًّا منتظمًا؟


18

أعوُدُ إلى فقرةِ (أستكشِّفُ ) بدايةً الدرسِ، وأحلُّ المسألةَ.

19

**مهاراتُ التفكيرِ العليا**

**مسألهٌ مفتوحةٌ:** أكتبْ متباعدةً يمكِّنُ حلُّها بالقسمةِ على عددٍ سالِبٍ وحلُّها  $\frac{1}{4} \geq x$



20

**تبريرُ:** أكتبْ متباعدةً وأحلُّها؛ لتمثِّلَ المحيطَ الممكِّنَ للدائرةِ المجاورة، وأبْرُرُ إجابتي.

21

يمكِّنُ إيجادُ محيطِ الدائرةِ باستعمالِ الصيغةِ:  $C = 2\pi r$ ، حيثُ  $r$  طولُ نصفِ قطرِ الدائرةِ.

22

**أكتشفُ الخطأً:** أنظرُ الحالَ الآتيَ، وأكتشفُ الخطأَ الواردَ فيهِ، ثُمَّ أصْحِحُهُ.

**X**

$$\begin{aligned}
 -6 &> \frac{2}{3}x \\
 \frac{3}{2}(-6) &< \frac{3}{2}\left(\frac{2}{3}x\right) \\
 -\frac{18}{2} &< x \\
 -9 &< x
 \end{aligned}$$

كيفَ أستعملُ خاصيَّتيِ الضربِ والقسمةِ للمتباعدةِ في حلِّ متباعدةٍ؟

**أكتبُ**

23

## ● أستكشف



تبلغ كتلة جهاد  $95 \text{ kg}$ ، ويريد إنقاذه إلى أقل من  $80 \text{ kg}$ ، ويمكنه أن يفقد ما معدله  $1.5 \text{ kg}$  من كتلته أسبوعياً باتباع حمية غذائية معينة. أكتب متباينة وأحلّها؛ لأجد عدد الأسابيع التي تلزم جهاداً حتى يصل إلى هدفه.

## فكرة الدرس

أحل متبايناتٍ باستعمالِ أكثر من خطوة، وأمثل الحل على خط الأعداد.

يمكن حل المتباينات التي تحتوي أكثر من عملية بنفس طريقة حل المتباينات التي تحتوي عملية واحدة، وذلك باستعمال خصائص المتباينات لتحويل المتباينة الأصلية إلى متباينة أبسط مكافئة لها مروراً بسلسلة من المتباينات المتكافئة.

## مثال 1

أحل كل متباينة مما يأتي، وأمثل الحل على خط الأعداد، ثم أتحقق من صحته:

1  $5y - 8 < 12$

$$5y - 8 < 12$$

المتباينة الأصلية

$$5y - 8 + 8 < 12 + 8$$

أجمع 8 لطريق المتباينة


$$\frac{5y}{5} < \frac{20}{5}$$

أقسم طريق المتباينة على 5

$$y < 4$$

أبسط

إذن، الحل هو  $y < 4$ ، وتمثيله على خط الأعداد على النحو الآتي:



أتحقق من صحة الحل:

لأتحقق من صحة الحل، أعرض بدلاً من  $y$  في المتباينة الأصلية عدداً أقل من 4، مثلاً (0).

$$5y - 8 < 12$$

المتباينة الأصلية

$$5(0) - 8 < 12$$

أعرض عن  $y$  بـ 0

$$-8 < 12$$

أبسط

## 2 $-7b + 19 < -16$

$$-7b + 19 < -16$$

المتباينة الأصلية

$$-7b + 19 - 19 < -16 - 19$$

أطرح 19 من طرفِ المتباينة


$$\frac{-7b}{-7} > \frac{-35}{-7}$$

أقسم طرفِ المتباينة على 7، وأغير الاتجاه رمزِ المتباينة

$$b > 5$$

أبسط

إذن، الحل هو  $b > 5$ ، وتمثيله على خط الأعداد على النحو الآتي:



أتحقق من صحة الحل

لأتحقق من صحة الحل، أعرض بدلاً من  $b$  في المتباينة الأصلية عدداً أكبر من 5، مثلاً (10).

$$-7b + 19 < -16$$

المتباينة الأصلية

$$-7(10) + 19 < -16$$

أعرض عن  $b$

$$-51 < -16 \quad \checkmark$$

أبسط

أتحقق من فهمي

## 3 $2x + 6 \leq 14$

## 4 $-3x + 7 > -5$

تحتوي بعض المتباينات متغيراتٍ في طرفيها، وفي هذه الحالة نحتاج أو لا إلى تجميع الحدود التي تحتوي متغيراتٍ في طرفٍ واحدٍ من المتباينة، والحدود الثابتة في الطرف الآخر، ثم حل المتباينة.

مثال 2

أحلُّ المتباينة:  $11 + 6x - 5 \geq 2x + 11$ ، وأمثلُ الحل على خط الأعداد، ثم أتحقق من صحته.

$$6x - 5 \geq 2x + 11$$

المتباينة الأصلية

$$6x - 5 + 5 \geq 2x + 11 + 5$$

أجمع 5 لطرفِ المتباينة

$$6x - 2x \geq 2x - 2x + 16$$

أطرح  $2x$  من طرفِ المتباينة

$$\frac{4x}{4} \geq \frac{16}{4}$$


أقسم طرفِ المتباينة على 4

$$x \geq 4$$

أبسط

## الوحدة 5

إذن، الحل هو  $x \geq 4$ ، وتمثيله على خط الأعداد على التحول الآتي:



أتحقق من صحة الحل:

لأتحقق من صحة الحل، أعرض بدلاً من  $x$  في المتباينة الأصلية عدداً أكبر من 4، مثلاً (5).

$$6x - 5 \geq 2x + 11$$

المتباينة الأصلية

$$6(5) - 5 \stackrel{?}{\geq} 2(5) + 11$$

أعرض عن  $x$  بـ

$$25 \geq 21 \quad \checkmark$$

أبسط

أتحقق من فهمي:

أحل المتباينة:  $2 - 7 > 3w + 2$ ، وأمثل الحل على خط الأعداد، ثم أتحقق من صحته.

عند حل مباينات تحتوي أقواساً، يمكنني استعمال خاصية التوزيع للتخلص من الأقواس أولاً، ثم أحل المتباينة.

### مثال 3

أحل المتباينة:  $3(t + 1) > 4t - 5$

$$3(t + 1) > 4t - 5$$

المتباينة الأصلية

$$3t + 3 > 4t - 5$$

خاصية التوزيع

$$3t + 3 - 3 > 4t - 5 - 3$$

أطرح 3 من طرف المتباينة

$$3t - 4t > 4t - 4t - 8$$

أطرح  $4t$  من طرف المتباينة

$$\frac{-t}{-1} < \frac{-8}{-1}$$

أقسم طرف المتباينة على -1، وأغير اتجاه رمز المتباينة

$$t < 8$$

أبسط

إذن، الحل هو  $t < 8$

أتحقق من فهمي:

أحل المتباينة:  $15 \leq 5 - 2(4m + 7)$

في بعض الأحيان، يعطي حل المتباعدة جملة رياضية صحيحة دائمًا، مثل  $8 > 5$ ، وفي هذه الحالة فإن الحل هو جميع الأعداد الحقيقة، وفي أحيان أخرى يعطي حل المتباعدة جملة رياضية غير صحيحة أبدًا مثل  $1 > 7$ ، وهذا يعني أنه لا يوجد حل للمتباينة.

#### مثال 4

أحل كلاً من المتباينات الآتية:

1  $14 + 6b > 2(5 + 3b)$

$$14 + 6b > 2(5 + 3b)$$

المتباعدة الأصلية

$$14 + 6b > 10 + 6b$$

خاصية التوزيع

$$14 + 6b - 6b > 10 + 6b - 6b$$

أطرح  $6b$  من طرفي المتباينة

$$14 > 10$$

أبسط

بما أن المتباعدة  $14 > 10$  صحيحة دائمًا مهما كانت قيمة  $b$ ، فإن حل المتباعدة  $(14 + 6b > 2(5 + 3b))$  هو جميع الأعداد الحقيقة.

2  $5 - 7m < m + 3 - 8m$

$$5 - 7m < m + 3 - 8m$$

المتباعدة الأصلية

$$5 - 7m < 3 - 7m$$

أبسط

$$5 - 7m + 7m < 3 - 7m + 7m$$

أجمع  $7m$  إلى طرفي المتباينة

$$5 < 3$$

أبسط

بما أن المتباعدة  $5 < 3$  غير صحيحة أبدًا مهما كانت قيمة  $m$ ، فإن المتباعدة  $(5 - 7m < m + 3 - 8m)$  ليس لها حل.

تحقق من فهمي: 

3  $12 - 8h \leq 2(6 - 4h)$

4  $3(2 + m) > 5m + 9 - 2m$

## الوحدة 5

يمكنُ استعمال المتبادراتِ التي يحتاج حلُّها إلى أكثرَ مِن خطوةٍ في حلّ مسائل حياتية.



### مثال 5: من الحياة



**متصاعد:** يبلغ الحد الأقصى لحمولةِ مصعدٍ في البناءِ التي يسكنُ فيها هشام 400 kg. إذا أراد هشام تحميلَ مجموعةٍ مِن الصناديق كتلةً الواحدِ منها 20 kg، فأكتب متبادراتَ وأحلُّها؛ لأجدَ الحد الأقصى لعددِ الصناديق التي يمكنُ لهشام تحميلُها في المصعدِ بأمانٍ، علمًا بأنَّ كتلةَ هشام 80 kg.

كتلة هشام وكتلة الصناديق أقلُّ مِن أو يُساوي 400

بالكلمات

ليكن  $x$  عدد الصناديق، إذن كتلة الصناديق  $20x$

المتغير

$80 + 20x \leq 400$

المتبادرات

$$80 + 20x \leq 400$$

المتبادرات الأصلية

$$80 - 80 + 20x \leq 400 - 80$$

أطرح 80 مِن طرفِ المتبادرات

$$\frac{20x}{20} \leq \frac{320}{20}$$

أقسم طرفِ المتبادرات على 20

$$x \leq 16$$

أبسط

إذن، يمكنُ لهشام تحميلُ 16 صندوقًا كحدٍ أقصى في المصعد.

### أتحققُ من فهمي:



**تسويق:** ترغبُ ريم في الإعلانِ عن متجراتِ شركتها على موقعِ إلكترونيٍّ مقابلَ JD 10 شهريًّا، إضافةً إلى 0.05 JD عَن كلِّ مَن يزورُ موقعَ الإعلانِ. أكتب متبادراتَ وأحلُّها؛ لأجدَ أقلَّ عددٍ مِنَ الزُّياراتِ الشهريَّة لموقعِ الإعلانِ ليكونَ المبلغ الشهريُّ الذي يتقاضاه الموقعُ الإلكترونيُّ مِن شركةِ ريم 100 JD على الأقلَّ.

أَحْلِلُ كُلَّ مُتَبَاينَةٍ مِمَّا يَأْتِي، وَأَمْثِلُ الْحَلَّ عَلَى خَطٍّ الْأَعْدَادِ، ثُمَّ أَتَحْقِقُ مِنْ صَحَّتِهِ:

1  $3x - 2 < 13$

2  $-6 > 3 - 3x$

3  $-5 \geq 4x + 7$

4  $5 - 2x < 17$

5  $7b - 4 \leq 10$

6  $-6g + 2 > 20$

أَحْلِلُ كُلَّا مِنَ الْمُتَبَاينَاتِ الْآتِيَّةِ، وَأَتَحْقِقُ مِنْ صَحَّةِ الْحَلِّ:

7  $3y + 6 < 2y - 8$

8  $6x + 10 \leq 2(7 - x)$

9  $3(x + 1) > 10 + 2x$

10  $2(7 - 3a) \leq 14 - 6a$

11  $x - 4 - 7x > 1 - 6x$

12  $8.1x + 1 > 8.1x - 10$

13  $\frac{x}{2} + 4 < 7$

14  $5w - 7 \leq 3w + 4$

15  $2(4x - 1) \leq 3(x + 4)$

16  $\frac{2t - 2}{7} > 4$

17  $3(x - 2) < 15$

18  $2(4t - 3) \geq 36$

19  $9h + 8 - 3h \geq 2(3h + 1) + 6$

20  $n - 1 > 3n + 4 - 2n$

أَتَذَكَّرُ

أَسْتَعْمَلُ أَوْلًا خَاصِيَّةَ  
التَّوْزِيعِ لِلتَّخلِصِ مِنَ  
الْأَقْوَاسِ فِي طَرْفَيِّ  
الْمُتَبَاينَةِ، ثُمَّ أَحْلِلُ الْمُتَبَاينَةَ.

أَكْتُبُ مُتَبَاينَةً تَمَثِّلُ كُلَّ جَمْلَةٍ مِمَّا يَأْتِي، ثُمَّ أَحْلُلُهَا:

ثُلُثًا عَدَدٌ مَطْرُوحًا مِنْهُ 5 لَا يَزِيدُ عَلَى 15

21

أَرْبَعَةُ أَمْثَالٍ مُجْمُوعُ عَدَدِهِ مَعَ 5 أَكْبَرُ مِنْ 2

22

## الوحدة 5

**تجارة:** يمتلك كرم معملاً لإنتاج الطاولات تكلفة تشغيله الأسبوعية JD 270، إضافةً إلى 60 JD لإنتاج الطاولة الواحدة. يبيع كرم الطاولة الواحدة بمبلغ 150 JD. أكتب متباعدةً يمكن استخدامها لتحديد عدد الطاولات التي يجب إنتاجها وبيعها لتحقيق ربح أسبوعي، وأحل المتباعدة.

23



**علوم:** إذا كانت  $C$  تمثل درجة الحرارة بالسيليسيوس و  $F$  تمثل درجة الحرارة بالفهرنهايت و  $\frac{5(F - 32)}{9} = C$ ، فأكتب متباعدةً يمكن استخدامها لأجد درجات الحرارة بالفهرنهايت التي يكون عندها الذهب صلباً، ثم أحلها، علمًا بأن درجة انصهار الذهب  $1064^{\circ}\text{C}$ .

24

### أتعلم


درجة الانصهار هي الدرجة التي تتغير عندها المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة.

### مهارات التفكير العليا

**تحدد:** أحل كلاً من المتباعدات الآتية:

25  $25 + \frac{2x}{3} > 35 - x$

26  $\frac{3x}{4} + 5 \leq \frac{1}{2} - 6x$




**تبسيط:** اعتمادًا على الشكل المجاور، أكتب متباعدةً وأحلها، لأجد أقل قيمة  $x$ ، علمًا بأن  $x$  عدد كلي.

27

### إرشاد

طول أي ضلع في مثلث أصغر من مجموع طولي الضلعين الآخرين.



**تحدد:** تمددت أضلاع المربع  $KLMN$  فتشكل المستطيل  $NOPQ$  كما في الشكل المجاور، إذا كان محيط المستطيل لا يقل عن مثلي محيط المربع، فأكتب متباعدةً وأحلها؛ لأجد أكبر طول ممكن لضلع المربع.

28

كيف أحل متباعدةً تحتوي متغيراتٍ في طرفيها؟



29

# اختبار نهاية الودعه

حل المتباعدة  $5n - 12 > 2(n + 9)$  هو:

- a)  $n > 6$       b)  $n > 3$   
 c)  $n > 10$       d)  $n < 10$

حل المتباعدة  $18 - 2x < 12$  هو:

- a)  $x < 6$       b)  $x < 15$   
 c)  $x > 3$       d)  $x < 3$

أكتب متباعدة تمثل كل جملة مما يأتي، ثم حلّها:

عدد ما مطروح منه 15 أقل من 7

جمع اثنين إلى ناتج قسمة عدد على 6 - يساوي 8 على الأكثر.

مجموع عدد و 9 أقل من -1

خمس عدد أقل من 10

أربعة أمثال عدد مضافا إلى 8 أقل من 20

خمسة أمثال مجموع عدد مع 6 أكبر من 20

أحل كل متباعدة مما يأتي، وأمثل الحل على خط الأعداد، ثم أتحقق من صحته:

- 14)  $x - 5 < 6$       15)  $3x > 21$   
 16)  $x + 4 \leq 7$       17)  $t + 5 > 3$   
 18)  $p + 12 \geq 2$       19)  $2x - 3 < 7$   
 20)  $\frac{x}{2} + 4 > 5$       21)  $\frac{y}{5} + 6 \leq 3$   
 22)  $6 \geq 9 - x$       23)  $10 - 2x \leq 3$


أختار رمز الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي:

المتباعدة التي تمثل الجملة (مثلا  $x$  مضافا إليه 4 أقل

من 7) هي:

- a)  $2(x + 4) < 7$       b)  $2x + 4 > 7$   
 c)  $2x + 4 < 7$       d)  $2x + 4 \leq 7$

التمثيل البياني الآتي يمثل حل المتباعدة:



- a)  $x > 6$       b)  $x < 6$   
 c)  $x \leq 6$       d)  $x \geq 6$

أي الأعداد الآتية يعد أحد حلول المتباعدة

$$? 15 - 6y \leq 9$$

- a) -1      b) 1  
 c) 0      d) -2

حل المتباعدة  $(-\frac{3}{4} < 6y)$  هو:

- a)  $y < -\frac{1}{8}$       b)  $y > -\frac{1}{8}$   
 c)  $y > -\frac{9}{2}$       d)  $y > -\frac{2}{9}$

المتباعدة  $(-\frac{1}{2} y \geq -\frac{3}{2})$  تكافئ:

- a)  $y \leq \frac{3}{4}$       b)  $y \leq \frac{4}{3}$   
 c)  $y \leq -3$       d)  $y \leq 3$

## الوحدة 5

ما أصغر عدد كلّي يتحقّق المتباعدة  $n < 3$  ؟

- a)  $-1$       b)  $0$   
 c)  $1$       d)  $2$

أي المتباعدة تكافئ المتباعدة  $w > 4$  ؟

- a)  $w < 4$       b)  $-4 < w$   
 c)  $w < -4$       d)  $-w < -4$

قررت إدارة أحد المطارات صيانة أحد مدارجها البالغ طوله  $456 \text{ m}$ ، إذا أنجز أقل من ثلث العمل في المرحلة الأولى، فإن المتباعدة التي تمثل عدد الأمتار التي ما زالت تحتاج للصيانة هي:

- a)  $d > 304$       b)  $d \leq 304$   
 c)  $d \geq 304$       d)  $d < 304$



تكلفة الدقة الواحدة من المكالمات الدولية على الهاتف النقال لسمير  $8$  قروش. إذا كان الحد الأعلى للنفاذ الذي يمكن أن يصرفه سمير على مكالمة دولية  $2.4 \text{ JD}$  فما المتباعدة التي تُستعمل لإيجاد مدة المكالمة؟

- a)  $0.08x \leq 2.4$       b)  $0.08x \geq 2.4$   
 c)  $0.08 \leq 2.4x$       d)  $0.08 \geq 2.4x$

يتقاضى موظف مبيعات في أحد المراكز التجارية

مبلغ  $75 \text{ JD}$  أسبوعياً، إضافة إلى  $4\%$  من قيمة مبيعاته. يخطط هذا الموظف لأن يقل دخله هذا الأسبوع عن  $95 \text{ JD}$ ، أجد الحد الأدنى للمبيعات التي تحقق هدفه.

أحل كلا من المتباعدة الآتية، وأنتحقّ من صحة الحل:

- 25)  $3 + \frac{r}{-4} \geq 6$   
 26)  $2 > -3t - 10$   
 27)  $5x - 12 < 3x - 4$   
 28)  $2(k-5) < 2k + 5$   
 29)  $2(5z - 20) < -3(4-z)$

**مساعدات:** تخطّط جمعية خيرية لإقامة بازار تبيع فيه أطباقاً من الطعام وتوزيع ريع مبيعاته على عائلات فقيرة. إذا كان سعر الطبق الواحد  $1.25 \text{ JD}$  وتحطّط الجمعية لجمع ما لا يقل عن  $400 \text{ JD}$ ، فأكتب متباعدة وأحلها؛ لأجد أقل عدد من الأطباق التي يجب بيعها في البازار لتحقيق الجمعية هدفها.

### تدريب على الاختبارات الدولية

حل المتباعدة  $-18 < -13 - u$  هو:

- a)  $u < -5$       b)  $u > 5$   
 c)  $u > -5$       d)  $u < 5$

## أنظمة المعادلات الخطية

### ما أهمية هذه الوحدة؟

يمكن نمذجة مواقف حياتية عديدة باستخدام معادلتين خطيتين بمتغيرين، مثل تغيير الطول، وتغيير درجات الحرارة في أثناء اليوم، وتغيير ارتفاع ما، فمثلاً يساعد حل نظام المعادلات على تحديد الوقت الذي يصبح فيه منطادان على الارتفاع نفسه إذا كان معدل التغيير في ارتفاعهما مختلفاً.



### سأتعلم في هذه الوحدة:

- حل نظام معادلات خطية بمتغيرين بيانياً.
- حل نظام معادلات خطية بمتغيرين بالتعويض.
- حل نظام معادلات خطية بمتغيرين بالحذف.

### تعلمت سابقاً:

- ✓ تعين إحداثيًّا نقطة في المستوى الإحداثي.
- ✓ حل المعادلة الخطية بمتغير واحد.
- ✓ كتابة معادلة المستقيم بصيغة الميل والمقطع.

# مشروع الوحدة: الأشجار سريعة النمو



أحد ممٌّ يصبح طول الشجرتين في كل نظام معادلات كونته في الخطوة (2) متساوياً، وذلك بحل النظام بيانياً وجبرياً باستعمال طريقة التعويض والحدف، وأبهر إجابتي.

4

استعمل برمجية جيو جيبرال حل أنظمة المعادلات الخطية والتحقق من صحة الحل.

5

أعد مطوية من 4 صفحات، أدرج في كل صفحة منها صورة لأحد الأشجار الأربع ومعلومات عنها.

6

أستعد ومجموعي لتنفيذ مشروعنا الخاص لكتابه معادلات خطية تمثل نمو أشجار سريعة النمو، وتكوين أنظمة معادلات منها، وحلها.



## خطوات تنفيذ المشروع:

أبحث في شبكة الإنترنت عن 4 أشجار سريعة النمو وأجد معدلاً نمو كل منها، مع ضرورة الانتهاء توحيد وحدات الزمن، ووحدات الطول للأشجار جميعها.

1

أكتب أربع معادلات خطية لأطوال الأشجار الأربع بالنسبة للزمن معتمداً على معدل النمو وفق الشروط الآتية:

2

- افتراض طولاً أولياً للشجرتين ذواتي معدل النمو الأقل على أن يكون أكثر من 2 m
- افتراض طولاً أولياً للشجرتين ذواتي معدل النمو الأعلى على أن يكون أقل من 1 m

3

استعمل المعادلات الأربع الناتجة في الخطوة (2) لتكوين 4 أنظمة معادلات خطية، كل نظام منها مكون من معادلتين خطيتين، إحداها من الشجرتين ذواتي معدل النمو الأعلى والأخرى من الشجرتين ذواتي معدل النمو الأقل.



## حلُّ نظامٍ مِنْ معادلَتَيْنِ خطِّيَّتَيْنِ بِيَانِيًّا



## أَسْتَكْشِفُ

شجرة طولها  $0.6\text{ m}$  ويزداد طولها بمعدل ثابت مقداره  $0.3\text{ m}$  في السنة، وشجرة أخرى طولها  $1.8\text{ m}$  ويزداد طولها بمعدل ثابت مقداره  $0.15\text{ m}$  لكل سنة. بعد كم سنة يصبح للشجرتين الطول نفسه؟

## فكرةُ الدرس

أحلُّ نظامَ معادلاتٍ مكونًا من معادلَتَيْنِ خطِّيَّتَيْنِ بِيَانِيًّا.

## المصطلحات:

نظامُ المعادلاتِ الخطِّيَّةِ، حلُّ نظامِ المعادلاتِ الخطِّيَّةِ.

يتكونُ نظامُ المعادلاتِ الخطِّيَّةِ (system of linear equations) مِنْ معادلَتَيْنِ خطِّيَّتَيْنِ أو أكثرَ لَهَا المتغيرَاتُ نفسُها، وفي ما يأتي مثالٌ على نظامٍ مكونٍ مِنْ معادلَتَيْنِ خطِّيَّتَيْنِ:

$$y = 2x + 1 \quad \text{المعادلة 1}$$

$$y = x - 3 \quad \text{المعادلة 2}$$

حلُّ نظامِ المعادلاتِ الخطِّيَّةِ (solution of a system of linear equations) بمتغيرَيْنِ هُوَ زوجٌ مرتبٌ يحققُ كُلَّ معادلةٍ في النظامِ.

## مثال 1

أحدَدْ ما إذا كانَ الزَّوْجُ المرتَبُ يمثُلُ حلاً لنظامِ المعادلاتِ الخطِّيَّةِ المُعطى في كُلِّ ممَّا يأتي:

$$1 \quad (4, 1); \quad x + 2y = 6$$

$$x - y = 3$$

أعُوّضُ الزَّوْجَ المرتَبَ (1, 4) في كِلا المعادلَتَيْنِ حِيثُ  $x = 4$  وَ  $y = 1$ .

$$\text{المعادلة 2}$$

$$x - y = 3$$

$$4 - 1 \stackrel{?}{=} 3$$

$$3 = 3 \quad \checkmark$$

$$\text{المعادلة 1}$$

$$x + 2y = 6$$

$$(4) + 2(1) \stackrel{?}{=} 6$$

$$6 = 6 \quad \checkmark$$

بِمَا أَنَّ الزَّوْجَ المرتَبَ (1, 4) يمثُلُ حلاً لِكِلا المعادلَتَيْنِ، إذْنُ (1, 4) يمثُلُ حلاً لنظامِ المعادلاتِ الخطِّيَّةِ.

## الوحدة 6

2 (1, -2);  $2x + y = 0$

$$-x + 2y = 5$$

أعوّض الزوج المرتّب في كلا المعادلين حيث  $x = 1$  و  $y = -2$

المعادلة 2

$$-x + 2y = 5$$

$$-(1) + 2(-2) \stackrel{?}{=} 5$$

$$-5 \neq 5 \quad \text{X}$$

المعادلة 1

$$2x + y = 0$$

$$2(1) + (-2) \stackrel{?}{=} 0$$

$$0 = 0 \quad \checkmark$$

لاحظ أن الزوج المرتّب (1, -2) يمثل حلّاً لالمعادلة الأولى، ولكنه لا يمثل حلّاً لالمعادلة الثانية، إذن (1, -2) لا يمثل حلّاً لنظام المعادلات الخطية.

أتحقق من فهمي:

3 (1, 3);  $2x + y = 5$

$$-2x + y = 1$$

4 (-1, 2);  $2x + 5y = 8$

$$3x - 2y = 5$$

إحدى طرائق حلّ نظام معادلات مكوّن من معادلين خطّيين هي تمثيلهما في المستوى الإحداثي نفسه، وإيجاد النقطة التي يتقاطع عندها المستقيمان والتي تمثل حلّاً لنظام


مثال 2

أحلّ نظام المعادلات الخطية الآتي بيانياً:

$$y = x - 3$$

$$y = -x - 1$$

1 أمثل المعادلين في المستوى الإحداثي نفسه.



لاحظ أن كلا المعادلين مكتوبان بصيغة الميل والمقطع؛ لذا يمكن تمثيلهما باستعمال المقطع  $y$  والميل.

2 أحدّد نقطة تقاطع المستقيمان.

لاحظ من التمثيل البياني أن المستقيمان يتقاطعان في النقطة (1, -2).

### الخطوة 3 أتحقق من صحة الحل

أتحقق من أن الزوج المرتب  $(-2, 1)$  يمثل حلًا لكلا المعادلتين:

#### المعادلة 2

$$\begin{aligned} y &= -x - 1 \\ -2 &\stackrel{?}{=} -(1) - 1 \\ -2 &= -2 \quad \checkmark \end{aligned}$$

#### المعادلة 1

$$\begin{aligned} y &= x - 3 \\ -2 &\stackrel{?}{=} 1 - 3 \\ -2 &= -2 \quad \checkmark \end{aligned}$$

إذن، حل النظام  $(-2, 1)$ .

### أتحقق من فهمي

1  $y = -4 - x$   
 $y = 2x + 14$

2  $y = -x + 5$   
 $y = x - 3$

إرشاد: أستعمل أوراق المربعات الموجودة في نهاية كتاب التمارين.


إن التمثيل البياني لنظام معادلات مكون من معادلتين خطيتين يكون إما مستقيمين متقاطعين وهذا يعني وجود حلٌ واحدٌ فقط للنظام هو نقطة التقاطع، أو مستقيمين متوازيين مما يعني أنه لا يوجد حلٌ للنظام، أو المستقيم نفسه وهذا يعني وجود عددٌ لانهائيٌ من الحلول.

### الحلول الممكنة لنظام المعادلات الخطية

### مفهوم أساسى


يمكن أن يكون لنظام المعادلات المكون من معادلتين خطيتين حلٌ واحدٌ فقط، أو عددٌ لانهائيٌ من الحلول، أو أنه لا يوجد له حلٌ.

لا يوجد حلٌ




مستقيمان متوازيان

عددٌ لانهائيٌ من الحلول



المستقيم نفسه

حلٌ واحدٌ



مستقيمان متقاطعان


## الوحدة 6

أحل كلاً من أنظمة المعادلات الآتية بيانياً:

مثال 3

1  $y = 2x + 4$

$y = 2x - 1$



أمثل المعادلتين في المستوى الإحداثي نفسه.

الخطوة 1

أحد نقطت تقاطع المستقيمين.


الخطوة 2

لاحظ من التمثيل البياني أن المستقيمين متوازيان، وهذا يعني أنه لا توجد نقطة مشتركة بين المعادلتين.

إذن، لا يوجد حل لهذا النظام.

2  $9x - 6y = 24$

$6x - 4y = 16$



أمثل المعادلتين في المستوى الإحداثي نفسه.

الخطوة 1

لاحظ أن المعادلتين على الصورة القياسية للمعادلة الخطية، ولتمثيلهما بيانيًّا يمكنني أو لا كتابتهما على صورة الميل والمقطع، أو اختيار قيمتين لـ  $x$ ، ثم تعويضهما في المعادلة لأجد قيم  $y$  المقابلة لها.

أحد نقطت تقاطع المستقيمين.

الخطوة 2

لاحظ أن كلاً المعادلتين لهما التمثيل البياني نفسه، وأن أي زوج مرتب حقق المعادلة الأولى سيتحقق بالضرورة المعادلة الثانية.

إذن، يوجد للنظام عدد لانهائي من الحلول.

إذا كان للمعادلتين في نظام المعادلات الخطية الميل نفسه والمقطع لا نفسُه، فإن للنظام عدداً لانهائيًّا من الحلول، أما إذا كان للنظام الميل نفسه والمقطع مختلفٌ فلا يوجد حلٌّ للنظام.

أتحقق من فهمي:

3  $y = 2x + 1$

$y = 2x - 5$

4  $-2x + y = 3$

$-4x + 2y = 6$

إرشاد: استعمل أوراق المربعات الموجودة في نهاية كتاب التمارين.

يمكن نمذجة مواقف حياتية عديدة باستعمال نظام معادلات خطية مكون من معادلتين خطيتين، وحلّه بيانياً.

#### مثال 4: من الحياة



**منظاد:** منطادان ارتفاع أحدهما  $4\text{ m}$  عن سطح الأرض، ويزداد ارتفاعه بمعدل ثابت مقداره  $5\text{ m}$  لكل دقيقة، والمنظاد الآخر ارتفاعه  $10\text{ m}$  عن سطح الأرض، ويزداد ارتفاعه بمعدل ثابت مقداره  $3\text{ m}$  لكل دقيقة. بعد كم دقيقة يصبح للمنظادين ارتفاع نفسه؟

ارتفاع المنطاد يساوي معدل ارتفاعه مضروباً **بعد الدقائق** مضافاً إليه ارتفاعه الأصلي.

بالكلمات


ليكن  $x$  عدد الدقائق، و  $y$  ارتفاع المنطاد.

المتغير

معادلة ارتفاع المنطاد الأول:

المعادلات

معادلة ارتفاع المنطاد الثاني:



لإيجاد متى يصبح للمنظادين ارتفاع نفسه، أمثل المعادلتين  $y = 5x + 4$  و  $y = 3x + 10$  بيانياً، لأجد نقطة تقاطع المستقيمين وهي  $(3, 19)$ .

تحقق من صحة الحل:

تحقق من أن الزوج المرتب  $(3, 19)$  يمثل حل لـ كلا المعادلتين:

المعادلة 2

$$y = 3x + 10$$

$$19 \stackrel{?}{=} 3(3) + 10$$

$$19 = 19 \quad \checkmark$$

المعادلة 1

$$y = 5x + 4$$

$$19 \stackrel{?}{=} 5(3) + 4$$

$$19 = 19 \quad \checkmark$$

إذن، يصبح للمنظادين ارتفاع نفسه بعد 3 دقائق، ويكون ارتفاعهما عن سطح الأرض  $19\text{ m}$ .

## الوحدة 6

أتحقق من فهمي:



**لعبة إلكترونية:** تريد الأختان هدى وندى شراء لعبة إلكترونية، وتتوفران من مصر وفهما من أجل ذلك. إذا كان مع هدى 14 JD وتتوفر أسبوعياً 3 JD، ومع ندى 6 JD وتتوفر أسبوعياً 5 JD فبعد كم أسبوع يكون مع الأختين المبلغ نفسه؟

أحدد ما إذا كان الزوج المرتب يمثل حلّاً لنظام المعادلات الخطية المعطى في كلٍّ


مما يأتي:

### أتدرب وأحل المسائل



1  $(2, -2)$ ;  $3x + y = 4$   
 $x - 3y = 8$

2  $(-1, 3)$ ;  $y = -7x - 4$   
 $y = 8x + 5$



استعمل التمثيل البياني المجاور لأجد حل كلّ نظام معادلاتٍ مما يأتي:

3  $y = x$   
 $2x + y = 6$

4  $2y + 3 = x$   
 $2x + y = 6$

5  $2y + 3 = x$   
 $y = x$

أحل كلاً من أنظمة المعادلات الآتية بيانياً:

6  $y = 4x + 2$   
 $y = -2x - 4$

7  $y = x - 6$   
 $y = x + 2$

8  $y = -3$   
 $y = x - 3$

9  $x + y = 4$   
 $3x + 3y = 12$

10  $2x + 3y = 12$   
 $2x - y = 4$

11  $y = 6x + 3$   
 $y = 2x + 3$

12  $8x - 4y = 16$   
 $-5x - 5y = 5$

13  $4x - 6y = 12$   
 $-2x + 3y = -6$

14  $\frac{3}{4}x + \frac{1}{2}y = \frac{1}{4}$   
 $\frac{2}{3}x + \frac{1}{6}y = \frac{1}{2}$

### إرشاد

يسهل التخلص من الكسور حل أنظمة المعادلات، ويتم ذلك بضرب معاملات الحدود في كل معادلة بالمضاعف المشتركة الأصغر لمقامات الكسور.

**أعمار:** يقل عمر نوال عن عمر والدتها بـ 26 عاماً، ومجموع عمريهما 50 عاماً.

15

أكتب نظاماً من معادلتين خطيتين يمثل عمر نوال وعمر والدتها، ثم أجد عمر كل منهما.

**موقع إنترنت:** موقع تعليمي على شبكة الإنترنت، سجل الأول مليون زيارة عام

2018م، وفي كل عام لاحق ازداد عدد زياراته بمعدل ثابت مقداره نصف مليون زيارة.

وسجل الموقع الثاني عشرة ملايين زيارة عام 2018م، ولكن هذا العدد تناقص في كل

عام لاحق بمعدل ثابت يساوي مليون زيارة.

## معلومة

ازدادت أعداد مستخدمي المواقع التعليمية على الإنترنت في أثناء جائحة كورونا.



أكتب نظاماً من معادلتين خطيتين يمثل أعداد زيات الموقعين.

16

في أي عام سيصبح عدد زيات كل من الموقعين متساوياً؟

17

**هندسة:** أجد قيمتي  $x$  و  $y$  للمستطيل المجاور.

18

$$12x - 3y$$

$$\boxed{5x + 2}$$

$$3x + 2y$$

$$4y + 3$$


أعود إلى فقرة (استكشف) بداية الدرس، وأحل المسألة.

19

**تبير:** هل يمكن أن يكون لنظام معادلات خطية مكوناً من معادلتين خطيتين حلان

20

مختلفان؟ أبّرر إجابتي.



**اكتشف الخطأ:** يبيّن الشكل المجاور أن حل

نظام المعادلات الآتي هو النقطة  $(-1, 3)$  :

$$x - 3y = 6$$

$$2x - 3y = 3$$

اكتشف الخطأ في الحل، وأصحّه.

21

**مسألة مفتوحة:** أكتب نظام معادلات خطية مكوناً من معادلتين خطيتين ليس له حل،

22

ونظاماً آخر له عدد لا نهائي من الحلول.

**أكتب** كيف أجد حل نظام معادلات خطية مكوناً من معادلتين خطيتين بيانياً؟

23

## تمثيل نظام مِن معادلتَين خطَّيتَين بيانياً

يمكن استعمال برمجية جيوجبرا للحل نظام معادلات خطية مكون من معادلتَين خطيتَين بمتغيرَين بيانياً في المستوى الإحداثي.

أحل نظام المعادلات الآتي بيانياً باستعمال برمجية جيوجبرا.

نشاط

$$4x + 3y = 18$$

$$2x - 3y = 0$$


1 الخطوة أدخل في شريط الإدخال المعادلة الأولى:  $4x + 3y = 18$ , ثم أضغط . Enter

2 الخطوة أدخل في شريط الإدخال المعادلة الثانية:  $2x - 3y = 0$  ثم أضغط . Enter

3 الخطوة أختار أيقونة من شريط الأدوات، ثم أنقر على المستقيمين، وألاحظ ظهور نقطة تقاطع المستقيمين في المستوى الإحداثي، وإحداثيَّتها في شريط الإدخال.

$A = \text{Intersect}(\text{eq1}, \text{eq2})$   
→ (3, 2)

إذن، حل النظام هو (3, 2).



أحل كلَّ نظام معادلاتٍ مما يأتي بيانياً باستعمال برمجية جيوجبرا:

أتدرب



1  $x + y = 8$   
 $x - 2y = 2$

2  $y = 2x - 6$   
 $y = 2x + 2$

3  $y = 4x + 2$   
 $y = -2x - 5$

4  $2x + 3y = 12$   
 $2x - y = 4$

## حلُّ نظامٍ مِنْ معادلَتَيْنِ خطِّيَّتَيْنِ بِالتعويضِ

## أَسْتَكْشِفُ



الحرارة في منتصف النهار؟ وما درجة الحرارة في منتصف الليل؟

تعلَّمْتُ في الدرسِ السَّابِقِ حلَّ نظامٍ مِنْ معادلَتَيْنِ خطِّيَّتَيْنِ بِيَانِيَّ، وسَأَتَعَلَّمُ فِي هَذَا الدرسِ طَرِيقَةً أُخْرَى لِحَلِّ نَسَمَةِ  
المعادلاتِ تُسْعَمِلُ فِيهَا الْخَصَائِصُ الْجَبَرِيَّةُ وَتُسَمَّى طَرِيقَةُ التَّعْوِيْضِ (substitution).

## فكرةُ الدرسِ

أَحَلُّ نَسَمَةَ مَعادلاتٍ مَكْوَنَةً مِنْ  
معادلَتَيْنِ خطِّيَّتَيْنِ بِالتعويضِ.

## المصطلحات

التعويضُ.

## حلُّ نظامِ معادلاتِ خطِّيَّةٍ بِالتعويضِ

## مفهومُ اساسيٍّ



1

**الخطوةُ 1** إذا لزمَ الْأَمْرُ، أَكْتُبُ إِحْدَى الْمَعادلَتَيْنِ عَلَى الْأَقْلَى بِالنَّسْبَةِ لِأَحَدِ الْمُتَغَيِّرَيْنِ.

2

**الخطوةُ 2** أَعْوَضُ الْمَقْدَارَ النَّاتِجَ مِنَ **الخطوة 1** فِي الْمَعادِلَةِ الثَّانِيَّةِ، ثُمَّ أَحْلُّهُ.

3

**الخطوةُ 3** أَعْوَضُ القيمةَ النَّاتِجَةَ مِنَ **الخطوة 2** فِي أَيِّ مِنَ الْمَعادلَتَيْنِ، ثُمَّ أَحْلُّ الْمَعادِلَةَ النَّاتِجَةَ لِأَجَدَ قِيمَةَ  
الْمُتَغَيِّرِ الثَّانِيِّ، ثُمَّ أَكْتُبُ الْحَلَّ فِي صُورَةِ زَوْجٍ مَرْتَبٍ.

## مثال 1

أَسْعَمِلُ التَّعْوِيْضَ لِحَلِّ نَسَمَةِ الْمَعادلاتِ الْأَتَيَّ:

$$y = 2x + 3$$

$$3x + 4y = 1$$

1

**الخطوةُ 1** بِمَا أَنَّ الْمَعادِلَةَ الْأُولَى مَكْتُوبَةُ بِالنَّسْبَةِ إِلَى  $y$ ؛ إِذْنُ أَنْقُلُ مُبَاشِرَةً إِلَى **الخطوةِ الثَّانِيَّةِ**.

## الوحدة 6

**الخطوة 2** أَعْوَضُ  $(2x + 3)$  بِدَلَّا مِنْ  $y$  فِي الْمَعَادِلَةِ الثَّانِيَةِ.

$$3x + 4y = 1$$

الْمَعَادِلَةُ الثَّانِيَةُ

$$3x + 4(2x + 3) = 1$$

أَعْوَضُ عَنْ  $y$  بِ $(2x + 3)$

$$3x + 8x + 12 = 1$$

خَاصِيَّةُ التَّوزِيعِ

$$11x + 12 = 1$$

أَجْمَعُ الْحَدُودُ الْمُتَشَابِهُ

$$11x + 12 - 12 = 1 - 12$$

أَطْرُحُ 12 مِنْ طَرَفِ الْمَعَادِلَةِ

$$\frac{11x}{11} = \frac{-11}{11}$$

أَقْسُمُ طَرَفِ الْمَعَادِلَةِ عَلَى 11

$$x = -1$$

أَبْسِطُ

**الخطوة 3** أَعْوَضُ  $-1$  - بِدَلَّا مِنْ  $x$  فِي أَيِّ مِنَ الْمَعَادِلَتَيْنِ لِإِيجَادِ قِيمَةِ  $y$ .

$$y = 2x + 3$$

الْمَعَادِلَةُ الْأُولَى

$$= 2(-1) + 3$$

أَعْوَضُ عَنْ  $x$  بِ $-1$

$$= 1$$

أَبْسِطُ

إِذْنُ، حُلُّ النَّظَامُ هُوَ  $(-1, 1)$ .

**التحقق:** أَتَحَقَّقُ مِنْ صَحَّةِ الْحَلِّ بِتَعْوِيضِ الزَّوْجِ الْمَرَّتِيْبِ فِي كُلِّ مِنْ مَعَادِلَتَيِ النَّظَامِ.

✓ **أَتَحَقَّقُ مِنْ فَهْمِي:**

أَحْلُّ كُلَّا مِنْ أَنْظَمَ الْمَعَادِلَاتِ الْأَتِيَّةِ بِاستِعْمَالِ التَّعْوِيضِ:

1  $y = 17 - 4x$

$$2x + y = 9$$

2  $y - 5x = 1$

$$x = y + 3$$

لَاحَظْتُ فِي الْمَثَالِ السَّابِقِ أَنَّ إِحْدَى الْمَعَادِلَتَيْنِ كَانَتْ مَكْتُوبَةً بِالنَّسْبَةِ إِلَى أَحَدِ الْمُتَغَيِّرَاتِ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنِ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، فَأَحْلُّ إِحْدَى الْمَعَادِلَتَيْنِ أَوْ لَا بِالنَّسْبَةِ إِلَى أَحَدِ الْمُتَغَيِّرَيْنِ، ثُمَّ أَحْلُّ النَّظَامَ بِتَعْوِيضِ.

أستعمل التعويض لحلّ نظام المعادلات الآتي:

$$3x + y = 5$$

$$5x - 2y = 12$$

**الخطوة 1** أحلّ المعادلة الأولى بالنسبة للمتغير  $y$ ، لأنَّ معامله 1

$$3x + y = 5$$

المعادلة الأولى

$$3x - 3x + y = 5 - 3x$$

أطرح  $3x$  من طرفِ المعادلة

$$y = 5 - 3x$$

أبسطُ

**الخطوة 2** أعوّض  $(5 - 3x)$  بدلاً من  $y$  في المعادلة الثانية.

$$5x - 2y = 12$$

المعادلة الثانية

$$5x - 2(5 - 3x) = 12$$

أعوّض عن  $y$  بـ  $(5 - 3x)$

$$5x - 10 + 6x = 12$$

خاصيّة التوزيع

$$11x - 10 = 12$$

أجمعُ الحدود المتشابهة

$$11x - 10 + 10 = 12 + 10$$

أجمعُ 10 إلى طرفِ المعادلة

$$\frac{11x}{11} = \frac{22}{11}$$

أقسِم طرفِ المعادلة على 11

$$x = 2$$

أبسطُ

**الخطوة 3** أعوّض 2 بدلاً من  $x$  في أيٍ من المعادلتَيْن لإيجاد قيمة  $y$ .

$$3x + y = 5$$

المعادلة الأولى

$$3(2) + y = 5$$

أعوّض عن  $x$  بـ 2

$$6 + y = 5$$

أبسطُ

$$y = -1$$

أطرح 6 من طرفِ المعادلة

إذن، حلُّ النسَام هو  $(2, -1)$ .

**التحقق:** أتحققُ من صحةِ الحل بتعويضِ الزوج المرتَب في كلِّ مِنْ معادلَيِّ النسَام.

## الوحدة 6

أتحقق من فهمي:



أحل كلاً من أنظمة المعادلات الآتية باستعمال التعويض:

1  $4x + 3y = 37$   
 $2x + y = 17$

2  $x + 3y = 7$   
 $2x - y = 7$

بشكل عام، إذا كان ناتج حل نظام معادلات مكون من معادلتين خطيتين جملة صحيحة مثل  $(-2 = -2)$ ، فإن للنظام عدداً لانهائياً من الحلول، أمّا إذا كان الناتج جملة خطأ مثل  $(5 = -2)$ ، فلا يوجد حل للنظام.

### مثال 3

أحل كلاً من أنظمة المعادلات الآتية باستعمال التعويض:

1  $x - 4y = 12$   
 $8y - 2x = 20$

أحل المعادلة الأولى بالنسبة للمتغير  $x$ ؛ لأن معامله 1

الخطوة 1

$$x - 4y = 12$$

المعادلة الأولى

$$x - 4y + 4y = 12 + 4y$$

أجمع  $4y$  إلى طرفي المعادلة

$$x = 12 + 4y$$

أبسط

أعوض  $(12 + 4y)$  بـ  $x$  في المعادلة الثانية.

الخطوة 2

$$8y - 2x = 20$$

المعادلة الثانية

$$8y - 2(12 + 4y) = 20$$

أعوض عن  $x$  بـ  $(12 + 4y)$

$$8y - 24 - 8y = 20$$

خاصية التوزيع

$$-24 = 20$$

أجمع الحدود المتشابهة

بما أن الجملة الناتجة خطأ، إذن، لا يوجد حل للنظام.

2  $x - y = 5$

$2x = 2y + 10$

أحل المعادلة الأولى بالنسبة للمتغير  $x$ ; لأن معامله 1

1

المعادلة الأولى

$$x - y = 5$$

$$x - y + y = 5 + y$$

أجمع  $y$  إلى طرفي المعادلة

$$x = 5 + y$$

أبسط

أعوض  $(y + 5)$  بدلاً من  $x$  في المعادلة الثانية.

2

المعادلة الثانية

$$2x = 2y + 10$$

أعوض عن  $x$  بـ  $(5 + y)$

$$10 + 2y = 2y + 10$$

خاصية التوزيع

$$10 + 2y - 2y = 2y - 2y + 10$$

أطرح  $2y$  من طرفي المعادلة

$$10 = 10$$

أبسط

بما أن الجملة الناتجة صحيحة، إذن، يوجد عدد لا نهائي من الحلول.

تحقق من فهمي: 

3  $x - 2y = 4$

$8y - 4x = 8$

4  $x - 5y = 15$

$10y - 2x = -30$

يمكن استعمال التعويض لحل مسائل من واقع الحياة تتضمن نظاماً من معادلتين خطيتين بمتغيرين.

**مثال 4: من الحياة** 



**اختبارات:** تقدّمت أمانى لاختبار مكون من 50 سؤالاً تحصل فيه على علامتين عن كل سؤال إجابتة صحيحة، وتخسر علامة عن كل سؤال إجابتة خطأ. فإذا أجبت أمانى عن أسئلة الاختبار جميعها وحصلت على 67 علامة، فكم سؤالاً أجبت عنه إجابة صحيحة؟

## الوحدة 6

لتكن  $x$  عدد الأسئلة التي إجابتها صحيحة، و $y$  عدد الأسئلة التي إجابتها خطأ.

إذن، نظام المعادلات الذي يعبر عن المسألة هو:

$$x + y = 50$$

$$2x - y = 67$$

أحل المعادلة الأولى بالنسبة للمتغير  $y$ ؛ لأن معامله 1

الخطوة 1

$$x + y = 50$$

المعادلة الأولى

$$x - x + y = 50 - x$$

أطرح  $x$  من طرف المعادلة

$$y = 50 - x$$

أبسط

أعوض  $(50 - x)$  بـ  $y$  في المعادلة الثانية.

الخطوة 2

$$2x - y = 67$$

المعادلة الثانية

$$2x - (50 - x) = 67$$

أعوض  $y$  بـ  $(50 - x)$

$$2x - 50 + x = 67$$

خاصية التوزيع

$$3x - 50 = 67$$

أجمع المحدود المتشابهة

$$3x - 50 + 50 = 67 + 50$$

أجمع 50 إلى طرف المعادلة

$$3x = 117$$

أقسم طرف المعادلة على 3

$$x = 39$$

أبسط

إذن، أجبت أمانى في الاختبار عن 39 سؤالاً إجابة صحيحة.

تحقق من فهمي:

**تسوق:** اشتري خالد كتاباً ونالقة بيانات بـ 14 JD، إذا كان مثلاً من الكتاب يزيد عن ثمن نالقة البيانات بمقدار 10 JD، فما سعر كل من نالقة البيانات والكتاب؟

أحل كلاً من أنظمة المعادلات الآتية باستعمال التعويض:

1  $y = 4x + 2$   
 $2x + y = 8$

2  $y = x + 5$   
 $y = -2x - 4$

3  $x = 3 - \frac{1}{2}y$   
 $5x - y = 1$

4  $\frac{1}{2}x - y = 2$   
 $y = 9 - 5x$

5  $x - 4y = 20$   
 $y - 3x = 6$

6  $y - 6x = 3$   
 $y - 2x = 3$

7  $8x - y = 16$   
 $\frac{1}{4}y - 2x = 3$

8  $6x - 9y = 18$   
 $-2x + 3y = -6$

9  $y + 3x + 6 = 0$   
 $y + 6x + 24 = 0$

**مزرعة:** مزرعة حيوانات فيها دجاج وأرانب، إذا عدّت رؤوسها سجدها 18 رأساً، وإذا عدّت أرجلها سجدها 50 رجلاً. كم دجاجة وكم أرنبًا في هذه المزرعة؟



**فاكهه:** اشتري مراد وفؤاد برتقالاً وتفاحاً من النوع نفسه، فدفع مراد JD 3.25 عن شرائه 5 kg برتقالاً و 1 kg تفاحاً، ودفع فؤاد JD 3.75 عن شرائه 3 kg تفاحاً و 3 kg برتقالاً:

أكتب نظاماً من معادلين خطيين يمثل المسألة، ثم أحله لأجد سعر الكيلوغرام الواحد من كل من التفاح والبرتقال.

إذا اشتريت منال 2 kg من نوع التفاح نفسه و kg 2 من نوع البرتقال نفسه، فما المبلغ الذي دفعته؟


يمكنني أيضاً استعمال استراتيجية التخمين والتحقق لإيجاد عدد الدجاج والأرانب.

## الوحدة 6

**سياحة:** يبيّن الجدول الآتي أعداد السياح في موقعين أثريين في أحد الأعوام، ومعدل الزيادة السنوية في أعداد السياح (بالآلاف) بعد ذلك العام:

	معدل الزيادة في أعداد السياح (بالآلاف لكل عام)	أعداد السياح (بالآلاف)
الموقع (أ)	57	1.1
الموقع (ب)	61	0.7

إذا استمرّت الزيادة في أعداد السياح وفق هذه المعدلات، وبعد كم عام يمكن أن تتساوى أعداد السياح في الموقعين؟ وكم يبلغ عددهم حينئذ؟



**هندسة:** إذا كانت القيمة العددية لمحيط المثلث المجاور تُساوي القيمة العددية لمساحته، فما قيمة  $x$ ؟

**تبرير:** أجد قيمتي الثابتين  $a$  و  $b$  في نظام المعادلات الخطية الآتي، حيث الزوج المرتب  $(1, -9)$  هو حلّ النظام، وأبّرر إجابتي:

$$ax + by = -31$$

$$ax - by = -41$$

**مسألة مفتوحة:** أكتب نظام معادلات خطية مكوناً من معادلين خطيين حيث يمثل الزوج المرتب  $(-5, 3)$  حالاً لإحدى المعادلتين فقط، ويمثل الزوج المرتب  $(-1, 7)$  حالاً للنظام.



**تحدّ:** تتَّألفُ دُفعةٌ من خريجي دورٍ للدفاع المدني مِنْ 240 شخصاً، نسبة الذكور فيها إلى الإناث 7 : 5، أكتب نظاماً من معادلين خطيين يُمثل المسألة، ثم أحلّه لأجدَ عدد الذكور وعدد الإناث في هذه الدفعة من الخريجين.

كيف أحلّ نظام معادلات خطية مكوناً من معادلين بالتعويض؟



13

### معلومة

توجد في الأردن موقع أثري عُدّة تعود لحضارات وحقب تاريخية مختلفة.



14

15

### مهارات التفكير العليا

### معلومة

تسعى مديرية الدفاع المدني إلى تعميق مفهوم الوعي الوقائي، ونشره في المجتمع، عن طريق برامج تدريبية تُنمّي مهارات إطفاء الحرائق والإنقاذ والإسعاف.

16

17

18



## أَسْتَكْشِفُ

تمارسُ سميّةُ الرياضةَ كُلَّ صبَّاحٍ لمَدَّةِ 40 دقِيقَةً، بِحِيثُ تَلْعَبُ أَوَّلًا تمارينَ الإطالةِ الَّتِي تحرقُ بِهَا 4 سُعُراتٍ حراريَّةٍ فِي الدِّقِيقَةِ، ثُمَّ تَلْعَبُ مَجْمُوعَةً مِنَ التَّمَارِينِ الْهَوَائِيَّةِ؛ لِتَسْاعِدَهَا عَلَى حرقِ 11 سُعُرةً حراريَّةٍ فِي الدِّقِيقَةِ. كَمْ دقِيقَةً عَلَى سميّةِ أَنْ تَلْعَبَ مِنْ كُلِّ نَشَاطٍ لِتَحرقَ 335 سُعُرةً حراريَّةً؟

## فكرةُ الدرس

أَحْلُّ نَسْطَلَاتٍ مِعَادِلَاتٍ خطِّيَّةٍ مَكْوَنَةٍ مِنْ معادلَتَيْنِ بالحذفِ.

## المُصْطَلَحَاتُ

الحذفُ.

في بعضِ الأحيانِ يُؤَدِّي جَمْعُ معادلَتَيْنِ أَوْ طَرْحُهُما إِلَى حذفِ أحدِ المُتَغَيِّرَاتِ، وَتُسَمَّى هَذِهِ الطَّرِيقَةُ الْجَبَرِيَّةُ فِي حلِّ نَسْطَلَاتِ المُعَادِلَاتِ الخطِّيَّةِ طَرِيقَةُ الحذفِ (elimination).

## حلُّ نَسْطَلَاتِ المُعَادِلَاتِ الخطِّيَّةِ بالحذفِ

## مَفْهُومٌ اسْاسِيٌّ



أَصْرِبُ - إِنْ لَزَمَ الْأَمْرُ - إِحدى المعادلَتَيْنِ أَوْ كُلَّتَيْهِما فِي عَدِّ ثَابِتٍ بِحِيثُ يَكُونُ هُنَاكَ عَلَى الْأَقْلَلِ حَدَّانِ مُتَشَابِهَانِ مَعَامِلُهُمَا مُتَسَاوِيَانِ أَوْ مَعَامِلُ أَحَدِهِمَا مَعْكُوسٌ لِلآخَرِ.

أَكْتُبُ النَّسْطَلَةَ بِحِيثُ تَكُونُ الْحَدُودُ المُتَشَابِهَةُ فَوْقَ بَعْضِهَا بَعْضًا.

أَجْمَعُ الْمُعَادِلَاتِ أَوْ أَطْرَحُهُمَا لِلتَّخلِّصِ مِنْ أَحَدِ المُتَغَيِّرَاتِ، ثُمَّ أَحْلُّ الْمُعَادِلَةَ النَّاتِجَةَ.

أَعْوَضُ القيمةَ النَّاتِجَةَ فِي الخطوةِ 3 فِي إِحدى الْمُعَادِلَاتِ، ثُمَّ أَحْلُّهَا لِإِيجادِ قِيمَةِ المُتَغَيِّرِ الثَّانِي، ثُمَّ أَكْتُبُ الْحَلَّ فِي صُورَةِ زَوْجٍ مَرْتَبٍ.

## مَثَلٌ 1

أَسْتَعْمِلُ الحذفَ لِحلِّ نَسْطَلَةِ المُعَادِلَاتِ الآتِيَّةِ:

$$5x + y = 22$$

$$2x - y = 6$$

بِمَا أَنَّ مَعَامِلَيْ لِلْمُعَادِلَتَيْنِ كُلُّهُمَا مَعْكُوسٌ لِلآخَرِ، فَهَذَا يَعْنِي أَنَّنِي لَسْتُ بِحَاجَةٍ إِلَى ضَرِبِ أَيِّ مِنَ الْمُعَادِلَاتِ بِثَابِتٍ؛ إِذْنَ أَنْتَقُلُ مِبَاشِرَةً إِلَى الخطوةِ الثَّانِيَةِ.

## الخطوة 1

## الوحدة 6

الخطوة 2 **أجمع المعادلتين.**

$$\begin{array}{r} 5x + y = 22 \\ (+) \quad 2x - y = 6 \\ \hline 7x = 28 \end{array}$$

أحذف المتغير  $y$

أقسم طرفي المعادلة على 7

أبسط

أعوض 4 بدلاً من  $x$  في إحدى المعادلتين؛ لإيجاد قيمة  $y$ .

الخطوة 3

$$\begin{array}{r} 5x + y = 22 \\ 5(4) + y = 22 \\ 20 + y = 22 \\ 20 - 20 + y = 22 - 20 \\ y = 2 \end{array}$$

المعادلة الأولى

أعوض عن  $x$  بـ 4

أبسط

أطرح 20 من كلا الطرفين

أبسط

إذن، حلّ النظام هو (2, 4).

**التحقق:** أتحقق من صحة الحل بتعويض الزوج المرتب في كل من معادلتي النظام.

**تحقق من فهمي:**

أحل كلاً من أنظمة المعادلات الآتية باستعمال الحذف:

1  $2x + y = 7$   
 $5x - y = 14$

2  $3x + 2y = 16$   
 $6y - 3x = -12$

يمكنني استعمال الطرح لحل نظام معادلات خطية مكون من معادلتين خطيتين، وذلك عندما يكون في المعادلتين حدان متشابهان معاملهما متساويان.

أستعمل الحذف لحل نظام المعادلات الآتي:

$$12x + 2y = 30$$

$$8x + 2y = 22$$

الخطوة 1 **الاحظ أن كلا المعادلتين تحويان  $y$ ، وهذا يعني أنني لست بحاجة إلى ضرب أيٍ من المعادلتين بثابتٍ، وأنه يمكن حل النظام بطرح إحدى المعادلتين من الأخرى.**

الخطوة 2 **أطرح معادلة من الأخرى.**

$$\begin{array}{r} 12x + 2y = 30 \\ (-) \quad 8x + 2y = 22 \\ \hline 4x \quad \quad = 8 \end{array}$$

أحذف المتغير  $y$

$$\frac{4x}{4} = \frac{8}{4}$$

أقسم طرفي المعادلة على 4

$$x = 2$$

أبسط

الخطوة 3 **أعوض 2 بدلاً من  $x$  في إحدى المعادلتين؛ لإيجاد قيمة  $y$ .**

$$\begin{array}{r} 12x + 2y = 30 \quad \text{المعادلة الأولى} \\ 12(2) + 2y = 30 \quad \text{أعوض عن } x \text{ بـ 2} \\ 24 + 2y = 30 \quad \text{أبسط} \\ 24 - 24 + 2y = 30 - 24 \quad \text{أطرح 24 من كلا الطرفين} \\ 2y = 6 \quad \text{أبسط} \\ \frac{2y}{2} = \frac{6}{2} \quad \text{أقسم طرفي المعادلة على 2} \\ y = 3 \quad \text{أبسط} \end{array}$$

إذن، حل النظام هو  $(2, 3)$ .

**التحقق:** أتحقق من صحة الحل بتعويض الزوج المرتب في كل من معادلتي النظام.

## الوحدة 6

أتحقق من فهمي:



أحل كلاً من أنظمة المعادلات الآتية باستعمال الحذف:

1  $2x + 5y = 16$   
 $2x + 3y = 18$

2  $3x - 4y = 17$   
 $x - 4y = 3$

أحتاج في بعض حالات حل أنظمة المعادلات الخطية إلى ضرب إحدى المعادلتين في عدد ثابت، للحصول على معادلتين فيهما حدان متشابهان معامل أحدهما معكوس للأخر.

### مثال 3

أستعمل الحذف لحل نظام المعادلات الآتي:

$$3x + 2y = 18$$

$$2x - y = 5$$

1 أضرب المعادلة الثانية في 2

$$3x + 2y = 18$$

$$2x - y = 5$$

$$3x + 2y = 18$$

$$4x - 2y = 10$$

2 أجمع المعادلتين.

$$3x + 2y = 18$$

$$\begin{array}{r} (+) \quad 4x - 2y = 10 \\ \hline 7x \quad = 28 \end{array}$$

أحذف المتغير  $y$

$$\frac{7x}{7} = \frac{28}{7}$$

أقسم طرفي المعادلة على 7

$$x = 4$$

أبسط

3

أعوّض 4 بدلاً من  $x$  في إحدى المعادلتين؛ لإيجاد قيمة  $y$ .

$$2x - y = 5$$

المعادلة الثانية

$$2(4) - y = 5$$

أعوّض عن  $x$  بـ 4

$$8 - y = 5$$

أبسط

$$8 - 8 - y = 5 - 8$$

أطرح 8 من كلا الطرفين

$$-y = -3$$

أبسط

$$\frac{-y}{-1} = \frac{-3}{-1}$$

أقسم طرفي المعادلة على -1

$$y = 3$$

أبسط

إذن، حلّ النظام هو (4, 3).

**التحقق:** أتحقق من صحة الحل بتعويض الزوج المرتب في كل من معادلتي النظام.

**تحقق من فهمي:** 

أحل كلاً من أنظمة المعادلات الآتية باستعمال الحذف:

1  $5x + 2y = 4$

2  $3x + 5y = 15$

$$4x - y = 11$$

$$x + 3y = 7$$

أحتاج في بعض حالات حل أنظمة المعادلات الخطية إلى ضرب كل معادلة في عدد ثابت مختلف للحصول على معادلتين فيهما حدين متباينان معامل أحدهما معكوس للآخر.

**مثال 4**

استعمل الحذف لحل نظام المعادلات الآتي:

$$4x + 3y = 27$$

$$5x - 2y = 5$$

## الوحدة 6

أضرب المعادلة الأولى في 2 والمعادلة الثانية في 3؛ لأحذف المتغير  $y$

1

الخطوة

$$4x + 3y = 27$$

أضرب كل حد في 2

$$8x + 6y = 54$$

$$5x - 2y = 5$$

أضرب كل حد في 3

$$15x - 6y = 15$$

### التعلم

يمكن أيضًا حل النظام بحذف المتغير  $x$ ، فمثلاً: يمكنني ضرب المعادلة الأولى في 5 وضرب المعادلة الثانية في 4

أجمع المعادلتين.

2

الخطوة

$$8x + 6y = 54$$

$$\begin{array}{r} (+) \quad 15x - 6y = 15 \\ \hline 23x \quad = 69 \end{array}$$

$$\frac{23x}{23} = \frac{69}{23}$$

$$x = 3$$

أحذف المتغير  $y$

أقسم طرفي المعادلة على 23

أبسط

أعوض 3 بدلاً من  $x$  في إحدى المعادلتين؛ لإيجاد قيمة  $y$ .

3

الخطوة

$$5x - 2y = 5$$

المعادلة الثانية

$$5(3) - 2y = 5$$

أعوض عن  $x$  بـ 3

$$15 - 2y = 5$$

أبسط

$$15 - 15 - 2y = 5 - 15$$

أطرح 15 من كلا الطرفين

$$-2y = -10$$

أبسط

$$\frac{-2y}{-2} = \frac{-10}{-2}$$

أقسم طرفي المعادلة على -2

$$y = 5$$

أبسط

إذن، حل النظام هو (3, 5).

**التحقق:** أتحقق من صحة الحل بتعويض الزوج المرتب في كل من معادلتي النظام.

**أتحقق من فهمي:**



أحل كلاً من أنظمة المعادلات الآتية باستعمال الحذف:

1  $2x + 5y = 15$

$$3x - 2y = 13$$

2  $5x - 3y = 14$

$$4x - 5y = 6$$

يمكن استعمال الحذف لحل مسائل حياتية وعلمية تتضمن نظاماً من معادلتين خطيتين بمتغيرين.



### مثال 5: من الحياة



**وظيفة:** يعمل ماجد وحازم أثناء عطلة الجامعة في محطتين مختلفتين لوقود السيارات، ويتقاضى كل منهما أجنته على عدد ساعات العمل. في أحد الأيام عمل ماجد 6 ساعات وعمل حازم 7 ساعات، فكان مجموع ما تقاضاه معاً 36 JD، وفي اليوم التالي عمل ماجد 8 ساعات وعمل حازم 6 ساعات، فكان مجموع ما تقاضاه معاً 38 JD. كم يتتقاضى كل منهما عن كل ساعة عمل؟

لتكن  $x$  الأجرة التي يتتقاضاها ماجد عن كل ساعة عمل، و $y$  الأجرة التي يتتقاضاها حازم عن كل ساعة عمل.

إذن، نظام المعادلات الذي يعبر عن المسألة هو:

$$6x + 7y = 36$$

$$8x + 6y = 38$$

أضرب المعادلة الأولى في 4 والمعادلة الثانية في -3؛ لأحذف المتغير  $x$ .

$$6x + 7y = 36$$

أضرب كل حد في 4

$$24x + 28y = 144$$

$$8x + 6y = 38$$

أضرب كل حد في -3

$$-24x - 18y = -114$$

### التعلم

يمكن أيضا حل النظام بحذف المتغير  $y$ ، فمثلاً: يمكنني ضرب المعادلة الأولى في 6 وضرب المعادلة الثانية في -7

$$24x + 28y = 144$$

$$(+) \quad -24x - 18y = -114$$

$$10y = 30$$

$$\frac{10y}{10} = \frac{30}{10}$$

$$y = 3$$

أجمع المعادلين.

2

أحذف المتغير  $x$

أقسم طرفي المعادلة على 10

أبسط

## الوحدة 6

3 **الخطوة** أَعْوَضُ 3 بَدْلًا مِنْ  $y$  فِي إِحْدَى الْمَعَادِلَتَيْنِ؛ لِإِيجَادِ قِيمَةِ  $x$ .

$$6x + 7y = 36$$

الْمَعَادِلَةُ الْأَوَّلَى

$$6x + 7(3) = 36$$

أَعْوَضُ عَنْ  $y$  بِ3

$$6x + 21 = 36$$

أَبْسَطُ

$$6x + 21 - 21 = 36 - 21$$

أَطْرُحُ 21 مِنْ كِلَّ الْطَرَفَيْنِ

$$6x = 15$$

أَبْسَطُ

$$\frac{6x}{6} = \frac{15}{6}$$

أَقْسُمُ طَرَفِيَّ الْمَعَادِلَةِ عَلَى 6

$$x = 2.5$$

أَبْسَطُ

أَيْ إِنَّ مَاجِدًا يَتَقَاضِي 2.5 JD عَنْ كُلِّ سَاعَةِ عَمَلٍ، أَمَّا حَازِمٌ فَيَتَقَاضِي 3 JD عَنْ كُلِّ سَاعَةِ عَمَلٍ.

**أَتَحَقُّ مِنْ فَهْمِي؟**



حَافَلَةٌ فِيهَا رَكَابٌ مِنَ النِّسَاءِ وَالْأَطْفَالِ، إِذَا كَانَ ثَلَاثُ أَمْثَالٍ عَدُدِ النِّسَاءِ مُضَافًا إِلَيْهِ مُثْلًا عَدُدِ الْأَطْفَالِ يُسَاوِي 29، وَكَانَ مِثْلًا عَدُدِ النِّسَاءِ مُضَافًا إِلَيْهِ عَدُدِ الْأَطْفَالِ يُسَاوِي 17، فَكَمِ امْرَأَةً وَكَمْ طَفْلًا فِي الْحَافَلَةِ؟

**أَتَحَرِّبُ**  
**وَأَحْلِ الْمَسَائِلِ**



أَحْلُ كُلَّا مِنْ أَنْظَمِ الْمَعَادِلَاتِ الْأَتَيَّةِ بِاسْتِعْمَالِ الْحَذْفِ:

1  $4x - y = -2$

$$2x + y = 8$$

2  $3x + y = 4$

$$5x + y = 6$$

3  $6x + 2y = 14$

$$3x - 5y = 10$$

4  $11x - 20y = 28$

$$3x + 4y = 36$$

5  $-2x - 5y = 9$

$$3x + 11y = 4$$

6  $y + 2x = 4$

$$x - y = 5$$

7  $2x + 3y = 30$

$$5x + 7y = 71$$

8  $3x - 4y = 4.5$

$$x + y = 5$$

9  $0.5x - 9y = 28$

$$30.5x + 7y = 40$$

**إِرْشَادٌ**

تَرْتِيبُ الْحَدُودِ الْمُتَشَابِهَةِ فِي الْمَعَادِلَتَيْنِ تَحْتَ بَعْضِهِمَا بَعْضًا يَسْهُلُ حَلَّ نَظَامِ الْمَعَادِلَاتِ.

10  $8x + y = 1$   
 $8x - y = 3$

11  $12x - 7y = -2$   
 $8x + 11y = 30$

12  $9x + 2y = 39$   
 $6x + 13y = -9$



**طقسُ:** لاحظ راصدُ جوّيُّ أنَّ عددَ الأَيَّامِ مِنْ شَهْرِ كانونِ الأوَّلِ الَّتِي تساقطَتْ فِيهَا الأمَطَارُ يُزِيدُ 7 أَيَّامٍ عَنْ تَلْكَ الَّتِي لَمْ تَساقطْ فِيهَا الأمَطَارُ. أَكْتُبْ نَظَامًا مِنْ مَعَادِلَتَيْنِ يُمْثِلُ الْمَسَأَلَةَ، ثُمَّ أَحْلُهُ لِأَجْدَعَدَ الأَيَّامِ الَّتِي تساقطَتْ فِيهَا الأمَطَارُ وَعَدَدَ الأَيَّامِ الَّتِي لَمْ تَساقطْ فِيهَا الأمَطَارُ فِي هَذَا الشَّهْرِ.

أُرْبِطُ كُلَّ زَوْجٍ مَرْتَبٍ مَعَ نَظَامِ مَعَادِلَاتٍ خَطِّيَّةٍ مَكْوَنٍ مِنْ مَعَادِلَتَيْنِ مِنَ الْمَعَادِلَاتِ الْأَرْبَعِ الْمُعْطَاءِ، بِحِيثُ يَكُونُ الزَّوْجُ الْمَرْتَبُ حَلًّا لِلْمَعَادِلَتَيْنِ:

الْمَعَادِلَاتُ
$5x + 2y = 1$
$4x + y = 9$
$3x - y = 5$
$3x + 2y = 3$

الزَّوْجُ الْمَرْتَبُ
(1, -2)
(-1, 3)
(2, 1)
(3, -3)

13

أَفْكُرْ  
 كَمْ يَوْمًا فِي شَهْرِ كانونِ الأوَّلِ؟



14

**أَعْدَادُ:** ثَلَاثَةُ أَمْتَالٍ عَدَدٍ مَطْرُوحًا مِنْهَا عَدَدٌ آخَرُ يُسَاوِي 3، إِذَا كَانَ مَجْمُوعُ الْعَدَدَيْنِ يُسَاوِي 11، فَمَا الْعَدَدَانِ؟



**مَوَادٌ غَذَائِيَّةٌ:** فِي مَخْرِنِ أَحَدِ الْمَطَاعِمِ مَجْمُوعَةٌ مِنْ أَكِيَاسِ الْأَرْزِ وَأَكِيَاسِ السُّكَّرِ. كَتْلَةُ 3 أَكِيَاسٍ مِنَ السُّكَّرِ وَ4 أَكِيَاسٍ مِنَ الْأَرْزِ kg 12، وَكَتْلَةُ 5 أَكِيَاسٍ مِنَ السُّكَّرِ وَكَيْسَيْنِ مِنَ الْأَرْزِ kg 13. كَيْفَ يَمْكُنُ مَسَاعِدُ طَبَّاخِ الْمَطَاعِمِ عَلَى إِيجَادِ كَتْلَةٍ كَيْسَيْنِ مِنَ السُّكَّرِ وَخَمْسَةِ أَكِيَاسٍ مِنَ الْأَرْزِ؟

15

مَعْلَوْمَةٌ

يُفَضَّلُ تَخْزِينُ الْحَبَوبِ فِي مَكَانٍ جَافٍ بَعِيدًا عَنْ أَشْعَرِ الشَّمْسِ الْمُبَارِثَةِ؛ حَفَاظًا عَلَيْهَا مِنَ التَّلَفِ.

## الوحدة 6



**مبني حكومي**: يبلغ ارتفاع مبني حكومي مع سارية العلم الأردني المثبتة على سطحه 21.6 m، إذا كان ارتفاع المبني مطروحاً منه ارتفاع سارية العلم يُساوي 10.4 m، فما ارتفاع المبني؟ وكم يبلغ طول سارية العلم؟

17

أعود إلى فقرة (أستكشف) بداية الدرس، وأحل المسألة.

18

**اكتشف الخطأ**: أنظر الحل الآتي وأكتشف الخطأ الوارد فيه، وأصححه.

19

مهارات التفكير العليا

$$\begin{array}{r} 4x + 3y = 8 \\ x - 2y = -13 \end{array}$$

أضرب في -4

$$\begin{array}{r} 4x + 3y = 8 \\ -4x + 8y = -13 \\ \hline 11y = -5 \\ y = \frac{-5}{11} \end{array}$$

**X**

**مسألة مفتوحة**: أقترح قيمة  $a$  تجعل لنظام المعادلات الآتي حلّاً، وأبرر إجابتي.

20

$$\begin{array}{l} x + y = 4 \\ ax + 3y = 4 \end{array}$$

**تحدى**: أجد عدد من منزلتين مجموع رقمهما 8، ورقم آحاده مضاعفاً إلى مثليه رقم

21

عشراته يساوي 10

**أكتب** كيف أجد حل نظام معادلات خطية مكون من معادلتين بالحذف؟

22

# اختبار نهاية الوحدة

أحل كلاً من أنظمة المعادلات الآتية بيانياً:

5)  $y = 2x - 5$   
 $y = -2x + 7$

6)  $y = x + 4$   
 $y = 2x + 1$

7)  $x + 2y = 3$   
 $y = 4x - 3$

8)  $y = 4 - x$   
 $y = x - 4$


9)  $y = 0.5x + 10$   
 $y = 4x - 4$

10)  $y + x = 0$   
 $3y + 6x = -9$

11)  $7x + 2y = 13$   
 $3y - 2x = -3$

12)  $y - x = 17$   
 $y = 4x + 2$

استعمل التمثيل البياني أدناه، لأحدد ما إذا كان لكل من أنظمة المعادلات الآتية حل واحد، أم لا يوجد له حل، أم له عدد لانهائي من الحلول:



13)  $x = -3$   
 $y = 2x + 1$

14)  $y = 2x + 1$   
 $y = 2x - 4$

15)  $y + x = -2$   
 $y = -x - 2$

16)  $2y - 4x = 2$   
 $y = 2x - 4$

17)  $y = -3x + 6$   
 $y = 2x - 4$

18)  $2y - 4x = 2$   
 $y = -3x + 6$

أختار رمز الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي:

1) حل نظام المعادلات الآتي هو:

$x + y = 6$

$x - y = 8$

a)  $(2, 4)$

b)  $(4, 2)$

c)  $(7, -1)$

d)  $(-1, 7)$

2) حل نظام المعادلات الآتي هو:

$y = -4x$

$6x - y = 30$

a)  $(3, 4)$

b)  $(3, -4)$

c)  $(3, 12)$

d)  $(3, -12)$

3) أي أنظمة المعادلات الآتية له عدد لانهائي من الحلول؟

a)  $x + y = 1$

b)  $2y = 4x + 1$

$x - y = 3$

$x - 2y = 7$

c)  $2x - y = 6$

d)  $5x = y + 5$

$-3y = -6x + 18$

$-x + 3y = 13$

4) أي المعادلات الآتية لها التمثيل البياني نفسه للمعادلة

$4x + 8y = 12$

a)  $x + y = 3$

b)  $2x + y = 3$

c)  $x + 2y = 3$

d)  $2x + 3y = 6$

سُجّلَ أحدُ لاعبي كرة القدم في الدّوري 10 أهداف.

إذا كانَ مثلاً عدد ما سُجّله في مرحلة الذهاب يساوي ثلاثة أمثال عدد ما سُجّله في مرحلة الإياب، فأكتب نظاماً معادلات خطية مكوناً من معادلتين خطيتين يمثلُ المسألة، ثمَّ أحلُّه لأجدَ ما سُجّله اللاعب في كلِّ من مراحلِ الذهاب والإياب.

### تدريبٌ على الاختبارات الدوليّة

أيُّ المعادلات الآتية يتُجُّزَّع عن تمثيلها في المستوى

$$?y - 3x = 6$$
 الإحداثي مستقيم موازٍ للمسقّي  $6$

a)  $y = -3x + 4$  b)  $y = 3x - 2$

c)  $y = \frac{1}{3}x + 6$  d)  $y = -\frac{1}{3}x + 6$

كم حلاً لنظام المعادلات الآتي؟

$$4x + y = 7$$

$$3x - y = 0$$

(b) حلٌ واحدٌ فقط

(a) لا يوجد حلٌ واحدٌ فقط

(c) عدد لا نهائيٍ من الحلول d) حلانٍ

حلٌّ نظام المعادلات الآتي هو:

$$2x - 3y = -9$$

$$-x + 3y = 6$$

a)  $(3, 3)$

b)  $(3, -1)$

c)  $(-3, 1)$

d)  $(1, -3)$

أحلُّ كلاً من أنظمة المعادلات الآتية باستعمال التعويض:

19)  $y = x + 3$

$$2x + y = 12$$

21)  $x = 2y + 7$

$$3x - 2y = 3$$

20)  $x - 2y = 6$

$$2x + y = 2$$

22)  $4x - 2y = 14$

$$y = 0.5x - 1$$

أحلُّ كلاً من أنظمة المعادلات الآتية باستعمال الحذف:

23)  $3x + y = 20$

$$2x - y = 5$$

24)  $x - 6y = 4$

$$2x + y = -5$$

25)  $3x - 2y = 4$

$$6x - 2y = -2$$


26)  $5y = 15 - 5x$

$$y = -2x + 3$$

يبين الشكل أدناه مستطيلاً محيطه  $40\text{ m}$ ، إذا كانَ

طول المستطيل يقلُّ عن مثليٍ عرضه، فأكتب نظاماً من معادلتين خطيتين يمثلُ المسألة، ثمَّ أحلُّه

لأجدَ بُعدَي المستطيل.



باعَ محلٌ كميّةً من خليطٍ مكّسّرات اللوز والفستق

تبلغُ قيمتها  $27\text{ JD}$ ، ويبينُ الجدول الآتي سعرَ الأوقيّة

الواحدةِ من كُلِّ نوعٍ في الخليط:



النوع	سعر الأوقيّة
الفستق	JD 4
اللوز	JD 1.5

إذا كانتْ كميّة الفستق تُساوي ثلاثة أمثال كميّة اللوز في الأوقيّة الواحدة في الخليط المبيع، فأجدُ كميّة كُلِّ من اللوز والفستق المبيعة.

## الأشكال ثنائية الأبعاد

## ما أهمية هذه الوحدة؟

للأشكال الهندسية أنواع كثيرة وخصائص لا يمكن حصرها؛ لذا تستعمل في مجالاتٍ حياتية وعلميةٍ شتى. ولا يمكن إنتاج أي تصميمٍ أو عملٍ فنيٍ أو معماريٍ من دون استعمال خصائص الأشكال الهندسية، وهذا يعني أنه لا بدَّ من فهم هذه الخصائص قبل البدء بأي تصميم.



## سأتعلم في هذه الوحدة:

- تحديد المثلثات المتشابهة باستعمال حالات التشابه AA و SS و SAS.
- خصائص أضلاع وزوايا وأقطار متوازي الأضلاع، وحالاتِ الخاصة.
- رسم صورة مصلع تحت تأثير تمدد في المستوى الإحداثي.

## تعلمت سابقاً:

- ✓ تصنيف الأشكال رباعية حسب خواصها الأساسية.
- ✓ العلاقة بين الأضلاع والزوايا المتناظرة في مصلعين متشابهين.
- ✓ رسم مصلع تحت تأثير تكبير.

# مشروع الوحدة: المِنسَاخُ



أثقبُ الطرفَ الآخَرَ فِي كُلِّ مِنَ الْقُطْعَتَيْنِ الْقُصِيرَتَيْنِ، وأُضْعِفُ إِحْدَاهُمَا فَوْقَ الْأُخْرَى بِحِيثُ يَنْطَبِقُ التَّقْبَانِ، ثُمَّ أثقبُ الطرفَ الآخَرَ لِكُلِّ مِنَ الْقُطْعَتَيْنِ الطَّوِيلَتَيْنِ.

4

أَرْسِمُ عَلَى وَرْقَةٍ خَارِجِيَّةٍ مُتَوَازِيَّةً أَضْلاعًا بِأَبعَادٍ مُحَدَّدَةٍ، وأُضْعِفُ الْوَرْقَةَ تَحْتَ أَحَدِ الْقَلَمِيِّ الرِّصَاصِ، وَأَتَبِعُ مُحِيطَ الْمُتَوَازِيَّ، ثُمَّ أَلَاحِظُ الرَّسَمَ النَّاتِجَ مِنَ الْقَلَمِ الْآخَرِ.

5

أَحَدَّدُ الْعَلَاقَةَ بَيْنَ الرَّسَمَيْنِ مِنْ حِيثُ: أَطْوَالُ الْأَضْلاعِ، وَقِيَاسَاتُ الزَّوَالِيَا.


6

أَكْرِرُ الْخَطْوَتَيْنِ 8 وَ 9 بِالْخَتِيارِ أَشْكَالٍ رِبَاعِيَّةٍ مُخْتَلِفَةٍ.

7

## عرض النتائج:

- أَعْرُضُ الْمِنْسَاخَ الَّذِي صَمَمْتُهُ أَمَامَ طَلَبَةِ صَفِّيٍّ، وَأَوْضُعُ أَهْمَيَّتَهُ وَعَلَاقَتَهُ بِمَا تَعْلَمْتُهُ فِي الْوَحْدَةِ.
- أَعْدُّ عَرْضًا تَقْدِيمِيًّا، وَأَتَحْدُثُ بِالْتَفْصِيلِ عَنْ خَطُواتِ تَصْمِيمِ الْمِنْسَاخِ وَالنَّتَائِجِ الَّتِي تَوَصَّلْتُ إِلَيْهَا.



أَسْتَعِدُ وَمَجْمُوعَتِي لِتَنْفِيذِ مَشْرُوْعِنَا الْخَاصِّ، الَّذِي سُنُوْفَ فِيهِ مَا نَعْلَمُ فِي هَذِهِ الْوَحْدَةِ لِتَصْمِيمِ أَدَاءٍ هَنْدَسِيٍّ تُسَمَّى الْمِنْسَاخُ.

## المُوَادُّ وَالْأَدَوَاتُ:

- لَوْحَتَانِ مِنَ الْكَرْتُونِ الْمَقْوَى.
- وَرْقَةٌ كَبِيرَةٌ.
- دَبَابِيسُ وَمِثْقَبُ.
- مَسْطَرَةٌ وَمِقْصُّ.

## خُطُواتُ تَنْفِيذِ الْمَشْرُوْعِ:

أَشَاهِدُ الْمَقْطَعَ الْمَرْئِيَّ (الْفِيَدِيُو) فِي الرَّمْزِ الْمَجَاوِرِ، ثُمَّ أَفْنَدُ الْخَطُواتِ الْآتِيَّةَ:

أَقْصُ أَرْبَعَ قَطْعَ مُسْتَطِيلَةَ الشَّكْلِ مِنَ الْكَرْتُونِ الْمَقْوَى: قَطْعَتَيْنِ طُولُ كُلِّ مِنْهُمَا 20 cm، وَقَطْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ طُولُ كُلِّ مِنْهُمَا 10 cm، وَعَرْضُ كُلِّ قَطْعَةٍ مِنْهَا 2.5 cm.

أَسْتَعِمُلُ الْمِثْقَبَ لِصُنْعِ فَتْحَاتِ فِي طَرْفِ كُلِّ مِنَ الْقُطْعَتَيْنِ الطَّوِيلَتَيْنِ، وَأَرْبَطُ بَيْنَهُمَا مِنْ خَلَالِ التَّقْبَيْنِ بِاسْتِعْمَالِ الدَّبَابِيسِ.

أَسْتَعِمُلُ الْمِثْقَبَ لِصُنْعِ فَتْحَاتِ فِي مِنْتَصِفِ كُلِّ مِنَ الْقُطْعَتَيْنِ الطَّوِيلَتَيْنِ وَطَرْفِ كُلِّ مِنَ الْقُطْعَتَيْنِ الْقُصِيرَتَيْنِ، وَأَصْلُ بَيْنَ الْقُطْعَتَيْنِ الْقُصِيرَتَيْنِ وَالْطَّوِيلَتَيْنِ بِالدَّبَابِيسِ.



## أستكشف

يبين الشكل المجاور سلماً كل درجة من درجاته عمودية على الدعامتين الرئيسيتين.

(1) هل الدعامتان الرئيسيتان متوازيتان؟ أبّرر إجابتي.

(2) هل الدرجات جميعها متوازية؟ أبّرر إجابتي.


## فكرة الدرس

أميّز المستقيمات المتوازية بناءً على علاقاتٍ يَبَينَ أزواجٍ من الروايا الناتجة عن مستقيمين قاطعين.

تعلّمتُ سابقاً أنَّه إذا قطع مستقيمٌ مستقيمين متوازيين في المستوى نفسه، فإنَّ هذا يقودُ إلى النظريات الآتية حول العلاقة بين أزواج الروايا الناتجة عن هذا التقاطع.

## نظريات المستقيمين المتوازيين وأزواج الزوايا

## مراجعة المفهوم




## • مسلمةُ الزاويتين المتناظرتين

إذا قطع قاطعٌ مستقيمين متوازيين، فإنَّ كُلَّ زاويتين متناظرتين متطابقتان.

$$\angle 3 \cong \angle 7 \text{ و } \angle 4 \cong \angle 8 \text{ و } \angle 2 \cong \angle 6 \text{ و } \angle 1 \cong \angle 5$$

مثالُ:




## • نظريةُ الزاويتين المترادفتينِ داخليةً

إذا قطع قاطعٌ مستقيمين متوازيين، فإنَّ كُلَّ زاويتين مترادفتينِ داخليةً متطابقتان.

$$\angle 3 \cong \angle 5 \text{ و } \angle 4 \cong \angle 6$$

مثالُ:




## • نظريةُ الزاويتين المترادفتينِ متحالفتين

إذا قطع قاطعٌ مستقيمين متوازيين، فإنَّ كُلَّ زاويتين مترادفتين متحالفتين متكاملتان.

$$m\angle 4 + m\angle 5 = 180^\circ$$

مثالُ:

$$m\angle 3 + m\angle 6 = 180^\circ$$



## • نظريةُ الزاويتين المترادفتينِ خارجيةً

إذا قطع قاطعٌ مستقيمين متوازيين، فإنَّ كُلَّ زاويتين مترادفتين خارجيةً متطابقتان.

$$\angle 2 \cong \angle 8 \text{ و } \angle 1 \cong \angle 7$$

مثالُ:

## الوحدة 7


سأتعلم في هذا الدرس كيفية استعمال أزواج الزوايا الناتجة عن مستقيمين يقطعُهما قاطعٌ في المستوى نفسه لإثبات توازيهما، فمثلاً، تكون الزوايا المتناظرة متطابقة حين يكون المستقيمان متوازيين، وعكسُ هذه المسلممة صحيح أيضاً.

### المسلممة



#### عكس مسلممة الزاويتين المتناظرتين

إذا قطع قاطعَ مستقيمين، ونتج عن التقاطع زاويتان متناظرتان متطابقتان، فإنَّ المستقيمين متوازيان.




مثال: إذا كانت  $\angle 2 \cong \angle 6$  فإن  $\ell \parallel m$

### مثال 1

أجد قيمة  $x$  التي تجعل  $n \parallel m$ .

يكون المستقيمان  $m$  و  $n$  متوازيين إذا كانت الزاويتان المتناظرتان متطابقتين.



$$(2x + 5)^\circ = 65^\circ$$

أستعمل عكس مسلممة الزاويتين المتناظرتين لكتابة معادلة

$$2x + 5 = 65$$

أكتب المعادلة من دون رمز الدرجة

$$2x = 60$$

أطرح 5 من طرفِ المعادلة

$$x = 30$$


أقسم طرفِ المعادلة على 2

إذن، قيمة  $x$  التي تجعل المستقيمان  $m$  و  $n$  متوازيين تساوي 30

### أتحقق من فهمي:




أجد قيمة  $x$  التي تجعل  $n \parallel m$ .




يمكن أن تحدّد أزواج الزوايا الناتجة عن مستقيمين يقطعُهما قاطعٌ في المستوى نفسه ما إذا كان المستقيمان متوازيين أم لا.

عكس نظريات المستقيمين المتوازيين وأزواج الزوايا




- **عكس نظرية الزاويتين المترادفتين داخلية**  
إذا قطع قاطعٌ مستقيميْن، ونَتَجَ عَنِ التَّقاطِعِ زَوْيَيْنِ مَتَرَادِفَتَيْنِ دَاخِلِيَّاً مُتَطَابِقَتَيْنِ، فَإِنَّهُمَا مُتَوَازِيَّاً.

**مثال:** إذا كانت  $\angle 4 \cong \angle 6$  فإن  $\ell \parallel m$



- **عكس نظرية الزاويتين المترادفتين متكاملتين**  
إذا قطع قاطعٌ مستقيميْن، ونَتَجَ عَنِ التَّقاطِعِ زَوْيَيْنِ مَتَرَادِفَتَيْنِ مُتَكَامِلَتَيْنِ، فَإِنَّهُمَا مُتَوَازِيَّاً.

**مثال:** إذا كانت  $m\angle 3 + m\angle 6 = 180^\circ$  فإن  $\ell \parallel m$



- **عكس نظرية الزاويتين المترادفتين خارجيًّا**  
إذا قطع قاطعٌ مستقيميْن، ونَتَجَ عَنِ التَّقاطِعِ زَوْيَيْنِ مَتَرَادِفَتَيْنِ خَارِجِيًّا مُتَطَابِقَتَيْنِ، فَإِنَّهُمَا مُتَوَازِيَّاً.

**مثال:** إذا كانت  $\angle 1 \cong \angle 7$  فإن  $\ell \parallel m$

يمكن استعمال **عكس مسلمة الزاويتين المترادفتين** لإثبات النظريات السابقة.

**مثال 2: إثبات نظرية**




في الشكل المجاور، إذا كان  $\angle 5 \cong \angle 4$  فإن  $g \parallel h$  باستعمال المخطط السهمي.

أخطُطُ للحل باتباع الخطوات الآتية:

**الخطوة 1** أسمّي  $\angle 1$  التي تقابل بالرأس  $\angle 4$

أستعمل تطابق الزوايا الناتج عن التقابل بالرأس في إثبات توازي المستقيمين.



$\angle 4 \cong \angle 5$

معطى

$\angle 1 \cong \angle 5$

$g \parallel h$

$\angle 1 \cong \angle 4$


زاوياً مترادفان بالرأس

نتيجة

عكس مسلمة  
الزاويا المترادفتين


## الوحدة 7

### أتحقق من فهمي:



في الشكل المجاور، إذا كان  $\angle 7 \cong \angle 1$  فأثبت أن  $g \parallel h$  باستعمال المخطط السهمي.

### مثال 3



هل يمكن إثبات أن أيّاً من مستقيمات الشكل المجاور متوازيةً اعتماداً على المعطيات في كلٍّ مما يأتي؟ أبّرّر إجابتي باستعمال مسلمةٍ أو نظريةٍ.

1  $\angle 1 \cong \angle 8$

$\angle 1 \cong \angle 8$  متبادلان خارجيّاً بالنسبة لل المستقيمين  $a$  و  $b$ ، وبِما أن  $\angle 1 \cong \angle 8$  فإن  $a \parallel b$  بحسب عكس نظرية الزاويتين المتبادلتين خارجيّاً.

2  $m\angle 5 + m\angle 9 = 180^\circ$

$\angle 5$  و  $\angle 9$  متحالفتان بالنسبة لل المستقيمين  $m$  و  $\ell$ ، وبِما أن  $m\angle 5 + m\angle 9 = 180^\circ$  فإن  $m \parallel \ell$  بحسب عكس نظرية الزاويتين المتحالفتين.

### أتحقق من فهمي:

3  $\angle 7 \cong \angle 2$

4  $\angle 6 \cong \angle 12$

5  $m\angle 3 + m\angle 2 = 180^\circ$


في ما يأتي بعض النظريات المتعلقة بالمستقيمات المتعامدة، إضافةً إلى نظرياتٍ خاصةٍ تنتُج حينَ يكونُ قاطعاً المستقيمين عمودياً عليهما:

### نظريّة الزاويتين المجاورتين المتطابقتين

### نظريّة



#### • نظريّة الزاويتين المجاورتين المتطابقتين




إذا تقاطعَ مستقيمان لتشكيل زاويتينٍ متجاورتينٍ متطابقتينٍ، فإنَّ المستقيمان متعامدان.

**مثال:** إذا كانت  $\angle 2 \cong \angle 1$  فإن  $g \perp h$




## نظريّة القاطع العمودي وعكّسها



### • نظريّة القاطع العمودي

إذا كانَ مستقيّم عموديّاً على أحدِ مستقيّمين متوازيّين، فإنّه يكونُ عموديّاً على المستقيّم الآخر.


**مثال:** إذا كانَ  $k \parallel h$  و  $j \perp h$ ، فإنّ  $j \perp k$ .



### • عكّس نظريّة القاطع العمودي

إذا قطعَ قاطعُ مستقيّمين وكانَ عموديّاً على كُلّ منْهُما، فإنّ المستقيّمين متوازيان.


**مثال:** إذا كانَ  $m \parallel n$ ،  $p \perp m$  و  $p \perp n$ ، فإنّ  $p \perp m$ .




### مثال 4: إثبات نظريّة



أستعملُ المعلوماتِ المعطاة في الشكّل المجاورِ لأثبتَ أنّ  $r \parallel s$  باستعمالِ البرهانِ ذي العمودينِ.



المبرّرات	العبارات
(1) $\angle 1$ و $\angle 2$ قائمتانِ.	(1) معطى.
(2) الزوايا القائمةُ متطابقةٌ	$\angle 1 \cong \angle 2$ (2)
(3) عكّس مسلّمة الزاويتين المتناظرتينِ	$r \parallel s$ (3)



### أتحققُ من فهمي:








أستعملُ المعلوماتِ المعطاة في الشكّل المجاورِ؛ لأثبتَ أنّ  $k \perp j$  باستعمالِ البرهانِ ذي العمودينِ.

## الوحدة 7

### أتدرب وأحل المسائل



أجد قيمة  $x$  التي تجعل  $m \parallel n$  في كل مما يأتي:




5  $\angle 2 \cong \angle 8$

6  $\angle 9 \cong \angle 15$

7  $\angle 6 \cong \angle 16$

8  $m\angle 10 + m\angle 13 = 180^\circ$



**عریش خشبيٌ:** صممَ نجّار عريشاً خشبياً خاصاً بنمو النباتات المتسلقة يتكون من قطع خشبية مرتبة بشكل قطريٍّ:


يحتاج النجّار إلى أن تكون القطع الخشبية  $A$  و  $B$  و  $C$  متوازية، فكيف يتحقق ذلك من خلال  $\angle 1$  و  $\angle 2$  و  $\angle 3$ ؟

وصل النجّار القطعة الخشبية  $D$  بحيث تكون عمودية على القطعة الخشبية  $A$ ، فهل القطعة  $D$  عمودية على القطعتين  $B$  و  $C$ ، علمًا بأنّ النجّار جعل القطع الخشبية  $A$  و  $B$  و  $C$  متوازية؟ أبّرر إجابتي.


### أتذكر

أستعمل خصائص المساواة لحل معادلات تحتوي متغيرات في طرفيها.


في الشكل الآتي، إذا كانت  $\angle 1 \cong \angle 2$  و  $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$ ، فأثبت أن  $\angle 3 \cong \angle 4$  و استعمال البرهان السهمي.



أستعمل المعلومات المطلقة في الشكل الآتي؛ لأثبت أن  $\overline{KM} \parallel \overline{LN}$  باستعمال البرهان ذي العمودين.



**اكتشف الخطأ:** يقول زiad: بما أن  $z \perp x$  فإن  $z \parallel y$  في الشكل الآتي بحسب نظرية عكس القاطع العمودي. اكتشف الخطأ في ما يقوله زiad، وأصححه.



**تحدد:** أحدد المستقيمات المتوازية في الشكل الرباعي  $QLMN$  في كل مما يأتي،

وأبرر إجابتي:

14)  $m\angle Q = 72^\circ$ ,  $m\angle L = 108^\circ$ ,  $m\angle M = 72^\circ$ ,  $m\angle N = 108^\circ$

15)  $m\angle Q = 59^\circ$ ,  $m\angle L = 37^\circ$ ,  $m\angle M = 143^\circ$ ,  $m\angle N = 121^\circ$


### مهارات التفكير العليا

#### إرشاد

أرسم شكلًا توضيحيًا لكلٍ من الشكلين في الرباعيين الواردين في السؤالين 14 و 15 وفق المعلومات المطلقة.

أكتب كيف يمكن أن تحدد أزواج الزوايا الناتجة عن مستقيمان متوازيين يقطعهما قاطع في المستوى نفسه ما إذا كان المستقيمان متوازيين أم لا؟

16)



## استكشف

بيّن الشكل المجاور رافعة سيّاراتٍ:

(1) ما اسم الشكل الرباعي  $ABCD$ ؟

(2) ما العلاقة بين  $\angle A$  و  $\angle C$ ؟


(3) ما العلاقة بين  $\angle B$  و  $\angle D$ ؟

## فكرة الدرس

أتعلّم خصائص أضلاع وزوايا وأقطارٍ متوازي الأضلاع.

## المطلحات

متوازي الأضلاع، الزوايا المتحالفة



متوازي الأضلاع (parallelogram) هو شكل رباعي فيه كل ضلعين متقابلين


متوازيان، ويرمز إليه بالرمز  $\square$

في  $\square QRSP$  المبين جانبًا  $\overline{QR} \parallel \overline{PS}$  و  $\overline{PQ} \parallel \overline{SR}$  بحسب التعريف.

وتقديم النظريات الآتية خصائص أخرى لمتوازي الأضلاع.

## خصائص متوازي الأضلاع (1)


## نظريات



### نظريّة الأضلاع المتقابلة في متوازي الأضلاع

إذا كان الشكل الرباعي متوازي أضلاع، فإنَّ الأضلاع المتقابلة متطابقة.

**مثال:** إذا كان  $PQRS$  متوازي أضلاع، فإنَّ  $\overline{PQ} \cong \overline{SR}$ ,  $\overline{QR} \cong \overline{PS}$




### نظريّة الزوايا المتقابلة في متوازي الأضلاع

إذا كان الشكل الرباعي متوازي أضلاع، فإنَّ الزوايا المتقابلة متطابقة.

**مثال:** إذا كان  $PQRS$  متوازي أضلاع، فإنَّ  $\angle P \cong \angle R$ ,  $\angle Q \cong \angle S$

يمكن استعمال الخصائص السابقة لمتوازي الأضلاع لإيجاد قيمة مجهولة.

## مثال 1



أجد قيمة كل من  $x$  و  $y$  في الشكل المجاور.

بما أن كل ضلعين متقابلين متوابعين في الشكل الرباعي  $FKLM$  فإنه متوازي أضلاع، ومنه فإنه يمكنني استعمال نظرية الأضلاع المتقابلة في متوازي الأضلاع لإيجاد قيمة  $x$ .

$$\overline{FK} \cong \overline{ML}$$

$$FK = ML$$

$$x + 4 = 12$$

$$x = 8$$

الأضلاع المتقابلة في متوازي الأضلاع متطابقة

تعريف تطابق القطع المستقيمة

$$FK = x + 4, ML = 12$$

أطرح 4 من طرف المعادلة

إذن، قيمة  $x$  تساوي 8

ويمكنني إيجاد قيمة  $y$  باستعمال نظرية الزوايا المتقابلة في متوازي الأضلاع.

$$\angle F \cong \angle L$$

الزوايا المتقابلة في متوازي الأضلاع متطابقة

$$m\angle F = m\angle L$$

تعريف تطابق الزوايا

$$(5 + y)^\circ = 65^\circ$$

$$m\angle F = (5 + y)^\circ, m\angle L = 65^\circ$$


$$5 + y = 65$$

أكتب المعادلة من دون رمز الزاوية

$$y = 60$$

أطرح 5 من طرف المعادلة

إذن، قيمة  $y$  تساوي 60




أتحقق من فهمي:

أجد قيمة كل من  $g$  و  $h$  في الشكل المجاور.

تُسمى زوايا المضلع التي تشتراك في الضلع نفسه زوايا متحالفة (consecutive angles). فمثلاً، في الشكل المجاور  $\angle M$  و  $\angle N$  زوايا متحالفتان؛ لأنهما تشتراك في الضلع  $\overline{MN}$ .

وتقدم النظريات الآتية خصائص أخرى لمتوازي الأضلاع تتعلق بالزوايا المتحالفة.



## الوحدة 7

### خصائص متوازي الأضلاع (2)


### مفهوم أساسي



#### • نظرية الزوايا المترافقـة في متوازي الأضلاع

إذا كان الشكل الرباعي متوازي أضلاع، فإن كل زاويتين مترافقـتين متكاملـان.

**مثال:** إذا كان  $PQRS$  متوازي أضلاع، فإن  $x^\circ + y^\circ = 180^\circ$




#### • نظرية الزاوية القائمة في متوازي الأضلاع


إذا كانت إحدى زوايا متوازي الأضلاع قائمةً، فإن زواياه الأربع قوائم.

**مثال:** في  $\square PQRS$  إذا كانت  $\angle Q$  قائمةً فإن:

$\angle R, \angle S, \angle P$  قوائم أيضاً.



### مثال 2



في الشكل المجاور، إذا كان  $LMNP$  متوازي أضلاع، فأجد  $m\angle LMN$  و  $m\angle PLM$

• أجد  $m\angle PLM$

$$m\angle MNP = 66^\circ + 42^\circ = 108^\circ$$

أجمع قياسي الزاويتين

$$m\angle PLM = m\angle MNP$$

الزوايا المترافقـة في متوازي الأضلاع متطابـقة

$$m\angle PLM = 108^\circ$$

أعوّض  $m\angle MNP = 108^\circ$

إذن،  $m\angle PLM$  تساوي  $108^\circ$

• أجد  $m\angle LMN$

$$m\angle MNP + m\angle LMN = 180^\circ$$

زاويـتان مترافقـتان في متوازي أضلاع

$$108^\circ + m\angle LMN = 180^\circ$$


أعوّض  $m\angle MNP = 108^\circ$

$$m\angle LMN = 72^\circ$$


أطـرح  $108^\circ$  من كـلا الطرفـين

إذن،  $m\angle LMN$  تساوي  $72^\circ$

### أتحققُ من فهمي:



في الشكل المجاور، إذا كان  $JKLM$  متوازي أضلاع، فأجد  $m\angle MJK$  و  $m\angle JKL$



### مثال 3: من الحياة

إضاءة: يبيّن الشكل المجاور جزءاً من مصباح مكتب على شكل متوازي أضلاع، وتغيير زواياه عند رفعه وخفضه. أجد  $m\angle QRS$  إذا علمت أن  $m\angle PSR = 100^\circ$

$$m\angle QRS + m\angle PSR = 180^\circ$$

$$m\angle QRS + 100^\circ = 180^\circ$$

$$m\angle QRS = 80^\circ$$

زاوياً متحالفةان في متوازي أضلاع

$$m\angle PSR = 100^\circ$$

أطرح  $100^\circ$  من كلا الطرفين


### أتحققُ من فهمي:

افتراض أنَّ مصباح المكتب عدَّل لتصبح  $m\angle QRS = 86^\circ$ , أجد  $m\angle PSR$

تعلَّمْتُ في الأمثلة السابقة خصائص متوازي الأضلاع المتعلقة بزواياه، وهناك أيضاً بعض الخصائص المتعلقة بقطريه.

## قطراً متوازي الأضلاع


### نظريات



#### نظريَّة قطريٍّ متوازي الأضلاع

إذا كان الشكل الرباعي متوازي أضلاع، فإنَّ قطريه ينصف كُلَّ منهما الآخر.

مثال: إذا كان  $PQRS$  متوازي أضلاع، فإنَّ  $\overline{QM} \cong \overline{SM}$ ,  $\overline{PM} \cong \overline{RM}$




#### نظريَّة قطريٍّ متوازي الأضلاع

إذا كان الشكل الرباعي متوازي أضلاع، فإنَّ كُلَّ قطري يقسمه إلى مثليَّن متطابقين.

مثال: إذا كان  $PQRS$  متوازي أضلاع، فإنَّ  $\Delta PQS \cong \Delta RSQ$

## الوحدة 7

### مثال 4



إذا كان  $ABCD$  متوازي أضلاع، فأجد قيمة كل من  $x$  و  $y$

• أجد قيمة  $x$

$$\overline{DM} \cong \overline{BM}$$

قطرا متوازي الأضلاع ينصف كل منها الآخر

$$DM = BM$$

تعريف تطابق القطع المستقيمة

$$x = 2x - 8$$

أعوّض

$$-x = -8$$

أطرح  $2x$  من طرف المعادلة

$$x = 8$$

أقسم طرف المعادلة على 1

• أجد قيمة  $y$

$$\Delta DAC \cong \Delta BCA$$

قطر متوازي الأضلاع يقسمه إلى مثلثين متطابقين

$$\angle ACD \cong \angle CAB$$

الزوايا المتناظرة في المثلثات المتطابقة تكون متطابقة

$$m\angle ACD = m\angle CAB$$

تعريف تطابق الزوايا

$$(4y)^\circ = 44^\circ$$

أعوّض


$$4y = 44$$

أكتب المعادلة من دون رمز الدرجة

$$y = 11$$

أقسم طرف المعادلة على 4


تحقق من فهمي: ✓



إذا كان  $ABCD$  متوازي أضلاع، فأجد قيمة كل من  $x$  و  $y$

يمكن استعمال خصائص متوازي الأضلاع لبرهنة علاقات في أشكال هندسية مركبة.


### مثال 5



في الشكل المجاور، إذا كان  $ABCD$  و  $AEFG$  متوازيي أضلاع، فأثبت أن  $\angle 1 \cong \angle 3$  باستعمال البرهان ذي العمودين.

العبارات	المبررات
$\angle 1 \cong \angle 3$ (4)	بما أن $\angle 2 \cong \angle 3$ و $\angle 1 \cong \angle 2$
$\angle 2 \cong \angle 3$ (3)	الزوايا المقابلة في متوازي الأضلاع متطابقة.
$\angle 1 \cong \angle 2$ (2)	الزوايا المقابلة في متوازيي الأضلاع متطابقة.
معطى (1)	متوازيياً $AEFG$ و $ABCD$

### أتحقق من فهمي:






في الشكل المجاور، إذا كان  $ABCD$  و  $GDEF$  متوازيي أضلاع، فأثبت أن  $\angle B \cong \angle F$  باستعمال البرهان ذي العمودين.

### أتدرّب وأحل المسائل

أكمل كل جملة مما يأتي في ما يتعلّق بـ  $\square ABCD$  وأبّر إجابتي:

- 1  $\angle DAB \cong \dots$  2  $\angle ABD \cong \dots$   
 3  $\overline{AB} \parallel \dots$  4  $\overline{BC} \parallel \dots$   
 5  $\triangle ABD \cong \dots$  6  $\triangle ACD \cong \dots$

أجّد قيمة كل متغير في كل من متوازيات الأضلاع الآتية:

- 7  8  9 

## الوحدة 7


**رافعة:** أستعمل الشكل المجاور الذي يبيّن رافعة المقص للاجابة عن الأسئلة الآتية:

إذا كان  $m\angle B = 120^\circ$ , فأجد  $m\angle A$ .

إذا قل  $m\angle B$ , فما تأثير ذلك في  $m\angle A$ ؟

إذا قل  $m\angle A$ , فما تأثير ذلك في طول  $\overline{AD}$ ؟

إذا قل  $m\angle A$ , فما تأثير ذلك في ارتفاع الرافعة؟




في الشكل الآتي، إذا كان  $15$

$\overline{AK} \cong \overline{MK}$  متوازي أضلاع و

$\angle BCD \cong \angle CMD$  فأثبت أن

باستعمال البرهان ذي العمودين.




في الشكل الآتي، إذا كان  $GDKH$

متوازي أضلاع، فأستعمل المعلومات


المعطاة على الشكل؛ لأثبت أن

$\Delta DJK \cong \Delta HFG$  باستعمال البرهان

ذي العمودين.



**اكتشف الخطأ:** أنظر الحل الآتي، وأكتشف الخطأ الوارد فيه، وأصحّحه.



بما أن  $GHJK$  متوازي  
أضلاع، فإن  $\overline{GF} \cong \overline{FH}$

**تبرير:** تمثل المقادير الجبرية أدناه أطوال أضلاع  $\square MNPQ$ . أجد محيط متوازي الأضلاع، وأبرر إجابتي.

$$MQ = -2x + 37 \quad QP = y + 14 \quad NP = x - 5 \quad MN = 4y + 5$$

ما خصائص متوازي الأضلاع المتعلقة بزواياه وأضلاعه وأقطاره؟



### مهارات التفكير العليا


16

17

18

### أتذكر

المحيط يساوي مجموع  
أطوال الأضلاع.



## استكشف

هل تبقى رفوف الصندوق متوازيّةً بعضها بعضاً بغضّ النظر عنّ موقعها؟  
أبرّر إجابتي.


## فكرة الدرس

أتعلّم الشروط التي تؤكّد أنّ شكل رباعي متوازي الأضلاع.

تعلّمْتُ في الدرس السابق نظرياتِ حول خصائصِ متوازي الأضلاع، وسأتعلّمُ في هذا الدرس عكس هذه النظرياتِ، بحيث يمكن تحديد ما إذا كانَ الشكل رباعي متوازي أضلاع أم لا إذا كانت أضلاعه وزواياه وأقطاره لها خصائص معينة.

## شروط متوازي الأضلاع (1)


## نظريات



### عكس نظرية الأضلاع المتقابلة في متوازي الأضلاع

إذا كانَ كُلُّ ضلعَيْن متقابلين متطابقين في الشكل رباعي، فإنَّ الشكل رباعي متوازي أضلاع.


**مثال:** إذا كان  $ABCD$  متوازي أضلاع.



### عكس نظرية الزوايا المتقابلة في متوازي الأضلاع

إذا كانت كُلُّ زاويَيْن متقابلين متطابقان في الشكل رباعي، فإنَّ الشكل رباعي متوازي أضلاع.

**مثال:** إذا كان  $ABCD$  متوازي أضلاع.




في الشكل المجاور، إذا كان  $ABCD$  متوازي أضلاع باستعمال البرهان ذي العمودين.

## مثال 1: إثبات نظرية



## الوحدة 7

أخطُطُ للبرهان باتّباع الخطوات الآتية:



**الخطوة 1** أرسمُ القُطْر  $\overline{AC}$ ، ليتَّبِع  $\Delta CDA$  و  $\Delta ABC$ ، لِيُتَّبِع  $\Delta CDA$  و  $\Delta ABC$ .

**الخطوة 2** أستعملُ حالةَ تطابقِ مثلثَيْن بِثَلَاثَةِ أَضْلاعِ (SSS)؛ لِأَثْبَتَ أَنَّ  $\Delta ABC \cong \Delta CDA$

**الخطوة 3** أستعملُ الزوايا المُتَبَادِلَةَ داخِلِيًّا؛ لِأَثْبَتَ أَنَّ الأَضْلاعَ المُتَقَابِلَةَ مُتَوَازِيَّةً.

**البرهان:**

المبرّرات	العبارات
(1) معطٌ.	$\overline{BC} \cong \overline{DA}$ و $\overline{AB} \cong \overline{CD}$ (1)
(2) ضلعٌ مشترٌك.	$\overline{AC}$ (2)
(3) SSS	$\Delta ABC \cong \Delta CDA$ (3)
(4) زوايا مُتَنَاظِرَةُ فِي مُثَلَّثَيْن مُتَطَابِقَيْن.	$\angle 1 \cong \angle 4$ و $\angle 3 \cong \angle 2$ (4)
(5) عكُسُ نظريةِ الزوايايَّيْن المُتَبَادِلَيْن داخِلِيًّا.	$\overline{AB} \parallel \overline{CD}$ و $\overline{BC} \parallel \overline{DA}$ (5)
(6) تعريفُ مُتَوَازِيِّ الأَضْلاعِ.	$ABCD$ مُتَوَازِيِّ الأَضْلاعِ (6)

**أتحققُ من فهمي:**




في الشكِلِ المجاورِ، إِذَا كَانَ  $\angle A \cong \angle C$ ،  $\angle B \cong \angle D$  فَأَثْبُتْ أَنَّ  $ABCD$  مُتَوَازِيِّ الأَضْلاعِ.

يمكُنُ استعمالُ شروطِ مُتَوَازِيِّ الأَضْلاعِ لِتوضِيحِ علَاقَاتٍ مِنْ واقِعِ الْحَيَاةِ.

**مثال 2: من الحياة**



**رافعة:** يبيّنُ الشكِلُ المجاورُ رافعةً للمركباتِ الثقيلة:



هل الشكُلُ الرباعيُّ  $QRSP$  مُتَوَازِيِّ الأَضْلاعِ؟ أبْرُرْ إِجَابَتِي.

بِمَا أَنَّ كُلَّ ضلَاعَيْنِ مُتَقَابِلَيْنِ فِي الشكِلِ الرباعيِّ  $QRSP$  مُتَطَابِقَانِ، فَإِنَّهُ مُتَوَازِيِّ الأَضْلاعِ.

1

2

هل الشاحنة موازية للأرض؟ أبّرّ إجابتي.

بِما أنَّ  $QRSP$  متوازي أضلاع، فإنَّ  $\overline{QR} \parallel \overline{PS}$ ، وبِما أنَّ  $QR$  يمثل المنصة التي تستقرُ عليها الشاحنة، وَ  $\overline{PS}$  يقعُ على الأرض، فإنَّ الشاحنة موازية للأرض.

**تحقق من فهمي:** 

3


ما أقصى ارتفاعٍ يمكنُ أنْ ترتفعَ الرافعة الشاحنة إلَيْهِ؟ أبّرّ إجابتي.

## شروطٌ متوازيٌ الأضلاع (2)

## نظريات




### • عَكْسُ نَظَرِيَّةِ قُطْرَيِّ متوازيِ الأضلاع



إذا كانَ قُطْرَا شَكْلٍ رباعيٍ ينْصِفُ كُلُّ مِنْهُمَا الآخَرَ، فإنَّ الشَكْلَ الرباعيَ متوازيَ أضلاعٍ.

**مثال:** إذا كانَ  $\overline{AC}$  وَ  $\overline{BD}$  ينْصِفُ كُلُّ مِنْهُمَا الآخَرَ، فإنَّ  $ABCD$  متوازيَ أضلاعٍ.

### • نَظَرِيَّةِ الأضلاعِ المتوازيةِ والمتطابقةِ




إذا توازى وتطابقَ ضلعانِ متقابلانِ في شَكْلٍ رباعيٍّ، فإنَّ الشَكْلَ الرباعيَ متوازيَ أضلاعٍ.

**مثال:** إذا كانَ  $\overline{BC} \cong \overline{AD}$  وَ  $\overline{BC} \parallel \overline{AD}$  فإنَّ  $ABCD$  متوازيَ أضلاعٍ.

يمكُنُ استعمالُ شروطٍ متوازيِ الأضلاعِ لإيجادِ القيِّمِ المجهولةِ الّتي تجعلُ الشَكْلَ الرباعيَ متوازيَ أضلاعٍ.

## مثال 3



أجُدْ قِيمَةَ  $x$  الّتي تجعلُ الشَكْلَ الرباعيَ  $FCDE$  المجاورَ متوازيَ أضلاعٍ.

بناءً على عَكْسِ نَظَرِيَّةِ قُطْرَيِّ متوازيِ الأضلاعِ، فإِنَّهُ إِذَا كانَ قُطْرَا شَكْلٍ رباعيٍ ينْصِفُ كُلُّ مِنْهُمَا الآخَرَ، فإنَّ الشَكْلَ الرباعيَ متوازيَ أضلاعٍ، وبِما أَنَّهُ مُعْطَى في الشَكْلِ أَنَّ  $\overline{FN} \cong \overline{EN} \cong \overline{CN}$ ، أجُدْ قِيمَةَ  $x$  الّتي تجعلُ  $\overline{FN} \cong \overline{DN}$

## الوحدة 7

تعريفُ تطابقِ القطعِ المستقيمة

$$FN = DN$$

أعُرض

$$5x - 8 = 3x$$

أطرحُ  $3x$  مِنْ طرِيِّ المعادلة

$$2x = 8$$

أجمعُ 8 إِلَى طرِيِّ المعادلة

$$x = 4$$


أقسِمُ طرِيِّ المعادلةِ عَلَى 2

عندما  $x = 4$  ، فَإِنَّ:

$$FN = 5(4) - 8 = 12 , \quad DN = 3(4) = 12$$

إِذْنُ، عَنْدَمَا تَكُونُ  $4 = x$  ، يَكُونُ الشَّكْلُ الْرَّبَاعِيُّ  $FCDE$  مُتَوَازِيَ أَضْلاعٍ.

أَتَحَقَّقُ مِنْ فَهْمِي؟



أَجِدُّ قِيمَتَيِّ  $x$  وَ  $y$  اللَّتَّيْنِ تَجْعَلَانِ الشَّكْلَ الْرَّبَاعِيَّ  $PQRS$  الْمُجَاوِرَ مُتَوَازِيَ أَضْلاعٍ.

### طرائقُ إثباتِ أَنَّ الشَّكْلَ الْرَّبَاعِيَّ مُتَوَازِيَ أَضْلاعٍ

### ملخصُ المفهوم


- يَكُونُ الشَّكْلُ الْرَّبَاعِيُّ مُتَوَازِيَ أَضْلاعٍ إِذَا حَقَّ أَيًّا مِنَ الشُّرُوطِ الْأَتِيَّةِ:
- (1) إِذَا كَانَ كُلُّ ضلَاعَيْنِ مُتَقَابِلَيْنِ فِيهِ مُتَوَازِيَّنَ.
  - (2) إِذَا كَانَ كُلُّ ضلَاعَيْنِ مُتَقَابِلَيْنِ فِيهِ مُتَطَابِقَيْنَ.
  - (3) إِذَا كَانَتْ كُلُّ زَوْيَتَيْنِ مُتَقَابِلَتَيْنِ فِيهِ مُتَطَابِقَيْنَ.
  - (4) إِذَا كَانَ قُطْرَاهُ يَنْصَفُ كُلُّ مِنْهُمَا الْآخَرَ.
  - (5) إِذَا كَانَ فِيهِ ضلَاعَانِ مُتَقَابِلَانِ مُتَوَازِيَانِ وَمُتَطَابِقَانِ.

يمكن استعمال الميل لتحديد ما إذا كان الشكل الرباعي في المستوى الإحداثي متوازي أضلاع أم لا.

#### مثال 4

أثبتت أن  $(A(2, -1), B(1, 3), C(6, 5), D(7, 1))$  تمثل رؤوس متوازي أضلاع.

يمكن إثبات أن الأضلاع المتقابلة متوازية إذا كان لها الميل نفسه.



أمثل الشكل الرباعي في المستوى الإحداثي.

أجد ميل كل ضلع من أضلاع الشكل الرباعي.

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$m = \frac{3 - (-1)}{1 - 2} = -4$$

$$m = \frac{1 - 5}{7 - 6} = -4$$

$$m = \frac{5 - 3}{6 - 1} = \frac{2}{5}$$

$$m = \frac{-1 - 1}{2 - 7} = \frac{2}{5}$$

صيغة الميل

:  $\overline{AB}$  ميل

:  $\overline{CD}$  ميل

:  $\overline{BC}$  ميل

:  $\overline{DA}$  ميل

بما أنَّ الضلعين المتقابلين  $\overline{AB}$  و  $\overline{CD}$  لهما الميل نفسه، إذن فهما متوازيان، وبما أنَّ الضلعين المتقابلين  $\overline{BC}$  و  $\overline{DA}$  لهما الميل نفسه، إذن فهما متوازيان، وبما أنَّ الأضلاع المتقابلة متوازية، إذن فالشكل الرباعي  $ABCD$  متوازي أضلاع.


تحقق من فهمي:

أثبتت أن  $(A(-3, 3), B(2, 5), C(5, 2), D(0, 0))$  تمثل رؤوس متوازي أضلاع.

أتدرب  
وأحل المسائل

أبيّن أنَّ كل شكلٍ من الأشكال الرباعية الآتية متوازي أضلاع، وأبُرِّر إجابتي:


1



2






3




## الوحدة 7



أجد قيمة  $x$  و  $y$  اللتين تجعلان كل شكل رباعي ممما يأتي متوازي أضلاع:




أستعمل المعلومات المطلقة في الشكل الآتي لكتابه برهان سهمي؛ لأنّي أثبت أنَّ الشكل الرباعي  $LMNT$  متوازي أضلاع.




أستعمل المعلومات المطلقة في الشكل الآتي لكتابه برهان ذي عمودين؛ لأنّي أثبت أنَّ الشكل الرباعي  $ANDL$  متوازي أضلاع.



أستعمل المعلومات المطلقة في الشكل الآتي لكتابه برهان سهمي؛ لأنّي أثبت أنَّ الشكل الرباعي  $XYZW$  متوازي أضلاع.



في الشكل الآتي، إذا كان  $\triangle TRS \cong \triangle RTW$ ، فأثبت أنَّ  $RSTW$  متوازي أضلاع باستعمال البرهان ذي العمودين.



**موقف سيارات:** يبيّن الشكل المجاور موقفاً للسيارات. إذا كان  $JK = LM = 7 \text{ m}$  و  $m\angle JKL = 60^\circ$  و  $KL = JM = 3 \text{ m}$  و

هل الجزء من الموقف  $JKLM$  متوازي أضلاع؟ أبّرّ إجابتي.


أجد كلاً من:  $m\angle JML$ ,  $m\angle KJM$ ,  $m\angle KLM$

يُعد اصطفافُ السيارات بطريقةٍ منتظمةٍ من المظاهر الحضارية التي تعطي انطباعاً إيجابياً حول ثقافة المجتمع.

7

### معلومة

9




**حاسوبٌ:** تسمح معالجات نصوصٍ حاسوبيةٍ عدّة بكتابيّ الكلمة بالخط العادي أو الخط المائي. هل حرف  $(I)$  متوازيٌ أضلاعٍ؟ أبّرر إجابتي.

13

أمثل في المستوى الإحداثي الشكل الرباعي المعطاة إحداثيات رؤوسه في ما يأتي، وأحدّد ما إذا كان متوازيٌ أضلاعٍ أم لا، وأبّرر إجابتي:

14  $B(-6, -3), C(2, -3), E(4, 4), G(-4, 4)$

15  $Q(-3, -6), R(2, 2), S(-1, 6), T(-5, 2)$




**تبريرٌ:** تمثل النقاط  $A, B, C$  في المستوى الإحداثي المجاورٍ رؤوسَ شكلٍ رباعيٍّ، أجدُ إحداثيات النقطة الرابعة في كلٍ من الحالات الآتية، وأبّرر إجابتي:

إجابتي:

النقطة  $D$  حيث  $ABCD$  متوازيٌ أضلاعٍ.

النقطة  $E$  حيث  $ABEC$  متوازيٌ أضلاعٍ.



**تبريرٌ:** أثبتت أنَّ الشكل الرباعي  $FACD$  متوازيٌ أضلاعٍ، علمًا بأنَّ  $ABCDEF$  سداسيٌ منتظمٌ. أبّرر إجابتي.

### مهارات التفكير العليا

**إرشادٌ**

أبدأ بإثبات أنَّ

$$\Delta ABC \cong \Delta FED$$


16

17

18

19

20



**تحذيرٌ:** يبيّنُ الشكل المجاورٍ متوازيٌ الأضلاع  $LMNO$ ، وتمثّل النقاط  $A, B, C, D$  منتصفاتٍ أضلاعِه. أثبتت أنَّ الشكل  $ABCD$  متوازيٌ أضلاعٍ.

**أكتب** كيف يمكن إثبات أنَّ شكلًا رباعيًّا يمثل متوازيٌ أضلاعٍ؟



## أستكشفُ

ت تكونُ الرقعةُ الخاصةُ بلعبة الشطرنجِ منْ 64 مربعًا ملؤنًا. كيفَ يمكنني إثباتُ أنَّ الرقعةَ نفسها مربعةٌ؟

## فكرةُ الدرس

- أحدَدْ خصائصَ كُلِّ مِنْ: المستطيلِ، والمعينِ، والمربعِ.
- أحدَدْ ما إذا كانَ متوازي الأضلاعِ مستطيلًا أوًّ معيّنًا أوًّ مربعًا.

## المصطلحات

المستطيلُ، المعينُ، المربعُ

تعرّفتُ سابقاً خصائصَ متوازي الأضلاعِ المتعلقةَ بأضلاعِهِ وزواياهُ وأقطارِهِ، وسأتعلّمُ في هذا الدرسِ ثلاثةً أنواعاً خاصّةً منْ متوازي الأضلاعِ وَهِيَ: المستطيلُ، والمعينُ، والمربعُ.

## المستطيلُ

**المستطيلُ** (rectangle) هُوَ متوازي أضلاعٍ زواياهُ الأربعُ قوائمُ، وهذا يعني أنَّ لَهُ الخصائصَ الآتيةَ:




- الأضلاعُ المتقابلةُ متوازيةٌ ومتطابقةٌ.
- زواياهُ الأربعُ قوائمٌ.
- الزوايا المتحالفةُ متكمالةٌ.
- الزوايا المتقابلةُ متطابقةٌ.
- قطرُاهُ ينْصَفُ كُلُّ منْهُما الآخرَ.
- كُلُّ قطرٍ مِنْ أقطارِ المستطيلِ يقسمُهُ إلى مثلَيْنِ متطابقَيْنِ.

وتُضافُ إلى الخصائصِ السابقةِ خاصيّةً أخرى متعلّقةُ بقطريِ المستطيلِ موضحةً في النظريةِ الآتيةِ:

## قطراً المستطيل

## نظرية




## • نظريةُ قطريِ المستطيلِ

يكونُ متوازي الأضلاعِ مستطيلًا إذاً وفقطً إذاً كانَ قطرُاهُ متطابقَيْنِ.

**مثالٌ:** يكونُ  $\square ABCD$  مستطيلًا إذاً وفقطً إذاً كانَ  $\overline{AC} \cong \overline{BD}$

أداةُ الرّبْطِ "إذا وفقط إذا" التي وردت في نظريةِ قُطْرِي المستطيلِ تعني أنَّ العبارةَ صحيحةٌ في الاتجاهين؛ لذا، إذا كانَ قُطْرَا متوازي الأضلاعِ متطابقينَ فإنهُ مستطيلٌ، وإذا كانَ متوازي الأضلاعِ مستطيلاً فإنَّ قُطْرَيِهِ متطابقان.

### مثال 1: إثبات نظريةٍ



يبينُ الشكلُ المجاورُ المستطيلَ  $ABCD$ ، أثبتُ أنَّ قُطْرِي المستطيلِ  $ABCD$  متطابقان، باستعمالِ البرهانِ ذي العمودينِ.

أخطُطُ للبرهانِ باتِّباعِ الخطواتِ الآتيةِ:


الخطوة 1: أستعملُ حالةَ تطابقِ مثلثينِ بضلعينِ وزاويةٍ محصورةٍ (SAS)؛ لأنَّ  $\Delta ADC \cong \Delta BCD$

الخطوة 2: أستعملُ تطابقِ المثلثينِ؛ لأنَّ  $\overline{AC} \cong \overline{BD}$

### البرهانُ:

البرهانُ	العباراتُ
1) ضلعانِ متقابلانِ في مستطيلٍ.	$\overline{AD} \cong \overline{BC}$ (1)
2) ضلعٌ مشتركٌ.	$\overline{DC}$ (2)
3) زوايا المستطيلِ قوائمٌ.	$\angle D \cong \angle C$ (3)
SAS (4)	$\Delta ADC \cong \Delta BCD$ (4)
5) ضلعانِ متناظرانِ في مثلثينِ متطابقينِ.	$\overline{AC} \cong \overline{BD}$ (5)

### أتحققُ من فهمي:




يبينُ الشكلُ المجاورُ  $\square PONM$ ، فإذا كانَ  $\overline{PN} \cong \overline{OM}$ ، فأثبتُ باستعمالِ البرهانِ ذي العمودينِ أنَّ  $PONM$  مستطيلٌ.

## الوحدة 7

يمكن استعمال خصائص المستطيل لإيجاد قيمة مجهولة.

### مثال 2



إذا كان  $QRST$  مستطيلاً، وكان  $RT = 9x + 5$  و  $QS = 6x + 14$ ، فأجد قيمة المتغير  $x$ .

بما أن  $QRST$  مستطيل، فإن قطريه متطابقان، إذن أجد قيمة  $x$  التي تجعل

$$\overline{QS} \cong \overline{RT}$$

$$QS = RT$$

قطر المستطيل متساويان في الطول

$$9x + 5 = 6x + 14$$

أعوّض

$$3x + 5 = 14$$


أطرح  $6x$  من طرف المعادلة

$$3x = 9$$

أطرح  $5$  من طرف المعادلة

$$x = 3$$

أقسم طرف المعادلة على  $3$




إذا كان  $PQNM$  مستطيلاً، وكان  $PN = 5x - 31$  و  $MQ = 2x + 11$ ، فأجد قيمة المتغير  $x$ .

### أتحقق من فهمي:



يمكن استعمال خصائص المستطيل لتوضيح علاقاتٍ مِنْ واقع الحياة.

### مثال 3: من الحياة



نافذة: يبيّن الشكل المجاور إطار نافذة أبعادها موضحة في الشكل.

هل إطار النافذة على شكلٍ مستطيلٍ؟ أبّرّ إجابتي.

يظهرُ من الشكل أنَّ أضلاع الإطار المتقابلة لها الطول نفسه؛ لذا فالإطار على

شكلٍ متوازيٍ أضلاعٍ، ولكن لا يوجد ما يدلُّ على أنَّ الزوايا قوائِم؛ لذا لا يمكن

تحديد ما إذا كان الإطار على شكلٍ مستطيلٍ أم لا.

2

قاسَ تميمٌ طولَيْ قُطْرَيِ الإطَّارِ، فوجَدَ أَنَّ طولَ أحَدِهِما  $2.40\text{ m}$  وَطُولَ الْآخَرِ  $2.45\text{ m}$ ، فَهَلْ إطَّارُ النَّافِذَةِ عَلَى شَكْلٍ مُسْتَطِيلٍ؟ أَبْرُرْ إِجَابَتِي.


بِالرَّجُوعِ إِلَى نَظَرِيَّةِ قُطْرَيِ الْمُسْتَطِيلِ، فَإِنَّ الشَّكْلَ الْرَّبَاعِيَّ يَكُونُ مُسْتَطِيلًا إِذَا كَانَ قُطْرَاهُ مُتَطَابِقَيْنِ، وَبِمَا أَنَّ قُطْرَيِ إطَّارِ النَّافِذَةِ لَيْسَا مُتَطَابِقَيْنِ؛ إِذْنُ إِطَّارُ النَّافِذَةِ لَيْسَ عَلَى شَكْلٍ مُسْتَطِيلٍ.

### أَتَحَقُّ مِنْ فَهْمِي:

3

أَفْتَرُضُ أَنَّ قُطْرَيِ النَّافِذَةِ لَهُمَا الطُّولُ نَفْسُهُ، فَهَلْ إِطَّارُهَا عَلَى شَكْلٍ مُسْتَطِيلٍ؟ أَبْرُرْ إِجَابَتِي.

### الْمَعْيَنُ



الْمَعْيَنُ (rhombus) هُوَ مُتَوَازِيُّ أَضْلاعٍ أَضْلاعُهُ جَمِيعُهَا مُتَطَابِقَةٌ.

لِلْمَعْيَنِ خَصَائِصُ مُتَوَازِيُّ الأَضْلاعِ جَمِيعُهَا، إِضَافَةً إِلَى الْخَاصِيَّتَيْنِ الْمُوَضَّحَتَيْنِ فِي النَّظَرِيَّتَيْنِ الْآتَيَتَيْنِ:

### الْمَعْيَنُ


### نَظَرِيَّاتُ

#### • نَظَرِيَّةُ قُطْرَيِ الْمَعْيَنِ

يَكُونُ مُتَوَازِيُّ الأَضْلاعِ مَعِيَّنًا إِذَا وَفَقَطْ إِذَا كَانَ قُطْرَاهُ مُتَعَامِدَيْنِ.

**مَثَلُّ:** يَكُونُ  $\square ABCD$  مَعِيَّنًا إِذَا وَفَقَطْ إِذَا كَانَ  $\overline{AC} \perp \overline{BD}$

.....



#### • نَظَرِيَّةُ الزَّوَالِيَّا الْمُتَقَابِلَةِ فِي الْمَعْيَنِ

يَكُونُ مُتَوَازِيُّ الأَضْلاعِ مَعِيَّنًا إِذَا وَفَقَطْ إِذَا نَصَفَ كُلُّ قُطْرٍ مِنْ قُطْرَيِّ الزَّوَالِيَّتَيْنِ الْمُتَقَابِلَتَيْنِ الَّتَّيْنِ يَصْلُبُ بَيْنَ رَأْسَيْهِمَا.


**مَثَلُّ:** يَكُونُ  $\square ABCD$  مَعِيَّنًا إِذَا وَفَقَطْ إِذَا نَصَفَ  $\overline{AC}$  كَلَّا مِنْ  $\angle A$  وَ  $\angle C$ ، وَنَصَفَ  $\overline{BD}$  كَلَّا مِنْ  $\angle B$  وَ  $\angle D$ ، وَهَذَا يَعْنِي أَنَّ:

$$\angle 1 \cong \angle 2, \angle 3 \cong \angle 4, \angle 5 \cong \angle 6, \angle 7 \cong \angle 8$$

## الوحدة 7

يمكنُ استعمال خصائص المَعِين لإيجاد قيمٍ مجهولةٍ.

### مثال 4



بيَّن الشَّكُلُ المجاورُ المَعِين  $NPQM$ . إذا كانت  $m\angle N = 120^\circ$ , فأجِدْ قياساتِ الزَّوَايا المَرْقَمَةِ في الشَّكُلِ.

نظريَّةُ المُثَلِّثِ المُتَطَابِقِ الضَّلَاعَيْنِ

مجموعُ زَوَايا المُثَلِّثِ

أعُوْضُ

أطْرُوحُ  $120$  مِنْ طَرِيقِ المُعادِلَةِ


أقسُمُ طَرِيقِ المُعادِلَةِ عَلَى  $2$

.  $m\angle 1 = m\angle 3 = 30^\circ$  ومنهُ فإنَّ

وبحسب نظرية الزَّوَايا المُتَقَابِلَةِ فِي المَعِينِ فإنَّ  $m\angle 3 = m\angle 4$  و  $m\angle 1 = m\angle 2$  وهذا يعني أنَّ:


$$m\angle 1 = m\angle 2 = m\angle 3 = m\angle 4 = 30^\circ$$

أتحقِّقُ مِنْ فَهْمِي:




بيَّن الشَّكُلُ المجاورُ المَعِين  $DEFG$ . إذا كانت  $m\angle G = 118$ , فأجِدْ قياساتِ الزَّوَايا المَرْقَمَةِ في الشَّكُلِ.

المرْبَعُ



المرْبَعُ (square) هو متوازي أضلاعٍ أضلاعُهُ جمِيعُهَا مُطَابِقَةٌ، وزَوَاياُ الْأَرْبُعُ قَوَائِمُ. وبِمَا أَنَّ المستطيلَ متوازي أضلاعٍ زَوَاياُ الْأَرْبُعُ قَوَائِمُ، والمَعِينَ متوازي أضلاعٍ أضلاعُهُ الْأَرْبَعُ مُطَابِقَةٌ، فإنَّ المرْبَعَ مُسْتَطِيلٌ؛ لأنَّ زَوَاياُ الْأَرْبَعَ قَوَائِمُ، وَهُوَ أَيْضًا مَعِينٌ؛ لأنَّ أضلاعُهُ الْأَرْبَعَةَ مُطَابِقَةٌ، وهذا يعني أنَّ جمِيعَ خَصائصِ متوازي الأضلاعِ، والمستطيلِ، والمَعِينِ تَنَطِّبُ عَلَى المرْبَعِ.


ويوضح شكلٌ في الآتي العلاقة بينَ متوازي الأضلاع، والمعين، والمستطيل، والمربيع.



## مثال 5


أحدّد ما إذا كانَ متوازي الأضلاع في كُلِّ مَا يأتِي مستطيلاً أَمْ معيناً أَمْ مربعاً، وأبْرِرْ إجابتي:

1



بِما أَنَّ الأضلاعَ الأربعةَ لمتوازيِ الأضلاعِ المبيِّنِ في الشكِّلِ متطابقَانِ، فَإِنَّ متوازيَ الأضلاعِ مستطيلٌ، وبِما أَنَّ القُطْرَيْنِ متعامداَنِ، فَإِنَّ متوازيَ الأضلاعِ معيناً أَيْضَاً، وَمِنْهُ فَإِنَّ متوازيَ الأضلاعِ المبيِّنِ في الشكِّلِ مربعٌ.

2




بِما أَنَّ قُطْرَيْ متوازيَ الأضلاعِ المبيِّنِ في الشكِّلِ متطابقَانِ، فَإِنَّ متوازيَ الأضلاعِ مستطيلٌ، وبِما أَنَّ القُطْرَيْنِ متعامداَنِ، فَإِنَّ متوازيَ الأضلاعِ معيناً أَيْضَاً، وَمِنْهُ فَإِنَّ متوازيَ الأضلاعِ المبيِّنِ في الشكِّلِ مربعٌ.


**أتحققُ من فهمي:**

أحدّد ما إذا كانَ متوازيَ الأضلاعِ في كُلِّ مَا يأتِي مستطيلاً أَمْ معيناً أَمْ مربعاً، وأبْرِرْ إجابتي:

3




4




## الوحدة 7

### أتدرب وأحل المسائل




يبين الشكل المجاور للمستطيل  $QRST$ . إذا كان قطراً يتقاطعان في النقطة  $P$  و  $m\angle PTS = 34^\circ$  و  $QS = 10$ ، فأجد كلاً ممّا يأتي:

- 1  $m\angle QTR$
- 2  $m\angle QRT$
- 3  $m\angle SRT$
- 4  $QP$
- 5  $RT$
- 6  $RP$



يبين الشكل المجاور للمعین  $LMNO$ . إذا كان قطراً يتقاطعان في النقطة  $E$  و  $m\angle NLM = 53^\circ$  و  $OE = 8$ ، فأجد كلاً ممّا يأتي:



- 7  $m\angle OLN$
- 8  $m\angle LEO$
- 9  $m\angle LON$
- 10  $OM$
- 11  $LE$
- 12  $LN$




يبين الشكل المجاور للمربع  $QRST$ . إذا كان قطراً يتقاطعان في النقطة  $K$  و  $QK = 1$ ، فأجد كلاً ممّا يأتي:

- 13  $m\angle RKS$
- 14  $m\angle QTK$
- 15  $m\angle QRK$
- 16  $KS$
- 17  $QS$
- 18  $RT$

أحدّد ما إذا كان متوازي الأضلاع في كل ممّا يأتي مستطيلاً أم معيناً أم مربعاً، وأبّرر إجابتي، ثمّ أجد قيمة كل ممّا يأتي  $x$  و  $y$ :






**علاقة ملابس:** يبيّن الشكّل المجاور علاقّة ملابس خشبيّة. إذا كان  $KJML$  متوازيّ أضلاع، وكان  $\overline{KM} \perp \overline{LJ}$ ، و  $m\angle K = 90^\circ$ ، فاجبُ عن كلّ ممّا يأتي:


هل متوازيّ الأضلاع  $KJML$  مستطيل أمّ معين أمّ مربّع؟ أبّرّ إجابتي.

إذا كان  $cm KJ = 20$ ، فأجد  $KM$  و  $JL$ ، وأبّرّ إجابتي.


في الشكّل الآتي، إذا كان  $GHJK$  متوازيّ أضلاع، وكان  $\Delta LGK \cong \Delta MJK$ ، فأثبت أنّ  $GHJK$  معين، باستعمال البرهان ذي الشهميّ.



في الشكّل الآتي، إذا كان  $ADCB$  متوازيّ أضلاع، وكان  $\overline{AC}$  ينصلّف كلاً من  $\angle A$  و  $\angle C$  فأثبت أنّ  $ABCD$  معين، باستعمال البرهان ذي العموديّن.



**اكتشف الخطأ:** أنظرُ الحلّ الآتي، وأكتشفُ الخطأ الواردَ فيه، وأصيّحُهُ، علمًا بأنّ  $PQRS$  مستطيل.



**تبرير:** هل المعينات جميعها متشابهة؟ أبّرّ إجابتي.

كيفَ أمّيّز ما إذا كان متوازيّ الأضلاع مستطيلًا أمّ معيناً أمّ مربّعًا؟

21

22

23

### إرشاد

أبدأ بثبات أنّ

$$\Delta ABC \cong \Delta CDA$$

### مهارات التفكير العليا


25

26

27

## فكرة الدرس

أحد المثلثات المتشابهة،  
باستعمال حالات التشابه AA  
و SAS و SSS



## استكشف


بيّن الشكل المجاور الواجهة الأمامية لسطح منزل، كيف يمكنني معرفة الارتفاع  $(h)$ ؟

تعلّمتُ سابقاً أن المثلثات المتشابهة هي مصلعات زواياها المتناظرة متطابقة، وأطوال أضلاعها المتناظرة متناسبة، وتُعد المثلثات حالة خاصةٍ من المثلثات. وتوجُّ مسلماتٍ ونظرياتٍ لإثبات تشابه المثلثات.

## مسلمة



## التشابه بزاويتين (AA)



إذا طبّقت زاويتان في مثلث زاويتين في مثلث آخر، فإن المثلثين متشابهان.


**مثال:** إذا كانت  $\angle P \cong \angle T$  و  $\angle Q \cong \angle S$  فإن  $\Delta PQR \sim \Delta TSU$

يمكن استعمال مسلمة (AA) لتحديد ما إذا كان مثثان متشابهين أم لا.

## مثال 1

أحد ما إذا كان كل مثثنين مما يأتي متشابهين أم لا، وإذا كان كذلك، فأكتب عبارة التشابه، وأبّرر إجابتي.

1



$\angle B \cong \angle E$ ؛ لأنّهما زاويتان قائمتان.


باستعمال مجموع قياسات زوايا المثلث يكون:

$$m\angle C = 180^\circ - (90^\circ + 43^\circ) = 47^\circ$$

وبما أن  $\angle C \cong \angle F$  فإن  $m\angle F = 47^\circ$

إذن  $\Delta ABC \sim \Delta DFE$  وفق المسلمة (AA).

2



$\angle L \cong \angle R$ ؛ لأن كلا الزاويتين قياسهما  $70^\circ$



باستعمال مجموع قياسات زوايا المثلث يكون:

$$m\angle K = 180^\circ - (30^\circ + 70^\circ) = 80^\circ$$

$$m\angle P = 180^\circ - (85^\circ + 70^\circ) = 25^\circ$$

وبما أنه يوجد زوج واحد فقط من الزوايا المتطابقة، إذن  $\Delta PQR$  و  $\Delta JKL$  ليسا متشابهين.

## أتحقق من فهمي:



في ما يأتي طريقتانٍ آخرتانٍ لتحديد ما إذا كانَ مثلثانٍ متتشابهينٍ أم لا:


### تشابه المثلثان

### نظريات



#### • التشابهُ بثلاثةِ أضلاعٍ (SSS)


إذا كانتِ الأضلاعُ المتناظرةُ لمثلثينٍ متناسبةً، فإنَّ المثلثينٍ متتشابهان.



مثالٌ: إذا كانَ  $\Delta ABC \sim \Delta DEF$ ، فإنَّ  $\frac{AB}{DE} = \frac{AC}{DF} = \frac{BC}{EF}$

#### • التشابهُ بضلعَينِ وزاويةٍ محصورةٍ (SAS)

إذا كانَ طولاً ضلعينِ في مثلثٍ متناسبيٍّ معَ طولِيِّ الضلعينِ المتناظرينِ لهُما في مثلثٍ آخرٍ، وكانتِ الزاويتانِ المحصورتانِ بينَهُما متطابقتَينِ، فإنَّ المثلثينِ متتشابهانِ.




مثالٌ: إذا كانَ  $\Delta ABC \sim \Delta DEF$  فإنَّ  $\angle B \cong \angle E$  و  $\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF}$

يمكنُ استعمالُ نظريةٍ (SSS) وَ (SAS) لتحديد ما إذا كانَ مثلثانٍ متتشابهينٍ أم لا.

### مثال 2



أحدَّ ما إذا كانَ كُلُّ مثلثينٍ ممَّا يأتي متتشابهينٍ أم لا، وإذا كانَا كذلكَ، فاكتُبْ عبارةَ التشابهِ، وأبْرِرْ إجابتي.

1



أستعملُ أطوالَ الأضلاعِ لتمييزِ الأضلاعِ المتناظرةِ، ثمَّ أجُدُّ النسبةَ بينَ طولِ كُلِّ زوجٍ منْ أزواجِ الأضلاعِ المتناظرةِ في المثلثينِ.

## الوحدة 7



## أقصر ضلعين

$$\frac{AB}{DE} = \frac{8}{6} = \frac{4}{3}$$

## أطول ضلوعين


$$\frac{CA}{FD} = \frac{16}{12} = \frac{4}{3}$$

## الضلعانِ المتقيانِ



$$\frac{BC}{EF} = \frac{12}{9} = \frac{4}{3}$$

بما أنَّ النِّسبَ جمِيعَهَا متساويةٌ، إذنْ  $\Delta ABC \sim \Delta DEF$  وفقَ نظرية التشابه (SSS).

2



بِمَا أَنَّ  $K$  مُشَرِّكٌ بَيْنَ الْمُثَلَّثَيْنِ، إِذْنَ أَجْدُ النِّسْبَةَ بَيْنَ طُولَيْ زُوْجِيِّ الْأَضْلاعِ  
الْمُتَقَابِلَةِ الَّذِيْنَ يَحْصُرَانِ  $K$  فِي الْمُثَلَّثِينَ.



## أَقْصَرُ ضَلَعَيْنِ

$$\frac{KL}{KM} = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}$$



## أطول ضلوعين

$$\frac{KP}{KN} = \frac{12}{15} = \frac{4}{5}$$


بِمَا أَنَّ طَوْلَيِ الْضَّلَعَيْنِ الَّذِيْنِ يَحْصِرَانِ  $K$  فِي  $\Delta KLP$  مُتَنَاسِبَانِ مَعَ طَوْلَيِ الْضَّلَعَيْنِ الْمُنَاظِرَيْنِ لَهُمَا فِي  $\Delta KMN$ ، إِذْنٌ  $\Delta KLP \sim \Delta KMN$  وَفِي نَظَرِيَّةِ التَّشَابِهِ (SAS).

## أتدقّ من فهمي:

3




4



يمكّنني استعمال مسلمٍ التشابه ونظرياته في إثبات تشابه مثلين.


### مثال 3



أستعمل المعلومات المعطاة في الشكل المجاور، لأثبت أن  $\Delta SVR \sim \Delta UVT$  باستعمال البرهان ذي العمودين.

المبرّاث	العبارات
(1) زاويان متقابلان في الرأس.	$\angle SVR \cong \angle UVT$ (1)
(2) معطى.	$\overline{SR} \parallel \overline{UT}$ (2)
(3) زاويان متبادلان داخلياً.	$\angle S \cong \angle U$ (3)
(4) مسلمة التشابه (AA).	$\Delta SVR \sim \Delta UVT$ (4)


تحقق من فهمي:



أستعمل المعلومات المعطاة على الشكل المجاور، لأثبت أن  $\Delta SPQ \sim \Delta SRT$  باستعمال البرهان السهمي.

يمكنني استعمال تشابه المثلثات في إيجاد قياسات مجهولة.

### مثال 4



أجد قيمة  $x$  التي تجعل  $\Delta ABC \sim \Delta DEF$

الخطوة 1 أجد قيمة  $x$  التي تجعل أطوال الأضلاع المتناظرة متناسبة:

$$\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF}$$

$$\frac{4}{12} = \frac{x-1}{2x+4}$$

$$4(2x+4) = 12(x-1)$$

$$8x + 16 = 12x - 12$$

$$-4x + 16 = -12$$

$$-4x = -28$$

$$x = 7$$

أكبّ التناسب

أعرّض

بالضرب التبادلي

خاصية التوزيع

أطرح  $12x$  من طرف المعادلة

أطرح  $16$  من طرف المعادلة


أقسم طرف المعادلة على  $-4$

## الوحدة 7

أتحقق من فهمي:




أجد قيمة  $x$  التي تجعل  $\Delta ABE \sim \Delta DCE$



يمكن استعمال تشابه المثلثات في بعض التطبيقات الحياتية.

مثال 5: من الحياة



بحيرة: يريد مساح قياس عرض بحيرة باستعمال تقنية المسح المبينة في الشكل المجاور. أجد عرض البحيرة  $(VW)$ .

أثبت أن  $\Delta YZX \sim \Delta VWX$  الخطوة 1

المبررات	العبارات
(1) زاويتان متقابلتان في الرأس.	$\angle ZXY \cong \angle VZW$ (1)
(2) زاويتان قائمتان.	$\angle Z \cong \angle W$ (2)
(3) مسلمة التشابه (AA).	$\Delta YZX \sim \Delta VWX$ (3)

أجد عرض البحيرة  $(VW)$  الخطوة 2

بما أن  $\Delta YZX \sim \Delta VWX$ ، فيمكن استعمال التناوب بين أطوال الأضلاع المتناظرة لإيجاد عرض البحيرة.

أفترض أن  $VW = x$

أكتب التناوب

$$\frac{YZ}{VW} = \frac{ZX}{WX}$$

أعرض

$$\frac{36}{x} = \frac{27}{41}$$

بالضرب التبادلي

$$27x = 1476$$


أستعمل الآلة الحاسبة

$$x \approx 54.7$$

إذن، عرض البحيرة يساوي 54.7 km تقريرًا.





## أتحققُ من فهمي:

بيَّن الشَّكُلُ المُجاوِرُ طرِيقَةً أُخْرَى لِقِيَاسِ عَرْضِ الْبَحِيرَاتِ، أَجِدُ عَرْضَ الْبَحِيرَةِ  $WX$  فِيهِ.







## أتدربُ وأحلُّ المسائل


أَحَدَّدُ مَا إِذَا كَانَ كُلُّ مُثَلَّيْنِ مِمَّا يَأْتِي مُتَشَابِهِنَّ أَمْ لَا، وَإِذَا كَانَا كَذَلِكَ، فَأَكْتُبُ عَبَارَةً التَّشَابِهِ، وَأَبْرُرُ إِجَابَتِي.



أَثْبُتُ أَنَّ كُلَّ مُثَلَّيْنِ مِمَّا يَأْتِي مُتَشَابِهَانِ، ثُمَّ أَجِدُ الطَّوْلَ المُطَلُوبَ:



## الوحدة 7



**عجلة دوّارة:** يبيّن الشكّل المجاور عجلةً دوّارةً، فإذا علمتُ أنَّ  $MP = NQ = 1.5\text{ m}$ ، وأنَّ  $\Delta OPQ, OM = ON = 3\text{ m}$  فأبيّن ما إذا كانَ  $\Delta OPQ \sim \Delta OMN$ .

9



أستعمل المعلمومات المعطاة على الشكّل الآتي لأثبتَ أنَّ  $AB \times CG = CD \times AC$  باستعمالِ البرهانِ السهميِّ.

11

في الشكّل الآتي، إذا كانَ  $\Delta KNJ$  متطابقَ الضلعينِ  $\angle N$  زاويةَ رأسِهِ، وكانَ  $\Delta GHJ \sim \Delta MLK$ ، فأثبتَ أنَّ  $\angle L \cong \angle H$  باستعمالِ البرهانِ ذي العموديَّن.


إرشاد

يمكُنُني إعادةُ رسمِ الشكّلِ وفصلِ المثلثاتِ المتداخلةِ؛ لتسهيلِ الإثباتِ.




**اكتشفُ الخطأ:** أنظرُ الحلَّ الآتي، وأكتشفُ الخطأً في إيجادِ قيمةِ  $x$ ، وأصحّهُ.

12



مهارات التفكير العليا




**تحددُ:** أحددُ في الشكّل المجاورِ ثلاثةً مثلاًثَاتٍ متشابهٍ، ثمَّ أكتبُ ثلاًثَ جُملٍ تشاَبِهِ بينَ المثلثاتِ، وأثبتُنَّها جميعاً.

13

كيفَ أحددُ ما إذا كانَ مثلاًثَانِ متشابهَيْنِ أمْ لا؟

أكتبُ

14



## استكشف

صمّمت رزان الطائرة الورقية المجاورة على المستوى الإحداثي، وترى إعاده رسم هذه الطائرة تحت تأثير تكبير مركز نقطة الأصل ومعامله 2.5 ما إحداثيات الطائرة بعد التكبير؟

## فكرة الدرس

أرسم صورة لمضلع ناتجة عن تمدد في المستوى الإحداثي.


## المطالعات

التمدد، مركز التمدد، معامل التمدد، التكبير، التصغير.


التمدد (dilation) هو تحويل هندسي يكبر الشكل أو يصغره من نقطة ثابتة  $C$  تسمى مركز التمدد وبنسبة محددة تسمى معامل التمدد (scale factor of dilation) وقيمتها  $k$ ، وهو نسبة أحد أطوال الصورة إلى الطول المناظر له في الشكل الأصلي.

## التمدد

## مفهوم أساسي



إذا كان التمدد الذي مركزه  $C$  ومعامله هو العدد الموجب  $k$  حيث  $k \neq 1$  و  $k > 1$  فإن التمدد **تكبير** . (enlargement)




إذا كان التمدد الذي مركزه  $C$  ومعامله هو العدد الموجب  $k$  حيث  $k \neq 1$  و  $k < 1$  فإن التمدد **تصغير** . (reduction)

## الوحدة 7

### مثال 1

أجد معامل التمدد في كلٍّ مما يأتي، ثم أحدّد ما إذا كان التمدد تكبيرًا أم تصغيرًا:

1




لإيجاد معامل التمدد أجد نسبة طول أحد أطوال الصورة إلى الطول المناظر له في الشكل الأصلي.

$$\frac{P'R'}{PR} = \frac{6}{14} = \frac{3}{7}$$

إذن، معامل التمدد  $k = \frac{3}{7}$ ، وبما أن  $0 < k < 1$  فإن التمدد يُعد تصغيرًا.

2




لإيجاد معامل التمدد أجد نسبة طول أحد أطوال الصورة إلى الطول المناظر له في الشكل الأصلي.

$$\frac{A'P'}{AP} = \frac{24}{9} = \frac{8}{3}$$


إذن، معامل التمدد  $k = \frac{8}{3}$ ، وبما أن  $k > 1$  فإن التمدد يُعد تكبيرًا.

أتحقق من فهمي:

3




يمكن إيجاد صورة النقطة  $P(x, y)$  في المستوى الإحداثي الناتجة عن تمدد مرکزه نقطة الأصل ومعامله  $k$  بضرب إحداثيّي النقطة  $P$  بمعامل التمدد  $k$ .



### التمدد في المستوى الإحداثي ومركزه نقطة الأصل

### مفهوم أساسي



- بالكلمات:** لإيجاد إحداثيات الصورة الناتجة عن تمدد مرکزه نقطة الأصل، أضرب الإحداثيين  $x$  و  $y$  لكلّ نقطة في الشكل الأصليّ في معامل التمدد  $k$ .

$$(x, y) \rightarrow (kx, ky)$$


**بالرموز:**

## مثال 2

1

إحداثيات رؤوس الشكل الرباعي  $VZXW$  هي:  $V(-2, 2), Z(-1, 3), X(1, 2.5), W(2, 1)$ . أمثل بيانياً  $VZXW$  وصورته الناتجة عن تمدد مركزه نقطة الأصل، ومعامله 2.5

الخطوة 1 أضرب الإحداثيين  $x$  و  $y$  لكل رأس في معامل التمدد 2.5




الشكل الأصلي	الصورة
$(x, y)$	$(2.5x, 2.5y)$
$V(-2, 2)$	$V'(-5, 5)$
$Z(-1, 3)$	$Z'(-2.5, 7.5)$
$X(1, 2.5)$	$X'(2.5, 6.25)$
$W(2, 1)$	$W'(5, 2.5)$

الخطوة 2 أمثل بيانياً  $V'Z'X'W'$  وصورته

2

إحداثيات رؤوس  $\Delta PQR$  هي:  $P(4, 4), Q(8, 0), R(6, -2)$ . أمثل بيانياً  $\Delta PQR$  وصورته الناتجة عن تمدد مركزه نقطة الأصل، ومعامله  $\frac{1}{2}$

الخطوة 1 أضرب الإحداثيين  $x$  و  $y$  لكل رأس في معامل التمدد  $\frac{1}{2}$



الشكل الأصلي	الصورة
$(x, y)$	$(\frac{1}{2}x, \frac{1}{2}y)$
$P(4, 4)$	$P'(2, 2)$
$Q(8, 0)$	$Q'(4, 0)$
$R(6, -2)$	$R'(3, -1)$

الخطوة 2 أمثل بيانياً  $\Delta P'Q'R'$  وصورته

3

تحقق من فهمي:

إحداثيات رؤوس  $\Delta ABC$  هي:  $A(2, 1), B(4, 1), C(4, -1)$ . أمثل بيانياً  $\Delta ABC$  وصورته الناتجة عن تمدد مركزه نقطة الأصل، ومعامله 1.5


إحداثيات رؤوس الشكل الرباعي  $KLMN$  هي:  $K(-3, 6), L(0, 6), M(3, 3), N(-3, -3)$ . أمثل بيانياً  $KLMN$

وصورته الناتجة عن تمدد مركزه نقطة الأصل، ومعامله  $\frac{1}{3}$

4

إرشاد: أستعمل أوراق المربعات الموجودة في نهاية كتاب التمارين.

## الوحدة 7




تعلّمتُ في المثالِ السابقِ كيفَ أجدُ صورةَ شكلٍ في المستوى الإحداثي تحتَ تأثيرِ تمدّدٍ مرکزه نقطةُ الأصلِ ومعاملهُ موجّبٌ ( $k > 0$ ), ويمكنُ أيضًا إيجادُ صورةَ شكلٍ في المستوى الإحداثي تحتَ تأثيرِ تمدّدٍ مرکزه نقطةُ الأصلِ ومعاملهُ سالبٌ ( $k < 0$ ) باستعمالِ القاعدةِ نفسِها.

إنَّ تمدّدَ الشكلِ في المستوى الإحداثي تحتَ تأثيرِ معاملٍ تمدّدٍ قيمته  $-k$  حيثُ  $k$  عددٌ موجّبٌ ومرکزه نقطةُ الأصلِ، هوَ نفسُه تمدّدُ الشكلِ تحتَ تأثيرِ تمدّدٍ معاملهُ  $k$  متبعًا بدورانٍ مقداره  $180^\circ$

### مثال 3

إحداثياتُ رؤوسِ  $\Delta FGH$  هيَ:  $F(-4, -2)$ ,  $G(-2, 4)$ ,  $H(-2, -2)$ . أمثلُ بيانياً  $\Delta FGH$  وصوريَّة الناتجةَ عن تمدّدٍ مرکزه نقطةُ الأصلِ، ومعاملهُ  $-\frac{1}{2}$



**الخطوة 1** أضربُ الإحداثيَّين  $x$  و  $y$  لـ كلّ رأسٍ في معاملِ التمدّد  $-\frac{1}{2}$

الشكلُ الأصليُّ	الصورةُ
$(x, y)$	$\rightarrow \left(-\frac{1}{2}x, -\frac{1}{2}y\right)$
$F(-4, -2)$	$\rightarrow F'(2, 1)$
$G(-2, 4)$	$\rightarrow G'(1, -2)$
$H(-2, -2)$	$\rightarrow H'(1, 1)$

**الخطوة 2** أمثلُ بيانياً  $\Delta F'G'H'$  وصوريَّة الناتجةَ





### أتحققُ من فهمي:

إحداثياتُ رؤوسِ  $\Delta PQR$  هيَ:  $P(1, 2)$ ,  $Q(3, 1)$ ,  $R(1, -3)$ . أمثلُ بيانياً  $\Delta PQR$  وصوريَّة الناتجةَ عن تمدّدٍ مرکزه نقطةُ الأصلِ، ومعاملهُ  $-2$



إرشاد: أستعملُ أوراقَ المربعاتِ الموجودةَ في نهايةِ كتابِ التمارينِ.



إذا كان الشكل باللون الأخضر صورةً للشكل باللون الأزرق تحت تأثير تمددٍ مركزه  $C$ ، فأجد معامل التمدد في كلٍّ مما يأتي، ثم أحدد ما إذا كان التمدد تكبيراً أم تصغيراً:



أنسخ كلَّ مُضلَّعٍ ممَّا يأتي على ورقة مربعاتٍ، ثُمَّ أرسم صورةً لَهُ تحت تأثير تمددٍ مركزه نقطةُ الأصلِ، باستعمال معامل التمدد المعطى أسفلاً:




أمثل المُضلَّع المُعطَى إِحدَاثِيَّاتٍ رُؤُوسِهِ بِيَانِيًّا، ثُمَّ أَمْثُلُ صورَتَهُ النَّاتِجَةَ عَنْ تمددٍ مركزه نقطةُ الأصلِ وَمعاملُهُ العَدْدُ  $k$  المُحدَّدُ في كُلِّ مِنَ الْمَسَائلِ الآتِيَّةِ:

- 7  $B(-5, -10), C(-10, 15), D(0, 5); k = \frac{1}{5}$
- 8  $L(0, 0), M(-4, 1), N(-3, -6); k = -4$
- 9  $W(8, -2), X(6, 0), Y(-6, 4), Z(-2, 2); k = -\frac{1}{2}$
- 10  $X(-1, 2), Y(2, 1), Z(-1, -3); k = \frac{7}{2}$

**اكتشف الخطأ:** في الحل الآتي، أوجَدَ سميرًّا معامل التمدد الذي يجعل المثلث الأخضر صورةً للمثلث الأزرق تحت تأثير تمددٍ مرکزٍ نقطةً الأصل. أكتشف الخطأ في حلِّه، وأصْحِّهُ.

11




**تحدد:** المثلث المبين في الشكل الآتي هو صورةً لمثلث تحت تأثير تحويلتين هندسيين: تمدد معامله 2 ومركزه نقطة الأصل، ثم انعكاس حول المحور  $u$ . أجد إحداثيات رؤوس المثلث الأصلي، وأبرر خطوات الحل.

12

### إرشاد

لإيجاد إحداثيات الشكل الأصلي، أجري الانعكاس أولاً حول المحور  $u$ ، ثم التمدد.



**مسألة مفتوحة:** أرسم مضلعًا في المستوى الإحداثي، ثم أرسم تكبيرًا وتصغيرًا باختيار معاملٍ ومركزٍ تمددٍ مناسين.

13

**اكتُب** كيف أجد صورةً لمضلع في المستوى الإحداثي تحت تأثير تمددٍ مرکزٍ نقطةً الأصل ومعامله  $k$ ؟

14




# اختبار نهاية الوحدة

في الشكل الآتي، إذا كان  $DFBE$  متوازي أضلاع، وكان  $AE = CF$ ، فأثبت أن  $ADCB$  متوازي أضلاع باستعمال البرهان ذي العمودين.



5


أجد قيمتي  $x$  و  $y$  اللتين يجعلان كل شكل رباعي ممّا يأتي متوازي أضلاع:



8  $x$

يبين الشكل المجاور  
المستطيل  $QRST$ .  
أجد كلاً ممّا يأتي:

9  $m\angle RPS$



أستعمل  
المجاور لأجد كلاً  
ممّا يأتي:


10  $m\angle AFD$

11  $m\angle BCF$

12  $y$

13  $x$

أختار رمز الإجابة الصحيحة لكل ممّا يأتي:




1  $\square LMNK$  في

المجاور، ما قيمة  $s$ ؟

- a) 5      b) 20  
c) 40      d) 70

2 تمثّل النقاط  $(8, 2), (1, -6), (8, 2), (1, -6)$  رؤوس متوازي أضلاع. أي النقاط الآتية تمثّل الرأس الرابع للمتوازي؟

- a)  $(5, 6)$       b)  $(14, 3)$   
c)  $(11, -6)$       d)  $(8, -8)$




3 يبيّن الشكل المجاور

المستطيل  $RSBF$ ، إذا

كان  $SF = 2x+15$

و  $RB = 5x-12$ ، فإن طول قطر المستطيل يساوي:

- a) 9      b) 1  
c) 18      d) 33





4 ما طول  $\overline{TU}$  في

الشكل المجاور؟


- a) 36      b) 90  
c) 40      d) 48

أنسخ كلَّ مضلعٍ مما يأتي على ورقة مربعاتٍ، ثُمَّ أرسم صورةً له تحت تأثير تمددٍ مركبٍ نقطةً الأصلِ، باستعمالِ معاملِ التمددِ المعطى أسفلَه:




### تدريب على الاختبارات الدولية

قيمةُ  $x$  التي تجعلُ الشكلَ الرباعيَّ  $MLPN$  متوازيًّا  
أضلاعٌ هيَ:



- a) 1    b) 3    c) 9    d) 27


قيمةُ  $x$  في الشكلِ المجاورِ هيَ:




- a) 9.5    b) 5    c) 4    d) 6.5

أحدَدْ ما إذا كانَ كُلُّ مثلثَينِ ممَّا يأتي متشابهَينَ أمْ لا، وإذا كانَا كذلكَ فاكتُبْ عبارةً التشابهِ، وأبْرُرْ إجابتي:

14




15




أجِدْ قيمةَ  $x$  التي تجعلُ  $m \parallel n$  في كُلِّ ممَّا يأتي:

16




17




أَسْتَعْمِلُ الْمُعْلَوَاتِ الْمُعْطَاهُ فِي الشَّكْلِ الْآتَى لِأَثْبَتَ

أَنَّ  $\overline{BC} \perp \overline{CD}$  باستعمالِ البرهانِ السُّهْمِيِّ.



18

**سياجُ:** يَبْيَّنُ الشَّكْلُ الْآتَى سِيَاجًا مَكْوَنًا مِنْ قِطْعَ حَدِيدِيَّةٍ مَرْتَبَةٍ بِاتِّجاهَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ. إِذَا افْتَرَضْتُ أَنَّ  $\angle 1 \cong \angle 2$ ، فَهَلِ الْمُسْتَقِيمَانِ  $r$  وَ  $s$  مَتَوَازِيَانِ؟ أَبْرُرْ إِجَابَتِي.



## الأشكال ثلاثية الأبعاد

### ما أهمية هذه الوحدة؟

تُعدُّ الهندسةُ ثلاثيةُ الأبعادِ واحدةً مِنْ أكثرِ فروعِ الرِّياضياتِ استعمالاً فِي التطبيقاتِ العلميةِ والحياتيةِ، وَقَدْ استعملَها العلماءُ لحسابِ حجمِ الكرةِ الأرضيةِ ومساحةِ سطحِها، ويستعملُها المهندسونَ لتصميمِ المبانيِ الجميلةِ.



### سأتعلمُ في هذه الوحدةِ

- رسمِ أشكالٍ ثلاثيةِ الأبعادِ باستعمالِ الرسمِ المتساويِ ورسمِ المساقطِ.
- تحديدِ الشكلِ الناتجِ مِنْ تقاطعِ المجسمِ معَ مستوىً، وعددِ مستوياتِ التمايلِ للمجسماتِ.
- إيجادِ مساحةِ سطحِ الكرةِ وحجمِها.

### تعلمتُ سابقاً:

- ✓ خواصِ الأشكالِ ثنائيةِ الأبعادِ.
- ✓ إيجادِ المساحةِ الكليةِ والحجمِ للأشكالِ ثلاثيةِ الأبعادِ.
- ✓ حسابِ مساحةِ الدائرةِ ومحيطِها.



# مشروع الوحدة: الأشكال ثلاثية الأبعاد

- أبني 3 تصاميم إضافية للمجسم الذي اخترته.  
أقطع كلّ مجسم صممته قطعاً مختلفاً، ثم أصيف الشكل الهندسي الناتج من القطع، ويمكّنني تلوين جهة القطع لتسهيل وصفه.

أرسم كلّ قطع على ورقة مربعة.

أجد حجم المجسم الذي اخترته، وأجد مساحة سطحه الكلية.

أعدّ عرضاً تقديمياً يتضمن صوراً أو مقطعاً مرئياً (فيديو) يوضح خطوات عملي في المشروع، والمساقط والمقاطع التي رسمتها.

## عرض النتائج:

- أعرض المجسمات التي صممّتها أمّاً طلبة صفي، وأوّل صفحه أهميتها وعلاقتها بما تعلّمهون في الوحدة.
  - أقدم العرض التقديمي، وأتحدّث بالتفصيل عن خطوات المشروع والنتائج التي توصلت إليها.


أستعدُّ ومجموعتي لتنفيذِ مشروعيِّ الخاصُّ الذي  
سنتعملُ فيه ما سنتعلَّمُه في هذه الوحدة حولَ رسمِ  
الأشكالِ ثلاثيَّة الأبعادِ باستعمالِ الرسمِ المتساويِّ لإنشاءِ  
مجسمٍ ورسمٍ مساقطٍ.

## المواد والأدوات:

- قطع بوليسترین.
  - لاصق.
  - وراق منقطة متسا


## خطوات تنفيذ المشروع:

- ١ أختار أحد المسمى الآتىين، وأحدد قياساته ثم أرسمه باستعمال الرسم المتساوي.



- أبني المجنّسَ الَّذِي صَمَمْتُهُ بِاسْتِعْمَالِ قَطْعٍ  
الْبُولِيسْتِرِينَ وَاللَّاصِقِ . 2

أرْسَمُ الْمَسَاقِطَ: الْعُلُوِيَّ، وَالْأَمَامِيَّ، وَالْجَانِبِيَّ،  
لِلْمَجَسِّمِ الَّذِي صَمَمْتُهُ عَلَى وَرْقَةٍ مَنْقُطَةٍ مُتَسَاوِيَةٍ  
الْقِيَاسِ . 3



## أستكشف

ما عدد المكعبات التي يتكون منها المجسم المجاور؟


## فكرة الدرس

أرسم أشكالاً ثلاثية الأبعاد باستعمال الرسم المتساوي ورسم المساقط.


## المصطلحات

الرسم المتساوي، المنظور، المسقط العلوي، المسقط الأمامي، المسقط الجانبي.

الرسم المتساوي (isometric drawing) طريقة لرسم الأشكال ثلاثية الأبعاد على ورقه ثنائية الأبعاد، تُستعمل فيها ورقه متساوية القياس مثلثة أو منقطة.




أشكال ثلاثية الأبعاد مرسومة على ورقه متساوية القياس



ورقة مثلثة متساوية القياس



ورقة منقطة متساوية القياس




يبين الشكل المجاور مجسمًا ثلاثيًّا الأبعاد مرسومًا على ورقه منقطة متساوية القياس مكونًا من مكعبات وحدة.

ما عدد مكعبات الوحدة التي يتكون منها المجسم؟


يتكون المجسم من ثلاث طبقات، وفي كل طبقة 8 مكعبات وحدة. إذن، يتكون المجسم من 24 مكعب وحدة.

1

## الوحدة 8





**الخطوة 2** أرسمُ الحوافَ الّتي أصبحَت ظاهرةً مِنَ المكعباتِ المحيطةِ بالمكعبِ الأحمرِ.



إذا أزيلَ المكعبُ الملوّنُ بالأحمرِ مِنَ المجسمِ، فأنسُمُ الشكّلَ الجديدَ على ورقةٍ منقّطةٍ متساويةِ القياسِ.

**الخطوة 1** أزيلُ الحوافَ الشّلّاثَ الظاهرةَ للمكعبِ الأحمرِ.



**أتحققُ من فهمي:** يبيّنُ الشكّلُ المجاورُ مجسمًا ثلاثيًّا الأبعادَ مرسومًا على ورقةٍ منقّطةٍ متساويةِ القياسِ مكوّنًا مِنْ مكعباتٍ وَحدَةٍ.


**1** ما عددُ مكعباتِ الوَحدَةِ الّتي يتكونُ مِنْها المجسمُ؟

**2** إذا أزيلَ المكعبُ الأحمرُ مِنَ المجسمِ، فأنسُمُ الشكّلَ الجديدَ على ورقةٍ منقّطةٍ متساويةِ القياسِ.

ملحوظةٌ: أستعملُ الورقَ المنقّطَ متساويَ القياسِ الموجودَ في كتابِ التمارينِ.

الاحظ من الرسم المتساوي في الأمثلة السابقة أن:


- الحواف المخفية لا تظهر في الرسم.
- أحد الأوجه يظل لمساعدة على تصور الشكل ثلاثي الأبعاد.




## مثال 2

أرسم على ورقة منقطة متساوية القياس متوازي مستطيلات طوله 5 وحدات، وعرضه 3 وحدات، وارتفاعه 3 وحدات.


**الخطوة 2** أكمل رسم المستطيل العلوي لل مجسم.




**الخطوة 1** أبدأ من نقطة محددة على الورقة، وأرسم منها ثلاث حواف لل مجسم في ثلاثة اتجاهات؛ وحدات لأسفل، و5 وحدات لليسار، و3 وحدات لليمين.



**الخطوة 4** أصل بين الرؤوس المقابلة، ثم أظلل الوجه الأمامي من المجسم.



**الخطوة 3** أرسم القطع المستقيمة الرأسية الظاهرة من المجسم بطول وحدتين.




**تحقق من فهمي:**

أرسم على ورقة منقطة متساوية القياس متوازي مستطيلات طوله 4 وحدات، وعرضه 3 وحدات، وارتفاعه 3 وحدات.

## الوحدة 8


تُسمى النقطة التي يُنظرُ للمجسم من خلالها المنظور (perspective)، وستعمل منظورات مختلفة عند رسم المجسم؛ لأنَّ منظوراً واحداً لا يعطي تصوّراً مكتملاً عنِ المجسم.

يُعدُّ **المسقطُ العلويُّ** (plan view) المنظور العلوي للمجسم، **والمسقطُ الأماميُّ** (front view) المنظور الأمامي للمجسم، **والمسقطُ الجانبيُّ** (side view) المنظور الجانبي للمجسم.



### أتعلم



الحدود التي تظهر داخل المساقط تدل على وجود ارتفاعات مختلفة للمجسم.





### مثال 3

أرسم المساقط: العلوي، والأمامي، والجانبي، لكلِّ من المجسمات الآتية:


1




2



3




4



إرشاد: أستعمل أوراق المربعات الموجودة في نهاية كتاب التمارين.

يمكن استعمال المساقط وورقة منقطة متساوية القياس لرسم أشكال ثلاثة الأبعاد.



#### مثال 4




مسقط أمامي

مسقط علوي

مسقط جانبي



أستعمل ورقة منقطة متساوية القياس والمساقط المجاورة، لرسم المجسم من مكعبات وحدة.




- يظهر المقطع العلوي أن قاعدة المجسم على شكل مستطيل طوله 4 وحدات وعرضه 3 وحدات.

- يظهر المقطع الأمامي أن الارتفاع الكلي للمجسم 3 وحدات.

- يظهر المقطع الجانبي أن المجسم متوازي مستطيلات يعلوه مكعبان متباينان في المتضيق.

- أرسم المجسم الذي توصلت إلى وصفه من خلال المساقط على الورقة المنقطة متساوية القياس، ثم أظلل الجهة الأمامية.




## الوحدة 8

### أتحقق من فهمي:



أستعمل ورقةً منقطةً متساوية القياسِ والمَساقَةِ المجاورةً، لرسمِ المجسَّمِ مِنْ مكعباتٍ وَحدَةٍ.

ملحوظة: أستعمل الورقَ المنقطَ متساوِيَ القياسِ الموجَدَ في كتابِ التمارينِ.






مَسْقَطٌ جَانِبِيٌّ

مَسْقَطٌ عُلُوٌّ

مَسْقَطٌ أَمَامِيٌّ



أجِدُّ عَدْدَ مكعباتِ الْوَحْدَةِ الَّتِي يَتَكَوَّنُ مِنْهَا كُلُّ مجسَّمٍ مِمَّا يَأْتِي:



ما عَدْدُ مكعباتِ الْوَحْدَةِ الَّتِي يَتَكَوَّنُ مِنْهَا المجسَّمُ المجاورُ؟

إِذَا أُزِيلَ المكعبُ الأَحْمَرُ مِنَ المجسَّمِ، فَأَرْسِمُ الشَّكَلَ الْجَدِيدَ عَلَى ورقةٍ منقطةٍ متساوية القياسِ.

إِذَا وُضِعَ مكعبٌ وَحدَةٌ فَوْقَ كُلِّ مُتَوَازِي مُسْتَطِيلَاتٍ مِمَّا يَأْتِي لِيَغْطِيَ الْمَرْسُومَ باللَّوْنِ الْأَزْرَقِ، فَأَرْسِمُ الشَّكَلَ الْجَدِيدَ عَلَى ورقةٍ منقطةٍ متساوية القياسِ:



### أَتَدْرِي وَأَهْلُ الْمَسَائِلِ



3

4

أَفْكُرْ  
كَمْ حَافَةً أُزِيلُ مِنَ  
الْمَجسَّمِ لِأُزِيلَ المكعبُ  
الْأَحْمَرُ؟

أرسم متوازي مستطيلاتٍ على ورقٍ منقطٍ متساوية القياس طوله 3 وحداتٍ، وعرضه 3 وحداتٍ، وارتفاعه 6 وحداتٍ.


7

أرسم متوازي مستطيلاتٍ على ورقٍ منقطٍ متساوية القياس طوله 4 وحداتٍ، وعرضه 2 وحداتٍ، وارتفاعه 3 وحداتٍ.


8

يتكون كُل مجسمٍ ممّا يأتي مِن 6 مكعباتٍ وحيدةٍ. أجد أقلَّ عددٍ مِن مكعباتِ الوحدةِ التي يمكن إضافتها إلى كُل مجسمٍ ليصبح متوازي مستطيلاتٍ:

9



10




### إرشاد


أحدّد موضع المكعباتِ الستة التي تكمل الشكلَ إلى متوازي مستطيلاتٍ أولاً قبل البدء بالرسمِ.

أرسم كُل مجسمٍ ممّا يأتي على ورقٍ منقطٍ متساوية القياسِ:

11




12




أرسم المساقط: العلويُّ، والأماميُّ، والجانيُّ، لكُلِّ مِنَ المجسماتِ الآتيةِ:

13



14





### إرشاد

استعمل أوراقَ المربعاتِ الموجودةَ في نهايةِ كتابِ التمارينِ.


## الوحدة 8

أرسم المساقط: العلوي، والأمامي، والجاني، لكلٍ من المجسمات الآتية: (أرسم كلَّ

مسقطٍ بـأبعادِه الحقيقية)




أستعمل ورقةً منقَّطةً متساوية القياسِ والمساقط المُعطاة، لرسمِ كلِّ مجسمٍ ممَّا يأتي مِنْ مكعباتٍ وَحدَةٍ:



مسقطٌ أماميٌّ

مسقطٌ علويٌّ


مسقطٌ جانبيٌّ



مسقطٌ أماميٌّ

مسقطٌ علويٌّ


مسقطٌ جانبيٌّ



**اكتشفُ الخطأً:** رسمٌ عامٌّ متوازيٌ المستطيلاتِ المجاورَ على ورقةٍ منقَّطةٍ متساوية القياسِ. أكتشفُ الخطأَ الَّذِي وقعَ فِيهِ عامٌّ، وأصْحِحْهُ بـأبعادِ رسمِ المتوازيِ على ورقةٍ منقَّطةٍ متساوية القياسِ.

**تحدِّد:** أستعملُ ورقةً منقَّطةً متساوية القياسِ، لرسمِ المجسمِ المُعطى مساقطُه في ما

يأتي مِنْ مكعباتٍ وَحدَةٍ.



مسقطٌ أماميٌّ

مسقطٌ علويٌّ

مسقطٌ جانبيٌّ

19

مهارات التفكير العليا

20

كيفَ أرسمُ المساقطَ الثلاثةَ لمجسمٍ؟

أكتبُ

21



## أستكشف


كيف يمكن تقطيع قطعة الجبن المجاورة للحصول على شرائح مستطيلة الشكل؟

## فكرة الدرس

- أحدّد الشكل الناتج من تقاطع المجسم مع مستوىً.
- أحدّد عدد مستويات التمايل للمجسم.
- أتعّرفُ بـ المجسمات الدورانية.

## المطلبات


المقطع، المقطع العرضي، المنشور، مستوى التمايل، المجسم الدوراني، محور الدوران.



أفترض أنَّ مستوىً قطع مجسمًا، عندها يُسمى الشكل ثنائيُّ الأبعاد الناتج من تقاطع مستوىً مع مجسم مقطعًا (section). فمثلاً، يبيّنُ الشكل المجاور أنَّ تقاطع مستوىً ومنشورٍ ثلاثيًّا هوَ مثلثٌ. ويُسمى المقطع الموازي لقاعدةِ المجسم المقطع العرضي (cross section).


أحدّد المقطع الناتج من تقاطع المستوى والمجسم في كلِّ مما يأتي، وأحدّد أيُّ المقاطع هوَ مقطعٌ عرضيٌّ:

1




المقطع مستطيل.

2




المقطع سداسيٌّ، وهوَ مقطعٌ عرضيٌّ؛ لأنَّه موازٍ للقاعدة.

3




المقطع مثلثٌ، وهوَ مقطعٌ عرضيٌّ؛ لأنَّه موازٍ للقاعدة.


4



5



6




أتحققُ من فهمي:

## الوحدة 8

المنشور (prism) هو شكل ثلاثي الأبعاد، له قاعدتان متساويتان متطابقتان ومتوازيتان، ومقاطعه العرضية جميعها متساوية، ويمكن إيجاد حجم المنشور بضرب مساحة المقطع العرضي له (القاعدة) في ارتفاعه.

### حجم المنشور

### مفهوم أساسي




- **بالكلمات:** حجم المنشور يساوي ناتج ضرب مساحة مقطعه العرضي في ارتفاعه.

$$V = Bh$$

حيث  $h$  ارتفاع المنشور، و  $B$  مساحة المقطع العرضي للمنشور.

### مثال 2




أجد حجم المنشور المجاور.

الخطوة 1 أجد مساحة المقطع العرضي.

أجد مساحة المقطع العرضي ( $B$ ) بجمع مساحتي المستطيلين  $B_1$  و  $B_2$ .

$$B = B_1 + B_2$$

صيغة مساحة المقطع العرضي



$$= (l_1 \times w_1) + (l_2 \times w_2)$$

صيغة مساحة المستطيل

$$= (6 \times 5) + (3 \times 2)$$

أعوّض

$$= 30 + 6 = 36$$

أجد الناتج

إذن، مساحة المقطع العرضي للمنشور  $36 \text{ m}^2$

الخطوة 2 أجد حجم المنشور.

$$V = Bh$$

صيغة حجم المنشور

$$= 36 \times 9$$

أعوّض


$$= 324$$

أجد الناتج


إذن، حجم المنشور  $324 \text{ m}^3$

## أتحققُ من فهمي:


أجذب حجم المنشور المجاور.



**مستوى التماثل** (plane of symmetry) هو مستوى يقسم الشكل ثلاثي الأبعاد إلى نصفين متطابقين كل منهما صورة مرآة للآخر، فمثلاً تبين الأشكال الآتية مستويات التماثل جميعها لمتوازي المستويات.





### مثال 3



بيّن الشكل المجاور منشوراً ثلاثياً قاعده مثلاً متطابق الأضلاع. أحذّ عدد مستويات التماثل للمنشور.

بما أن قاعدة المنشور مثلث متطابق الأضلاع، فإن لها ثلاثة خطوط تماثل، وهذا يعني أن المنشور مستوى تماثل مرتبطة بكل من هذه الخطوط الثلاثة، ويوجد أيضا مستوى تماثل مواز للقاعدة يقطع المنشور إلى نصفين متطابقين.

ومنه فإن المجموع الكلي لمستويات تماثل هذا المنشور هو 4 مستويات.




## أتحققُ من فهمي:

أحذّ عدد مستويات التماثل للمنشور السداسي المتظّم المجاور.


## الوحدة 8

يمكن إكمال الرسم المتساوي لشكلٍ ثلاثي الأبعاد إذا علمت مستوى تماثلٍ الشكل وأحد النصفين المتطابقين حوله.

### مثال 4



أكمل رسم المجسم في الشكل المجاور، علمًا بأنَّ المستوى المظلل مستوى تماثلٍ.  
بما أنَّه يوجد 4 مكعباتٍ في الشكل، فهذا يعني أنَّه يجب إضافة 4 مكعباتٍ أخرى على الجهة الأخرى من مستوى التمازج.



### أتحققُ من فهمي:

أكمل رسم المجسم في الشكل المجاور، علمًا بأنَّ المستوى المظلل مستوى تماثلٍ.

ملحوظة: أستعمل الورق المنقَط متساوي القياس الموجود في كتاب التمارين.


### المجسمات الدوّارانية



### نشاط هندسيٌّ



#### الإجراءات:




الخطوة 1 أرسم مستطيلًا على ورقة مقوَّاة، ثم أقصُّه.

الخطوة 2 أستعمل شريطًا لاصقًا لثبيت المستطيل على ماصة.

الخطوة 3 أدورُ نهاية الماصة بين يديَّ، وأراقب النتيجة.

#### أطلُّ النتائج:


ما المجسم الناتج من دَوَران المستطيل حول الماصة؟





**المجسم الدواراني** (solid of revolution) هو شكل ثالثي الأبعاد ناتجٌ من دورانٍ شكلٍ مسْتَوٍ حولَ محورٍ، وُسَمِّيَ المستقيمُ الذي يدورُ حولَهُ الشكلُ المستويِّ **محور الدواران** (axis of revolution). فمثلاً، عندَ تدويرِ مثلثٍ حولَ محورٍ يحوي أحدَ أضلاعِهِ، فإنَّ المجسم الدوارانيُّ الناتجٌ مخروطٌ.

### مثال 5




أصفُ المجسم الدوارانيَّ الناتجٌ من دورانِ كلٍّ مِنَ الأشكالِ المستوية الآتية حولَ المحورِ المُعْطَى، ثُمَّ أحدَّدُ قياسَاتِهِ وأرسِمُهُ:



المجسم الدوارانيُّ الناتجٌ أسطوانيٌّ ارتفاعُهُ 9 وطُولُ نصفِ قُطْرِ قاعدهِها 4



المجسم الدوارانيُّ الناتجٌ مخروطٌ ارتفاعُهُ 5 وطُولُ نصفِ قُطْرِ قاعديِّهِ 2




**أتحققُ من فهمي:**


## الوحدة 8

أحدّد المقطع الناتج من تقاطع المستوى والمجسم في كلّ مما يأتي، وأحدّد أي المقطع هو مقطع عرضي:


### أتدرب وأحل المسائل




أجد حجم كلّ منشورٍ مما يأتي:



بيّن الشكلُ الآتي مكعباً، أحدّد عدد مستويات التماثيل لهذا المكعب.



بيّن الشكلُ الآتي منشوراً خماسياً منتظمًا، أحدّد عدد مستويات التماثيل لهذا المنشور.



### معلومة


للمقاطع أهميّة كبيرة في دراسة الهياكل التشريحية للحيوانات والنباتات، ومن خلالها كشف العلماء النقاب عن الأنسجة والأعضاء المخفية.

8


### أفكّر

إذا كانت قاعدة المنشور مصلّعاً منتظمًا، فما علاقته ذلك بمستويات التماثيل؟

9



- 10 يبيّنُ الشكُلُ المجاورُ مجسمًا مقطُعًه العرضيُّ نصفُ دائِرَةً، أحَدُّدْ عدَدَ مستوياتِ التماثِلِ لِهذا المجسم.





- 11 يبيّنُ الشكُلُ المجاورُ منشورًا مقطُعًه العرضيُّ على شكلِ حرفِ T، أحَدُّدْ عدَدَ مستوياتِ التماثِلِ لِهذا المنشور.

أُكْمِلُ رسمَ المُجسَّمِ في كُلِّ مَا يَأْتِي، علَمًا بِأَنَّ الْمُسْتَوِيَّ الْمُظَلَّ مُسْتَوِيٌّ تَمَاثِلٌ:



أَصْفِ الْمُجسَّمَ الدُّوَرَانِيَّ الناتِجَ مِنْ دَوْرَانِ كُلِّ مِنَ الْأَشْكَالِ الْمُسْتَوِيَّةِ الْآتِيَّةِ حَوْلَ الْمُحَورِ الْمُعَطَّى، ثُمَّ أَحَدُّدْ قِيَاسَاتِهِ وَأَرْسِمُهُ:




- 16 عَلَبَةً: يبيّنُ الشكُلُ المجاورُ عَلَبَةً سَطحَاهَا الْعُلُوِيُّ والْسُّفْلَيُّ مُتَطَابِقَانِ، وَكُلُّهُمَا مُكَوَّنٌ مِنْ مُسْتَطِيلٍ طُولُهُ 9 cm وَعَرْضُهُ 4 cm مَعَ نَصْفِ دَائِرَةٍ عَنْدَ كُلِّ نَهَايَةٍ. إِذَا كَانَ ارْتِفَاعُ الْعَلَبَةِ 3 cm، فَأَجِدُ حَجْمَهَا.

### إِرْشَادٌ

أَسْتَعْمَلُ الْوَرَقَ الْمَنْقَطَ مُتَسَاوِيَ الْقِيَاسِ الْمُوْجَدَ فِي كِتَابِ التَّمَارِينِ.

## الوحدة 8

**دعامة فولاذية:** يبيّن الشكل الآتي المقطع العرضي لدعامة فولاذية على شكل منشور، طولها 2 m، إذا كانت كتلة  $1 \text{ cm}^3$  من الفولاذ 79 g، فأجد كتلة الدعامة.




17


### معلومة

يُعد الفولاذ المادة الأكثر شيوعاً لبناء البنية التحتية، وفي الصناعات حول العالم؛ فهو يستخدم لتصنيع جميع المواد بدءاً من الإبرة إلى ناقلات البترول.

**تبرير:** أرسم المجسم المركب الناتج من تدوير كلٍّ من الأشكال المستوية الآتية حول المحور المعطى، ثم أصف المجسم المركب الناتج وأحدّد قياساته:



18




19

20

**تحدد:** أرسم على ورقة منقطة متساوية القياس مجسمًا مكوناً من 6 مكعبات وحدة لـ 5 مستويات تماثل.

**تبرير:** أجد المساحة الكلية لسطح المجسم الناتج من دوران المثلث الآتي حول المحور  $z$ ، وأبّرر إجابتي. (أكتب الإجابة بدالة  $\pi$ )



21

### إرشاد

أحدّد أبعاد المجسم الناتج عن الدوران أولاً، لأنّه من الممكن من إيجاد مساحة سطحه الكلية.

كيف يمكن تحديد عدد مستويات التماثل للمجسم؟

أكتب


22

## فكرة الدرس

أجد مساحة سطح الكرة وحجمها.


## المصطلحات

الكرة، الدائرة الكبيرة، نصف الكرة.



## استكشف

كم سنتيمترا مربعا من الجلد يلزم لصنع الكرة المجاورة؟




**الكرة** (sphere) هي مجموعة النقاط جميعها في الفضاء التي تبعد ثابتاً عن نقطة معلومة تسمى مركز الكرة.

- نصف قطر الكرة هو قطعة مستقيمة تصل بين مركز الكرة وأي نقطة على الكرة.
- وَتَرُ الكرة هو قطعة مستقيمة طرفاها أي نقطتين على الكرة.
- قُطْرُ الكرة وَتَرٌ يمر في المركز.

يمكن إيجاد صيغة لمساحة سطح الكرة يقص كريراً كما في الشكل أدناه وملاحظة القطعتين اللتين تتكونان منها.


الاحظ أن كل قطعة مكونة تقريراً من دائرة متصلتين متlapping، مما يعني أن الكرة بأكملها مكونة من 4 دوائر متطابقة تقريراً طول نصف قطر كل منها  $r$ ، وبما أن مساحة الدائرة  $A = \pi r^2$ ، فإن مساحة القطع التي تتكون منها الكرة تساوي  $4\pi r^2$ ، وهذه هي الصيغة العامة لمساحة سطح الكرة.



مساحة كل دائرة  
تساوي  $\pi r^2$  تقريراً

## مساحة سطح الكرة

## مفهوم أساسيٌّ



- بالكلمات:** مساحة سطح الكرة ( $S.A$ ) هي حاصل ضرب  $4\pi$  في مربع طول نصف قطرها.


$$S.A = 4\pi r^2 \quad \text{• بالرموز:}$$

حيث  $r$  طول نصف قطر الكرة.

### مثال 1

أجد مساحة سطح كل كرة ممّا يأتي، وأقرب إجابتي لأقرب جزء من عشرة:

1



$$S.A = 4\pi r^2$$

صيغة مساحة سطح الكرة

$$= 4\pi(7)^2$$

أعوّض  $r = 7$

$$= 196\pi$$


أبسط

$$\approx 615.8$$

أستعمل الآلة الحاسبة

إذن، مساحة سطح الكرة  $196\pi \text{ cm}^2$ ، أو  $615.8 \text{ cm}^2$  تقريرياً.

2



بما أن طول قطر الكرة  $10 \text{ cm}$  فإن هذا يعني أن طول نصف قطرها  $5 \text{ cm}$

$$S.A = 4\pi r^2$$

صيغة مساحة سطح الكرة

$$= 4\pi(5)^2$$

أعوّض  $r = 5$

$$= 100\pi$$

أبسط


$$\approx 314.2$$

أستعمل الآلة الحاسبة


إذن، مساحة سطح الكرة  $100\pi \text{ cm}^2$ ، أو  $314.2 \text{ cm}^2$  تقريرياً.

## أتحقق من فهمي:

3




4



يمكن إيجاد طول قطر الكرة إذا علمت مساحة سطحها.

### مثال 2



$$S.A = 30\pi \text{ m}^2$$

أجد طول قطر الكرة المجاورة إذا علمت أن مساحة سطحها  $30\pi \text{ m}^2$ ، وأقرب إجابة لأقرب جزء من عشرة.

$$S.A = 4\pi r^2$$

صيغة مساحة سطح الكرة

$$30\pi = 4\pi r^2$$

أعوّض

$$r^2 = 7.5$$

أقسم طرفي المعادلة على  $4\pi$

$$r = \pm \sqrt{7.5}$$

تعريف الجذر التربيعي

$$= \pm 2.7$$


أستعمل الآلة الحاسبة

وبما أن الطول لا يمكن أن يكون سالبًا، إذن، طول نصف قطر الكرة يساوي  $2.7 \text{ m}$  تقريبًا. أجد طول قطرها ( $2r$ ) كالتالي:

$$2r = 2 \times 2.7 = 5.4$$

إذن، طول قطر الكرة يساوي  $5.4 \text{ m}$  تقريبًا.

## أتحقق من فهمي:




$$S.A = 20.25\pi \text{ m}^2$$


أجد طول قطر الكرة المجاورة إذا علمت أن مساحة سطحها  $20.25\pi \text{ m}^2$ ، وأقرب إجابة لأقرب جزء من عشرة.

## الوحدة 8

إذا قطعَ مسْتَوِيَّ كُرَةً فَإِنَّهُ يَقْطِعُهَا فِي نَقْطَةٍ أَوْ فِي دَائِرَةٍ، وَإِذَا كَانَ الْمَسْتَوِيُّ يَحْتَوِي مَرْكَزَ الْكُرَةِ فَعَنْدَهَا يُسَمَّى هَذَا التَّقَاطِعُ **الدَّائِرَةُ الْكَبِيرِيَّةُ** (great circle)، فَالدَّائِرَةُ الْكَبِيرِيَّةُ لَهَا مَرْكَزُ الْكُرَةِ نَفْسُهُ، وَطَوْلُ نَصْفِ قُطْرِهَا مِسَاوٍ لَطَوْلِ نَصْفِ قُطْرِ الْكُرَةِ، وَمَحِيطُهَا هُوَ مَحِيطُ الْكُرَةِ نَفْسُهُ.



تقسيم كُل دائرَة كُبُرِي الكرة إلى نصفَيْن متطابقَيْن يُسمَى كُل منْهُما نصفَ كُرَة (hemisphere).



### مثال 3: من الحياة



**الكرة الأرضية:** يبلغ طول خط استواء الكرة الأرضية حوالي 40070 km تقريباً.

أجد مساحة سطح الكرة الأرضية التقريرية، مقرّبًا إجابتي لأقرب جزءٍ من عشرة.

بما أنَّ خطَّ الاستواء يمثلُ محيطَ دائِرَةً كُبْرِي لِلكرةِ الأرضِيَّةِ، فطُولُهُ يُمثِّلُ محيطَ الكرةِ الأرضِيَّةِ.

## أجُدْ طولَ نصْفِ قُطْرِ الْكُرْبَةِ الْأَرْضِيَّةِ.

$$C = 2\pi r$$

صَفَرٌ مُحِيطٌ الدَّائِرَةِ

$$40070 = 2\pi r$$

$$C = 40070 \text{ أعمى}^{ُ}$$

$$r \approx 6377.3$$

أَسْتَعْمَلُ الْأَلْهَةَ الْحَاسِةَ

إذن، طول نصف قطر الكرة الأرضية 6377.3 km تقريباً.

**الخطوة 2** أستعمل نصف القطر لإيجاد مساحة سطح الكرة الأرضية.

$$S.A = 4\pi r^2$$

$$= 4\pi(6377.3)^2$$

$$\approx 511073731$$

صيغة مساحة سطح الكرة

أعرض

أستعمل الآلة الحاسبة

إذن، مساحة سطح الكرة الأرضية  $511073731 \text{ km}^2$  تقريرًا.




**تحقق من فهمي:**

**كرة:** يبلغ محيط كرة بلاستيكية  $60 \text{ cm}$ ، أجد مساحة سطحها التقريرية مقاربًا إجابتي  
لأقرب عدد صحيح.

## حجم الكرة

## مفهوم أساسي




• **بالكلمات:** حجم الكرة ( $V$ ) يساوي حاصل ضرب  $\frac{4}{3}\pi$  في مكعب طول نصف قطرها.

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

حيث  $r$  طول نصف قطر الكرة.

**مثال 4** أجد حجم كل كرة أو نصف كرة مما يأتي، مقاربًا إجابتي لأقرب عدد صحيح:

1



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

$$= \frac{4}{3}\pi(8)^3$$

$$= \frac{2048}{3}\pi$$

$$\approx 2145$$

صيغة حجم الكرة

أعرض


أبسط

أستعمل الآلة الحاسبة

إذن، حجم الكرة  $2145 \text{ cm}^3$  تقريرًا.

## الوحدة 8

2



$$V = \frac{1}{2} \left( \frac{4}{3} \pi r^3 \right)$$

صيغة حجم نصف الكرة

$$= \frac{1}{2} \left( \frac{4}{3} \pi (4)^3 \right)$$

أعرض

$$= \frac{128}{3} \pi$$

أبسط


$$\approx 134$$

استعمل الآلة الحاسبة


إذن، حجم نصف الكرة  $134 \text{ cm}^3$  تقريباً.

أتحقق من فهمي:

3




4



يمكن إيجاد حجم المجمّع المركّب بتحديد الأشكال الهندسية التي يتكون منها والعملية الحسابية اللازمة لإيجاد حجمه.

مثال 5



المجمّع المجاور لأسطوانة تحتوي نصف كرة مفرغة، أجد حجم الجزء المتبقى من الأسطوانة دون نصف الكرة مقرّباً إجابتي لأقرب جزء من مائة.

لإيجاد حجم الجزء المتبقى من الأسطوانة دون نصف الكرة ( $V$ ), أطرح حجم نصف الكرة ( $V_2$ ) من حجم الأسطوانة ( $V_1$ )

$$V = V_1 - V_2$$

صيغة حجم المجمّع

$$= \pi r^2 h - \frac{1}{2} \left( \frac{4}{3} \pi r^3 \right)$$

بتعويض صيغتي حجم الأسطوانة وحجم نصف الكرة

$$= \pi(2)^2 (2) - \frac{1}{2} \left( \frac{4}{3} \pi(2)^3 \right)$$

أعرض  $r = 2, h = 2$

$$= 8\pi - \frac{16}{3}\pi$$

أبسط

$$= \frac{8}{3}\pi$$


أطرح

$$\approx 8.38$$

استعمل الآلة الحاسبة

إذن، حجم المجمّع  $\frac{8}{3}\pi \text{ dm}^3$  أو  $8.38 \text{ dm}^3$  تقريباً.





## أتحقق من فهمي:



أجد حجم المجسم المجاور، المكون من مخروط ارتفاعه 12 cm يعلوه نصف كرة طول نصف قطرها 6 cm ، مقرّباً إجابتي لأقرب جزء من مئهٍ.

## أتدرب وأحل المسائل

أجد مساحة سطح كلّ كرة أو نصف كرة مما يأتي، وأقرب إجابتي لأقرب جزء من عشرة:



عشرة:

### إرشاد

لإيجاد مساحة سطح نصف الكرة، لا أنسى إضافة مساحة الدائرة الكبرى.

أجد طول قطر الكرة في كلّ من الحالات الآتية، مقرّباً إجابتي لأقرب جزء من عشرة:





6 كرّة حجمها  $200 \text{ cm}^3$

7 كرّة مساحة سطحها  $200 \text{ cm}^2$


5 كرّة حجمها  $50 \text{ m}^3$

### إرشاد

لإيجاد طول نصف قطر الكرة في السؤالين 7 و 6 أحل المعادلة بأخذ الجذر التكعيبي للطرفين.



## الوحدة 8




**الألعاب:** يتكون الجزء العلوي من لعبة الغزل المجاورة من مخروط ونصف كرة. أجد بدلالة  $\pi$  :

12 حجم لعبة الغزل.

13 المساحة الكلية لسطح لعبة الغزل.

14 كرة معدنية طول نصف قطرها 15 cm، صُهرت وأعيد تشكيلها لأسطوانة طول نصف قطرها 6 cm، أجد ارتفاع الأسطوانة.



15 مكعب طول ضلعه 5 cm يحتوي نصف كرة مفرغة طول نصف قطرها 2.5 cm، أجد حجم الجزء المتبقى من المكعب مقارناً إجابتي لأقرب عدد صحيح.

### معلومة

تعُد لعبة الغزل من أقدم الألعاب التي اكتشفها علماء الآثار، حيث يعود تاريخها إلى القرن الخامس والثلاثين قبل الميلاد.



16 تبرير: ما عدد مستويات التمايل للكرة؟ أبّرر إجابتي.

تحدد: تصنع شركة كرات صغيرة من الفولاذ المقاوم للصدأ (ستيل) لعجلات الأحذية طول قطر كل منها 4 mm، أجد عدد الكرات الصغيرة التي يمكن للشركة تصنيعها من 1 متراً مكعباً من (ستيل).




17 تحدد: كرة طول قطرها 10 cm نُحتت من مكعب خشبي طول ضلعه 10 cm، أحسب النسبة المئوية لكمية الخشب المهدر.

### مهارات التفكير العليا

18 أكتب: كيف أجد مساحة سطح كرة وحجمها إذا علمت طول نصف قطرها؟

# اختبار نهاية الوحدة


إذا وضع مكعب وحدة فوق متوازي المستطيلات الآتي ليغطي المربع باللون الأزرق، فأرسم الشكل الجديد على ورقة منقطة متساوية القياس.





أرسم على ورقة منقطة متساوية القياس متوازي مستطيلات طوله 4 وحدات، وعرضه 4 وحدات، وارتفاعه 7 وحدات.

أرسم على ورقة منقطة متساوية القياس متوازي مستطيلات طوله 4 وحدات وعرضه وحدتان، وارتفاعه 6 وحدات.

أرسم المساقط: العلوي، والأمامي، والجاني لل مجسم الآتي:



أحد المقطع الناتج من تقاطع المستوى والمجسم في كل مما يأتي، وأحد أى المقاطع هو مقطع عرضي:




أختار رمز الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي:

أحد الأشكال الآتية لا ينتج من تقاطع مكعب مع مستوى:

(a) المستطيل (b) المثلث

(c) النقطة (d) الدائرة



مساحة السطح التقريرية للكرة المجاورة تساوي:


- (a)  $3217 \text{ cm}^2$  (b)  $4287 \text{ cm}^2$   
 (c)  $12861 \text{ cm}^2$  (d)  $17149 \text{ cm}^2$

إذا كانت مساحة الدائرة الكبرى لكرة تساوي  $33 \text{ cm}^2$ ، فإن مساحة سطح الكرة تساوي:

- (a)  $42 \text{ cm}^2$  (b)  $132 \text{ cm}^2$   
 (c)  $117 \text{ cm}^2$  (d)  $264 \text{ cm}^2$

ما عدد مكعبات الوحدة التي يتكون منها المجسم أدناه؟

إذا أزيل المكعب الملون بالأحمر من المجسم، فأرسم الشكل الجديد على ورقة منقطة متساوية القياس.









أكمل رسم المجسم في الشكل المجاور، علماً بأنَّ المستوى المظلل مستوى تماثل.

16

أجُد مساحة سطح كُلّ كُرة أو نصف كُرة ممَّا يأتي، ثُمَّ أجُد حجمَها، وأقْرَب إجاباتِي لأقْرَب جزءٍ من مئةٍ:



### تدريب على الاختبارات الدولية

ما قُطْرُ الكرة التي مساحة سطحها  $100\pi \text{ m}^2$  ؟

21

- a)  $5 \text{ m}$       b)  $10 \text{ m}$   
 c)  $5\pi \text{ m}$       d)  $25\pi \text{ m}$


أيُّ المُجَسَّمَاتِ الآتية لَهُ عدُدٌ لا نهائِيٌّ مِنْ مستوياتِ التماثلِ ؟

22

- (a) هرمٌ ثلاثيٌّ منتظمٌ  
 (b) متوازيٌ مستطيلاتٌ  
 (c) أسطوانةٌ  
 (d) منشورٌ سداسيٌّ منتظمٌ


يبَيِّنُ الشَّكُلُ الآتِيَ منْ شُوراً مقطعاً العَرْضِيُّ شَبَهُ منْحَرِفٍ، أحَدُّ عَدَدِ مستوياتِ تِمَاثِلِ المنشورِ.

12




أَرْسِمُ المَسَاقَطَ: الْعُلُوِيُّ، وَالْأَمَامِيُّ، وَالْجَانِبِيُّ، لِكُلِّ مِنَ الْمُجَسَّمَاتِ الآتِيَةِ: (أَرْسِمُ كُلَّ مَسَقَطٍ بِأَبعَادِ الْحَقِيقَيَّةِ)

13




14



أجُد حجمَ المنشورِ الآتِيِّ:

15



# الوحدة 9

## الإحصاء والاحتمالات

### ما أهمية هذه الوحدة؟

برزت أهمية الإحصاء والاحتمالات حديثاً بسبب الاعتماد المتزايد على الحواسيب في شتى مجالات الحياة، فتتجزأ عن ذلك بيانات كبيرة نحتاج إلى تحليلها، وفهمها؛ لتبني قرارات صحيحة بناءً عليها. وسأتعلم في هذه الوحدة مهارات إحصائية كثيرة ستساعدني على اتخاذ قرارات صحيحة في حياتي.



### سأتعلم في هذه الوحدة:

- تمثيل بيانات بالصندوق ذي العارضتين، وتفسيرها.
- اختيار التمثيل الأنسب لمجموعة من البيانات.
- إيجاد الفضاء العيني لتجربة عشوائية.
- إيجاد احتمال حدث مركب.

### تعلمت سابقاً:

- ✓ إيجاد الوسيط والمدى لمجموعة من البيانات.
- ✓ تمثيل مجموعة من البيانات بالقطاعات الدائرية، والجداول التكرارية، والمخططات التكرارية، ومخططات الساق والورقة.
- ✓ إيجاد احتمال وقوع الحوادث.

# مشروع الوحدة: جمع البيانات، وتحليلها



أمثل البيانات التي حصلت عليها من إجابات كل سؤال باستعمال إحدى طرائق تمثيل البيانات التي تعلمتها سابقاً، وأبرر اختيار كل تمثيل.

7



أكتب استنتاجاً اعتماداً على إجابات الطلبة عن كل سؤال.

8

أصف حادثاً بسيطاً وحادثاً مركباً حول البيانات النوعية التي حصلت عليها.

9

أستعد ومجموعي لتنفيذ مشروعي الخاص الذي سنستعمل فيه ما ستعلمته في هذه الوحدة لجمع بيانات، وتحليلها، وكتابة استنتاجات حولها.



## خطوات تنفيذ المشروع:

- أكتب تقريراً أضمنه الأسئلة الإحصائية التي كتبتها بحيث يلي كل سؤال تمثيل إحصائي للبيانات التي حصلت عليها من إجابات السؤال، والاستنتاج الذي وضعته حول هذه البيانات.
- أضمن التقرير مقاييس التربيعية المركزية، ومقاييس الشتتة، والقيمة المتطرفة لكل مجموعة بيانات.
- أناقش مع زملائي / زميلاتي صحة الاستنتاجات التي توصلت إليها.

1 اختيار موضوعاً شائقاً، وأكتب ثلاثة أسئلة إحصائية حوله تكون إجاباتها بيانات عدديّة، وسؤالين إحصائيّين تكون إجاباتهما بيانات نوعيّة. مثلاً، قد يكون الموضوع (الحافظ على البيئة) أو (خطر التدخين).

2 أصمم استبانة بطريقة جاذبة، وأكتب فيها الأسئلة الإحصائية التي أعددتها، ثم أطبع 20 نسخة منها على الأقل.

3 أطلب إلى 20 طالباً / طالبة في مدرستي الإجابة عن فقرات الاستبانة.


4 أجد لبيانات العددية التي حصلت عليها:

- مقاييس التربيعية المركزية (الوسط الحسابي، والوسط، والمنوال).

5 أمثل البيانات بالصندوق ذي العارضتين.

6 أحدد القيمة المتطرفة لكل مجموعة بيانات (إن وجدت).

## أَسْتَكْشِفُ



سَأَلْتُ هَدِيلُ مَجْمُوعَةً مِنْ طَالِبَاتٍ صَفْهَا عَنْ عَدْدِ أَكْوَابِ الْمَاءِ الَّتِي تَشْرُبُهَا كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فِي الْيَوْمِ، وَمَثَلَّتْ مَا حَصَلَتْ عَلَيْهِ بِالنِّقَاطِ كَمَا فِي الشَّكْلِ الْمَجَاوِرِ:

(1) أَجْدُ وَسِيطَ هَذِهِ الْبَيَانَاتِ.

(2) أَرْتِبُ الْبَيَانَاتِ فِي مَجْمُوعَتَيْنِ: مَجْمُوعَةِ النَّصْفِ الْأَعْلَى، وَمَجْمُوعَةِ النَّصْفِ الْأَدْنَى. مَا عَدْدُ الْقِيمِ فِي كُلِّ مَجْمُوعَةٍ؟

(3) أَجْدُ الْوَسِيطَ لِكُلِّ مَجْمُوعَةٍ.

(4) وَضَعَتْ هَدِيلُ الْفَرْضِيَّةَ الْآتِيَّةَ، هَلْ الْفَرْضِيَّةُ الَّتِي وَضَعَتْهَا هَدِيلُ صَحِيحةٌ؟  
يَشْرُبُ رُبُّ رُبُّ مَجْمُوعَةِ الطَّالِبَاتِ كَوْبِيًّا مَاءً أَوْ أَقْلَى فِي الْيَوْمِ.

## فَكْرَةُ الدَّرْسِ

- أَتَعْرَفُ إِلَى الْمَدِيِّ الرُّبَيْعِيِّ وَعَلَاقَتِهِ بِتَشْتِتِ الْبَيَانَاتِ.
- أَمْثُلُ بَيَانَاتِيِّ بِالصُّنْدوقِ ذِي الْعَارِضَتَيْنِ، وَأَفْسُرُهَا.

## الْمُصْطَلَحَاتُ


مَقَائِيسُ التَّشْتِتِ، الْمَدِيُّ، الرُّبَيْعِيَّاتُ، الْمَدِيُّ الرُّبَيْعِيُّ، الرُّبَيْعُ الْأَدْنَى، الرُّبَيْعُ الْأَعْلَى، الْقِيمَةُ الْمُتَطَرِّفَةُ، الصُّنْدوقُ ذِي الْعَارِضَتَيْنِ.

## أَتَذَكَّرُ

الْوَسْطُ الْحَسَابِيُّ وَالْوَسِيطُ وَالْمِنْوَالُ هُيَّ مَقَائِيسُ نَزْعَةِ مَرْكَزِيَّةٍ وَتَصَفُّ مَرْكَزِيَّةُ الْبَيَانَاتِ بِطَرَائِقٍ مُخْتَلِفَةٍ.

تُسْتَعْمَلُ مَقَائِيسُ التَّشْتِتِ (measures of variation) لِوَصْفِ مَقْدَارِ تَشْتِتِ الْبَيَانَاتِ وَتَبَاعِدِهَا. وَيُعَدُّ الْمَدِيُّ (range) أَحَدُ مَقَائِيسِ التَّشْتِتِ، وَهُوَ يُسَاوِي الْفَرَقَ بَيْنَ أَكْبَرِ قِيمِ الْبَيَانَاتِ وَأَصْغَرِهَا، وَيُرْمَزُ إِلَيْهِ بِالرَّمْزِ R.

الرُّبَيْعِيَّاتُ (quartiles) قِيمٌ تَقْسِمُ الْبَيَانَاتِ إِلَى أَرْبَعِ مَجْمُوعَاتٍ مُتَسَاوِيَّةٍ تَحْوِي كُلُّ مِنْهَا رُبُّ الْبَيَانَاتِ، إِذْ يَقْسِمُ الْوَسِيطُ الْبَيَانَاتِ إِلَى مَجْمُوعَتَيْنِ مُتَسَاوِيَتَيْنِ.



وَسِيطُ النَّصْفِ الْأَدْنَى مِنَ الْبَيَانَاتِ، وَيُسَمَّى الرُّبَيْعُ الْأَدْنَى (lower quartile), وَيُرْمَزُ إِلَيْهِ بِالرَّمْزِ Q1، وَرُبُّ الْبَيَانَاتِ يَقْلُ عَنْهُ أَوْ يُسَاوِيهِ.

وَسِيطُ النَّصْفِ الْأَعْلَى مِنَ الْبَيَانَاتِ، وَيُسَمَّى الرُّبَيْعُ الْأَعْلَى (upper quartile), وَيُرْمَزُ إِلَيْهِ بِالرَّمْزِ Q3، وَرُبُّ الْبَيَانَاتِ يَزِيدُ عَلَيْهِ أَوْ يُسَاوِيهِ.

## الوحدة 9

أستنتج مما سبق أنَّ النصفَ الأوَسْطَ مِنَ البياناتِ يقعُ بَيْنَ الْرُّبَيْعَيْنِ: الأعلىِ، والأدنىِ، وهذا يقودُنَا إلى مقياسٍ آخرَ مِنْ مقاييسِ التشتتِ هُوَ المَدِ الرُّبَيْعِيُّ (interquartile range) الَّذِي يُرْمَزُ إِلَيْهِ بالرِّمزِ (IQR).

### المَدِ الرُّبَيْعِيُّ

### مفهومٌ أساسيٌّ



- **بالكلماتِ:** المَدِ الرُّبَيْعِيُّ هُوَ مَدِ النصفِ الأوَسْطِ مِنَ البياناتِ، وهوَ الفرقُ بَيْنَ الْرُّبَيْعَيْنِ: الأعلىِ، والأدنىِ.

$$IQR = Q_3 - Q_1$$

### بالرموزِ:

مساحاتُ المحافظاتِ الأردنية	
المحافظة	المساحةُ (بالآلاف الكيلومترات المربعة)
عجلونُ	0.4
عمانُ	7.5
العقبةُ	6.9
البلقاءُ	1.1
إربدُ	1.5
جرشُ	0.4
الكركُ	3.4
معانُ	32.8
مأدبا	0.9
المفرقُ	26.5
الطفيلهُ	2.2
الزرقاءُ	4.7

### مثال 1: من الحياةِ



**محافظاتُ:** يبيّن الجدولُ المجاورُ مساحاتِ المحافظاتِ الأردنيةٍ مقرَّبةٌ إلى أقربِ جزءٍ مِنْ عشرةٍ.

### أجدُ المَدِ.

1

أرتُبُ البياناتِ تصاعديًّا.

0.4, 0.4, 0.9, 1.1, 1.5, 2.2, 3.4, 4.7, 6.9, 7.5, 26.5, 32.8

### أجدُ المَدِ.


2

أكْبُرُ قِيمِ البياناتِ 32.8 وأصغرُها هي 0.4، إذنَ المَدِ هوَ:

$$R = 32.8 - 0.4 = 32.4$$

### أجدُ المَدِ الرُّبَيْعِيًّا (IQR).

2



$$IQR = Q_3 - Q_1 = 7.2 - 1 = 6.2$$

إذنَ، المَدِ الرُّبَيْعِيُّ (IQR) للبياناتِ هوَ 6.2.

أَسْتَعْمِلُ الْمَدِيُّ وَالْمَدِيُّ الرُّبَيْعِيُّ لِوَصْفِ الْبَيَانَاتِ.

مَدِيُّ هَذِهِ الْبَيَانَاتِ 32.4 أَلْفَ كِيلُومِتِرٍ مَرْبِعٍ، وَرُبْعُ مَحَافِظَاتِ الْمُمْلَكَةِ مِسَاحَاتُهَا أَلْفُ كِيلُومِتِرٍ مَرْبِعٍ أَوْ أَقْلَى، وَرُبْعُ الْمَحَافِظَاتِ أَيْضًا مِسَاحَاتُهَا 7.2 آلَافَ كِيلُومِتِرٍ مَرْبِعٍ أَوْ أَكْثَرُ، وَتَرَوَحُ مِسَاحَاتُ النَّصْفِ الْأَوْسَطِ مِنَ الْمَحَافِظَاتِ بَيْنَ أَلْفِ كِيلُومِتِرٍ مَرْبِعٍ وَ7.2 آلَافِ كِيلُومِتِرٍ مَرْبِعٍ، وَلَا تَتَجَاهُزُ الْفَرْوَنْ بَيْنَ مِسَاحَاتِهَا 6.2 آلَافِ كِيلُومِتِرٍ مَرْبِعٍ.

### أَتَحَقَّقُ مِنْ فَهْمِيَّ:

عَدُّ النَّقَاطِ				
64	61	67	59	60
58	57	71	56	62

يَبْيَّنُ الْجُدُولُ الْمُجَارُ عَدَّ النَّقَاطِ الَّتِي سَبَّلَهَا فَرِيقُ كُرَةِ سَلَةٍ فِي أَحَدِ الْمَوَاسِمِ:


أَجْدُ الْمَدِيُّ الرُّبَيْعِيَّ.

4

أَسْتَعْمِلُ الْمَدِيُّ وَالْمَدِيُّ الرُّبَيْعِيُّ لِوَصْفِ الْبَيَانَاتِ.

6

الْقِيمَةُ الْمُتَطَرِّفَةُ (outlier) هِيَ قِيمَةٌ أَكْبَرُ بِكَثِيرٍ أَوْ أَقْلَى بِكَثِيرٍ مِنْ قِيمَةِ الْوَسِيْطِ، وَتَعْدُّ أَيُّ قِيمَةٍ تَقْلُّ عَنِ الْمَقْدَارِ ( $Q_1 - 1.5(IQR)$ ) أَوْ تَزِيدُ عَلَى الْمَقْدَارِ ( $Q_3 + 1.5(IQR)$ ) قِيمَةً مُتَطَرِّفَةً.



### مَثَال٢

الساق	الورقة
1	2 2 7
2	3 3 3 4 4 5 6 6 8 8 9
3	0 1 4 6
4	0 6

أَجْدُ الْقِيمَةِ الْمُتَطَرِّفَةَ (إِنْ وُجِدَتْ) فِي الْبَيَانَاتِ الْمُمَثَّلَةِ بِمَخْطُطِ السَّاقِ وَالْوَرْقَةِ الْمُجَارِ.

أَجْدُ الرُّبَيْعِيَّاتِ.

1

الْخُطُوْتُ.

الساق	الورقة
1	2 2 7
2	3 3 3 4 4 5 6 6 8 8 9
3	0 1 4 6
4	0 6

أَسْتَعْمِلُ الْأَقْوَاسَ لِتَحْدِيدِ النَّصْفِ الْعُلُوِّ وَالْسُّفْلَى مِنَ الْقِيمِ، ثُمَّ أَحْدَدُ الْقِيمَ الْلَّازِمَةَ لِإِيْجَادِ الرُّبَيْعِيَّاتِ.

$$Q_1 = \frac{23 + 23}{2} = 23 \quad Q_3 = \frac{30 + 31}{2} = 30.5$$

المفتاح:  $1|2 = 12$

## الوحدة 9

الخطوة 2 أجد المدى الربعي.

$$IQR = Q_3 - Q_1 = 30.5 - 23 = 7.5$$

الخطوة 3 أحدد القيمة المتطرفة (إن وجدت).

$$Q_1 - 1.5(IQR) = 23 - 1.5(7.5) = 11.75$$

$$Q_3 + 1.5(IQR) = 30.5 + 1.5(7.5) = 41.75$$

بما أن البيانات لا تحتوي قيمة أقل من 11.75، لكنها تحتوي القيمة 46 وهي أكبر من 41.75، إذن القيمة المتطرفة الوحيدة هي 46

الساق	الورقة
5	3 6 8
6	5 8
7	0 3 7 7 9
8	1 4 8 8 9
9	9

المفتاح:  $5|3 = 53$


أتحقق من فهمي:

أجد القيمة المتطرفة (إن وجدت) للبيانات الممثلة بمحطط الساق والورقة المجاور.

يُستخدم الصندوق ذو العارضتين (box-and-whisker plot) لتمثيل البيانات باستعمال القيمتين العظمى والصغرى ورئيسيات البيانات.

### التعلم

يُستخدم الصندوق ذو العارضتين لتحديد مدى انتشار (تباعد) البيانات.



1

الخطوة

أرتّب البيانات تصاعدياً، وأجد الوسيط، والرّبعيات، والقيمتين: العظمى، والصغرى:



2


الخطوة

أرسم خط أعداد، وأعين عليه نقاطاً تمثل كلّاً من: القيمتين العظمى والصغرى، والوسط، والرّبع الأدنى، والرّبع الأعلى.

3

الخطوة

أرسم صندوقاً باستعمال الرّبعيات، ثم أرسم خطأ رأسياً داخل الصندوق يمر بالوسط، ثم أرسم العارضتين من الصندوق إلى القيمتين: العظمى، والصغرى.




أتحقق من فهمي:

أستعمل الصندوق ذا العارضتين لتمثيل البيانات الآتية التي تمثل أعمار المعلّمين في إحدى المدارس:

30, 52, 26, 35, 45, 22, 49, 32, 28, 50, 42, 35

يقسّم الصندوق ذو العارضتين البيانات إلى أربعة أجزاء: جزء الصندوق، والعارضتين. ويحتوي كل جزء من الأجزاء الأربع العدد نفسه من القيم تقريباً.



تدلّ أطوال أجزاء مخطط الصندوق ذي العارضتين على مقدار تشتّت البيانات، فكلما زاد طول الصندوق أو طول عارضته ازدادت البيانات انتشاراً وتباعدًا.


## الوحدة 9

### مثال 4: من الحياة



**أقراص تخزين:** يبيّن الصندوق ذو العارضتين أدناه سعة تخزين مجموعة من الأقراص

الصلبة بوحدة الجيجابايت:



1 أصف توزيع البيانات.

بما أنَّ كلَّ عارضة تمثل رُبُع البيانات، ويمثل الصندوق نصف البيانات، إذن:

- تراوح سعة رُبُع الأقراص الصلبة بين 160 و 220 جيجابايتاً.
- تراوح سعة نصف الأقراص الصلبة بين 220 و 280 جيجابايتاً.
- تراوح سعة رُبُع الأقراص الصلبة بين 280 و 300 جيجابايتاً.

2 أجد المدى الربيعي للبيانات.

$$IQR = Q_3 - Q_1 = 280 - 220 = 60$$


إذن، المدى الربيعي 60 جيجابايتاً، وهذا يعني أنَّ النصف الأوسط من أقراص التخزين لا تتجاوز الفروق بين ساعاتهما 60 جيجابايتاً.

3

هل البيانات أكثر تشتتاً أسفل الربيع الأدنى أم فوق الربيع الأعلى؟ أبُرُّ إجابتني.

بما أنَّ العارضة السفلية أطول من العارضة العليا، فهذا يعني أنَّ البيانات أسفل الربيع الأدنى أكثر تشتتاً من البيانات فوق الربيع الأعلى.

4 أتحقق من فهمي:



ساعات: يبيّن تمثيل الصندوق ذي العارضتين المجاور

أسعار الساعات في أحد المحلات بالدينار.

أصف توزيع البيانات.



5 أجد المدى الربيعي للبيانات.

هل البيانات أكثر تشتتاً أسفل الربيع الأدنى أم فوق الربيع الأعلى؟ أبُرُّ إجابتني.

6

يمكن استعمال الصندوق ذي العارضتين المزدوج للمقارنة بين مجموعتي بيانات.


## مثال 5: من الحياة



علامات: يبيّن تمثيل الصندوق ذي العارضتين المزدوج أدناه علامات طلبة الصف الثامن في مادة الرياضيات في الشعبتين

(أ) و (ب) في إحدى المدارس:

أي الشعبتين علامات الطلبة فيها أكثر تشتتاً؟ أبرز إجابتـي.



الاحظ أن المدى والمدى الرئيسي لعلامات الطلبة في الشعبـة (ب) أكبر من المدى والمدى الرئيسي في الشعبـة (أ)، ومنه فإن علامات الطلبة في الشعبـة (ب) أكثر تشتتاً.


أي الشعبـتين علامات الطلبة فيها أفضل؟ أبرز إجابتـي.

علامات الطلبة أفضل في الشعبـة (أ)؛ لأن نصف الطلبة حصلوا على علامة 90 فأكثر، في حين أن ربع الطلبة فقط في الشعبـة (ب) حصلوا على علامة 90 فأكثر.

## أتحقق من فهـمي:



هواتف: يبيّن تمثيل الصندوق ذي العارضتين المزدوج أدناه أسعار الهواتف النقالة بالدينار في المحلـين (أ) و (ب):



أي المحلـين أسعار الهواتف فيه أكثر تشتتاً؟ أبرز إجابتـي.

أي المحلـين أسعار الهواتف فيه أعلى؟ أبرز إجابتـي.



## الوحدة 9

### أتدرب وأحل المسائل



أجد المدى والربيعيات والمدى الربيعي لكل مجموعة بياناتٍ مما يأتي:

1  $85, 77, 58, 69, 62, 73, 55, 82, 67, 77, 59, 92, 75$

2  $28, 42, 37, 31, 34, 29, 44, 28, 38, 40, 39, 42, 30$

الرتبة	النوع
19	3 5 5
20	2 2 5 8
21	5 8 8 9 9 9
22	0 1 7 8 9
23	2

المفتاح:  $19|3 = 193$

الرتبة	النوع
5	0 3 7 9
6	1 3 4 5 5 6
7	1 5 6 6 9
8	1 2 3 5 8
9	2 5 6 9
10	
11	7

المفتاح:  $5|0 = 5.0$

أجد القيمة المتطرفة (إن وجدت) لكل مجموعة بياناتٍ مما يأتي:

5  $52, 40, 49, 48, 62, 54, 44, 58, 39$


6  $133, 62, 152, 127, 168, 146, 174$

7  $4.8, 5.5, 4.2, 11.5, 3.4, 7.5, 1.6, 3.8$

مدة التحليق (min)			
$13\frac{1}{2}$	$21\frac{1}{2}$	21	$16\frac{3}{4}$
$10\frac{1}{4}$	19	32	$26\frac{1}{2}$
29	$16\frac{1}{4}$	$28\frac{1}{2}$	$18\frac{1}{2}$



**طائرة ورقية:** يبيّن الجدول المجاور مدة تحليق عددٍ من الطائرات الورقية بالدقائق. أجد المدى والمدى الربيعي للبيانات، ثم أمثلها بالصندوق ذي العارضتين.



يبيّن التمثيل بالنقاط المجاورة عدد الساعات التي يقضيها بعض الطلبة في الدراسة للامتحان. أمثل البيانات بالصندوق ذي العارضتين.

8

تؤثّر 4 قوى مختلفة في تحليق الطائرة الورقية، وهي قوى: الدفع، والرفع، والجاذبية، والسحب، لذا تختار المواد الخفيفة لقاوم الطائرة الجاذبية وتحلق بسهولة.

9

## معلومة

يُعدُّ الفهدُ الصيادُ من أسرعِ الحيواناتِ، ويمكنُ أنْ تبلغَ سرعتُه 110 km/h خلالَ 3 ثوانٍ من انطلاقِه.



**سرعةٌ:** يبيّنُ الجدولُ أدناهُ سرعةً مجموعَةً مِنَ الحيواناتِ بالكيلومترِ لـكُلّ ساعَةٍ.

الحيوان	السرعةُ (km/h)
الفهدُ الصيادُ	100
النَّمرُ	58
القطةُ	48
الفيلُ	40
الفأْرُ	13
العنكبوتُ	2

أمثلُ البياناتِ بالصُّندوقِ ذي العارضَتَينِ.

10

أجدُ المَدِي الرُّبَيعِيَّ للبياناتِ.

11

أجدُ القيَمَ المُتطرِّفةَ (إِنْ وُجِدَتْ).

12

أصُفُّ توزيعَ البياناتِ.


13

هلِّ البياناتُ أكْثُرُ تشتَّتاً أَسْفَلَ الرُّبَيعِ الأَدْنِيَّ أمْ فَوْقَ الرُّبَيعِ الأَعْلَى؟ أَبْرُرُ إِجَابَتي.

14

**أفلامٌ:** يبيّنُ تمثيلُ الصُّندوقِ ذي العارضَتَينِ أدناهُ مدةً عَرَضِ مجموعَةٍ مِنَ الأَفْلَامِ

بالدَّقَائِقِ:



ما النسبةُ المئويةُ للأفلامِ الَّتِي تزيدُ مَدَّةُ عَرَضِها على 120 دِقِيقَةً؟

15

هلِّ البياناتُ أكْثُرُ تشتَّتاً أَسْفَلَ الرُّبَيعِ الأَدْنِيَّ أمْ فَوْقَ الرُّبَيعِ الأَعْلَى؟ أَبْرُرُ إِجَابَتي.


16

أجدُ المَدِي الرُّبَيعِيَّ للبياناتِ.

17

## الوحدة 9

يبيّن تمثيل الصندوق ذي العارضتين المزدوج أدناه مدة انتظار المرضى عند طبيبي الأسنان: أحمد، وسهام:



- أجد المدى الربيعي لمدة انتظار المرضى عند الطبيبة سهام.
- أجد المدى الربيعي لمدة انتظار المرضى عند الطبيب أحمد.
- يرغب أنور بمراجعة أحد الطبيبين، أيهما أنسحه بزيارة؟ أبرر إجابتي.

18


19

20

21

### مهارات التفكير العليا

**اكتشف الخطأ:** ورد في التمثيل بالصندوق ذي العارضتين الآتي خطأ، اكتشفه، وأصححه. علماً أن التمثيل للقيم 2, 6, 3, 3, 7, 4, 6, 9, 6, 8, 5, 8.



**مسألة مفتوحة:** أكتب مجموعة من البيانات قيمة المدى الربيعي لها 15 وتحتوي على قيمتين متطرفتين.

22

**مسألة مفتوحة:** أكتب مجموعة من البيانات عندما أمثلها بالصندوق ذي العارضتين يكون طول كل من الصندوق والعارضتين متساوياً، وأبرر كيفية اختيار القيم.

23

كيف أمثل بيانات باستخدام الصندوق ذي العارضتين؟ 

24



## فكرة الدرس

- اختار التمثيل الأنسب لبيانات معطاة.
- أكتب استدلاً حول بيانات مماثلة.

## المطلحات

البيانات العددية، البيانات النوعية، الاستدلال.

الطلاب المترشحون	نسبة الأصوات
سمير	43%
آلاء	28%
ريم	29%

يبين الجدول المجاور نسبة الأصوات التي حصلت عليها طالبات الصف الثامن المترشحات للبرلمان الطلابي. أيهما أفضل لتمثيل هذه البيانات: الأعمدة البيانات، أم القطاعات الدائرية؟ أبُرُّ إجابتي.

البيانات العددية (numerical data) هي بيانات يمكن رصدها على صورة أرقام، وأيضاً يمكن قياسها وإجراء العمليات الحسابية عليها، وترتيبها تصاعدياً أو تنازلياً، مثل: الكتلة، والطول، ودرجة الحرارة. أما البيانات النوعية (categorical data) فهي بيانات غير رقمية يمكن ملاحظتها ولا يمكن قياسها، مثل: لون العيون، وأنواع الحيوانات، ومكان الولادة. وعند تمثيل البيانات يجب تحديد ما إذا كانت عدديّة أم نوعيّة؛ لتحديد التمثيل الأنسب.

## اختيار التمثيل الأنسب

## مفهوم أساسٍ



## التمثيل بالصور



يُستعمل لتمثيل البيانات النوعية.

## الأعمدة البيانات



يُستعمل لتمثيل البيانات النوعية والمقارنة بين فئاتها.

## القطاعات الدائرية



يُستعمل لتمثيل البيانات النوعية حين يكون الهدف من التمثيل مقارنة الجزء بالكل.

## التمثيل بالنقاط



يُستعمل لتمثيل البيانات النوعية أو العددية المنفصلة، وإظهار عدد مرات تكرار كل قيمة في مجموعة البيانات.

## الخطوط البيانات



يُستعمل لتمثيل البيانات العددية التي تتغير مع الزمن.

## الساق والورقة



يُستعمل لتمثيل البيانات العددية بحيث تظهر القيم جميعها في التمثيل.

## الصندوق ذو العارضتين



يُستعمل لتمثيل البيانات العددية لدراسة مقدار تشتت البيانات وتباعدها.

## المخطط التكراري



يُستعمل لتمثيل البيانات العددية المنظمة في فترات ذات تكرارات.

## الوحدة 9

أختار تمثيلاً مناسباً لكلّ ممّا يأتي، وأبرّر إجابتي:

### مثال 1

1 عدد الطلبة في مسابقة حفظ الأحاديث النبوية الشريفة كلّ عام.

بما أنَّ البيانات عدديّة تتغيّر مع الزمن، فإنَّ التمثيل بالخطوط البيانية هو الاختيار الأنسب لتمثيلها.

2 الرياضة الأكثر نفسيلاً لطلبة الصف الثامن.

بما أنَّ البيانات نوعية وتعلّق بجزءٍ من كلّ، فإنَّ التمثيل بالقطاعات الدائرية هو الاختيار الأنسب لتمثيلها.

3 توزيع عدد سكّان المملكة الأردنية الهاشمية بحسب الفئات العمرية.

بما أنَّ البيانات عدديّة موزعة على فئات، فإنَّ التمثيل بالمخطط التكراري هو الاختيار الأنسب لتمثيلها.

### أتحقق من فهمي:

4 عدد ساعات الدراسة لطلبة الصف الثامن في إحدى المدارس.

5 المسافة التي يقطعها أحمد بسيارته كلّ شهر.

6 توزيع دخل الأسرة على المتطلبات المنزليّة.

الاستدلال (inference) هو عبارةٌ يمكنُ التوصلُ إليها من تحليلٍ بياناتٍ تَمَّ جمعُها حولَ الظاهرة أو الموضوع قيد الدراسة، ويفضلُ استعمال لغة احتمالية للتعبير عن الاستدلال؛ لأنَّ النتيجة توضع بناءً على عيّنةٍ صغيرةٍ من المجتمع.

### مثال 2: من الحياة



السبت	
الأحد	
الإثنين	
الثلاثاء	
الأربعاء	
المفتاح: كلّ  تدلّ على 10 أشخاص.	

يبين التمثيل بالصور المجاور عدد الأشخاص الذين ارتدوا النادي الرياضي في 5 أيام متالية.

1 ما عدد الأشخاص الذين ارتدوا النادي الرياضي يوم السبت؟

بما أنَّ كلّ صورةٍ تعبر عن 10 أشخاص، وبما أنَّه توجد 7 صورٍ مقابل يوم السبت، إذن فإنَّ عدد الأشخاص الذين ارتدوا النادي يوم السبت 70 شخصاً.

أجد الوسط الحسابي لعدد الأشخاص الذين ارتدوا النادي يومي الأحد والإثنين.

عدد الأشخاص الذين ارتدوا النادي يوم الأحد 45 شخصاً، وعدد هم يوم الإثنين 35 شخصاً.

إذن، الوسط الحسابي لعدد الأشخاص يومي الأحد والإثنين هو:

$$\bar{x} = \frac{45 + 35}{2} = \frac{80}{2} = 40$$

أجمع القيم، وأقسمها على عددهما، وأبسط

أكتب استدلاًلاً حول موعد ذهاب الأشخاص إلى النادي، بالاعتماد على التمثيل.

يظهر من التمثيل أن أكبر عدد من الأشخاص يرتدون النادي الرياضي يوم السبت، ويستمر عددهم بالانخفاض وصولاً إلى يوم الأربعاء، ومنه يمكنني كتابة استدلال يحتوي كلمات احتمالية كما يلي:

من المتوقع أن عدد الأشخاص الذين يرتدون النادي الرياضي يقل مع مضي أيام الأسبوع ابتداءً من يوم السبت.

السبت	
الأحد	
الإثنين	
الثلاثاء	
الأربعاء	
المفتاح: كل تدل على 10 أشخاص.	



المشي	
السيارة	
الحافلة	
الدراجة	
المفتاح: كل يمثل طالب.	

تحقق من فهمي: 

يبين التمثيل بالصور المجاورة وسيلة النقل التي يستعملها مجموعة من الطلبة للوصول إلى المدرسة. أكتب استدلاًلاً حول كيفية وصول الطلبة إلى المدرسة معتمداً على التمثيل.

تعلمتُ في المثال السابق أنه يمكن التوصل إلى استدلالات بتحليل بيانات مماثلة، ولكن في بعض الأحيان تكون التمثيلات مضللة، مما يؤدي إلى التوصل إلى استدلالات غير صحيحة. ومن هذه التمثيلات المضللة استعمال تدريج غير مكتمل على المحور الرئيسي (محور *z*).

يبيّن التمثيلان الآتيان متوسط أسعار الشقق السكنية في عامين متتاليين. أيُّ التمثيلين مضلل؟ أبُرُّ إجابتَي.



العنوان



تَدْلُّ الْعَلَامَةُ كَعَلَى أَنَّ  
الْتَّدْرِيْجَ عَلَى الْمَحْوِرِ لَا  
غَيْرُ مُكْتَمِلٍ.


يُظهر التمثيل بالأعمدة جهة اليسار أنَّ متوسطَ أسعارِ الشققِ في العام 2 زادَ بما يقاربُ ثلاثةَ أمثالٍ متوسطِ أسعارِ الشققِ عنه في العام 1، لأنَّ التدرجَ على محورِه الرأسيِّ غيرُ مكتملٍ، في حينِ أنَّ متوسطَ أسعارِ الشققِ زادَ بمقدارِ 500 دينارٍ فقطُ. أمَّا التمثيل بالأعمدةِ جهة اليمينِ فلا يُظهرُ فرقاً كبيراً بينَ العامَيْنِ في متوسطِ أسعارِ الشققِ؛ لأنَّ التدرجَ على محورِه الرأسيِّ مكتملٌ.

إذن، التمثيل بالأعمدة جهة اليسار مضلل.

أتحقق من فهمي:


يبيّن التمثيلان الآتيان أرباح إحدى الشركات بآلاف الدنانير. أيُّ التمثيلين مضلل؟ أبُرُّ إجابتي.





بالاعتماد على التمثيل بالصور المجاور، استدلال همام أنَّ عددَ علبِ المواد الغذائية المترمِّمَةِ بِها وعددَ علبِ الجبوبِ تقريباً متساوٍ. هلِ استدلالُ همامِ دقيقٌ؟ أبُرُّ إجابتِي.

تمثِّلُ كُلُّ صورةِ العددِ نفسهِ مِنَ الأشياءِ، ولكنْ لأنَّ حجمَ الصورةِ المستعملةِ للتَّعبيرِ عَنِ الجبوبِ أَكْبَرُ مِنْ حجمِ الصورةِ المستعملةِ للتَّعبيرِ عَنِ الموادِ الغذائيةِ المعلبةِ، يظُهُرُ أنَّ العددِ مِنَ النوعَيْنِ تقريباً متساوٍ، في حينِ أَنَّ عدَّةَ علبِ الجبوبِ نصفُ عدَّةِ علبِ المعلباتِ.



### أتحققُ من فهمي:

بالاعتماد على التمثيل بالصورِ المجاورِ، استدلتُ هناءُ أنَّ عددَ الأشخاصِ الَّذِينَ يفضلُونَ الموزَ تقريباً ضعُفُ عددِ الأشخاصِ الَّذِينَ يفضلُونَ الكرزَ. هلِ استدلالُ هناءَ دقيقٌ؟ أبُرُّ إجابتِي.

### أتدربُ وأحلُّ المسائل

أختارُ تمثيلاً مناسباً لِكُلِّ مَا يأتِي، وأبُرُّ إجابتِي:

ارتفاعاتُ الأشجارِ في إحدى الغاباتِ.

1

إجاباتُ مجموعةِ مِنَ الطلبةِ عَنْ سُؤالِ إجابتُهُ (نعمٌ أَوْ لا).

2

عددُ الأهدافِ الَّتِي سجَّلَها كُلُّ عضُوٍ في فريقِ كرةِ قدمٍ في إحدى البطولاتِ.

3

الأرباحُ الَّتِي يحقِّقُها رِيَانُ مِنْ مشروعِهِ الصغيرِ كُلَّ سِنَةٍ.

4


نتائجُ اختبارِ اللغةِ العربيةِ لأحدِ الصّفوفِ.

5

أعدادُ المصابينَ بفيروسِ كورونا وفقاً للفئاتِ العمريةِ المختلفةِ.

6

## الوحدة 9




صمم علي استبانة سأل فيها 40 طالباً من طلبة مدرسته عن الرياضة المفضلة لديهم، ومثل النتائج التي حصل عليها بالأعمدة كما في الشكل المجاور:

7

أي الرياضات هي الأكثر تفضيلاً عند الطلبة؟

8

يقول علي: (أتوقع من التمثيل بالأعمدة أن تنس الطاولة هي الرياضة الأقل تفضيلاً لدى طلبة الأردن). هل استدلال علي صحيح؟ أبرر إجابتي.



قررت إدارة إحدى المدارس استطلاع آراء طلبة الصف الأول الموزعين على ثلاث شعب عن اللون الذي يفضلونه لطلاء الغرف الصفية. جمعت الإدارة نتائج الاستطلاع، ومثلته بالأعمدة المزدوجة كما في الشكل المجاور:



9

أكمل الجملة الآتية:

عدد ..... الذين ..... أكبر من ..... اعتماداً على التمثيل، أي الألوان ستختارها المدرسة لطلاء الغرف الصفية؟ أبرر إجابتي.


10

أبين لـ تعدد كل من التمثيلات الآتية مضللة:



**أفكّر**

أكتب استدلاً حول اللون الذي يفضله الطلبة لطلاء الغرف الصفية.




يبين التمثيل بالقطاعات الدائرية المجاور توزيع دخل الأسرة الشهري على المتطلبات المنزلية:

لِمَ يُعَدُّ هذا التمثيل مُضلاً؟

أقترح تعديلاً للتمثيل المجاور، وأبرر إجابتي.

13

14



تبرير: يبين التمثيل بالقطاعات الدائرية المجاور أنواع المركبات التي مررت أمام منزل زياد في إحدى ساعات النهار:

15

الساعة.

يقول زياد: إن ربع المركبات التي مررت من الشارع هي حافلات أو شاحنات. هل أتفق مع قول زياد؟ أبرر إجابتي.


16

يقول زياد: إن نصف عدد الأشخاص الذين مرروا من الشارع كانوا يركبون السيارات. هل ما يقوله زياد صحيح؟ أبرر إجابتي.

17

## أفكار

هل يركب العدد نفسه من الأشخاص كل نوع من المركبات؟



تبرير: يبين التمثيل بالقطاعات الدائرية المجاور أنواع الميداليات التي فازت بها إحدى الدول في دورتين متتاليتين من الألعاب الأولمبية. أكتب استدلاًًا بالاعتماد على التمثيل.

18

تحدى: ما المعلومات التي يمكنني الحصول عليها من تمثيل البيانات بالصندوق ذي العارضتين ولا يمكنني الحصول عليها من تمثيلها بالمخطط التكراري؟ أبرر إجابتي.

19

أكتب: كيف أحدد التمثيل الأنسب لتمثيل بيانات معطاة؟

20



## أَسْتَكْشِفُ

ترغبُ شذى باختيارِ أحدِ التخصصاتِ الجامعية: دكتورُ صيدلة، هندسةُ حاسوب، هندسةُ ميكانيكية، إماً في الجامعةِ الأردنيةِ أو في جامعةِ العلومِ والتكنولوجيا الأردنية. كمْ خياراً أمامَ شذى لاختيارِ التخصصِ والجامعةِ؟

## فكرةُ الدرسِ

أحدُّ نواتِجِ الفضاءِ العَيْنِيِّ وعدها.

## المصطلحاتُ

النواتِجُ، الحادثُ، الفضاءُ العَيْنِيُّ، مخططُ الشجرة، مخططُ الاحتمالِ.

## الذكْرُ

التجربةُ العشوائيةُ تجربةُ نستطيعُ أنْ نتبَّأَ فيها بالنواتِجِ جميعها التي يمكنُ أنْ تظهرَ قبلَ إجرائِها، لكنَّا لا نعلمُ تحديداً أيُّها سيظهرُ حتَّى نُجْرِي التجربةَ.

تُسمَّى الخياراتُ المحتملةُ لتجربةِ عشوائيةِ ما النواتِجُ (outcomes)، فمثلاً توجَدُ

6 نواتِجٍ محتملةً لتجربةِ رمي حجرِ نَرْدٍ هيَ: 1, 2, 3, 4, 5, 6

أَمَّا الحادثُ (event) فهو ناتِجٌ واحدٌ أو أكثرٌ منْ نواتِجِ التجربةِ العشوائيةِ، مثلَ ظهورِ عددٍ زوجيٍّ في تجربةِ رمي حجرِ النَّرْدِ.

تُسمَّى جميعُ النواتِجِ الممكِنةِ للتجربةِ العشوائيةِ الفضاءُ العَيْنِيِّ (sample space)، ويُمكِنُ استعمالُ طرائقِ عدَّةٍ لِإيجادِهِ، منها مخططُ الشجرةِ (tree diagram).

## مَثَلٌ 1




أَسْتَعْمَلُ مخططَ الشجرةِ لتحديدِ الفضاءِ العَيْنِيِّ لتجربةِ رمي قطعَتِيِّ نَقْدٍ منتظمَتَينِ ومتمايزَتَينِ مَرَّةً واحِدَةً عشوائياً.

لقطعةِ النَّقْدِ وجهاً، أحدُهُما يحتوي صورَةً، والآخَرُ كتَابَةً؛ لذا أرمُزُ إلى الوجهِ الذي يحتوي الصورةَ بالرَّمزِ (H) وإلى الوجهِ الذي يحتوي الكتابَةَ بالرَّمزِ (T).

## الذكْرُ

أرمُزُ إلى الصورةِ بالحرفِ  $H$ ، وإلى الكتابَةِ بالحرفِ  $T$ ، وهوما الحرفانِ الأوَلَانِ مِنَ الكلمَتَيْنِ الإنجليزِيتَيْنِ Tail، و Head.

الناتِجُ      القطعةُ الثانِيَّةُ      القطعةُ الأوَلِيَّةُ



الاحظ من مخطط الشجرة أن لهذه التجربة 4 نواتج ممكنة؛ لذا فإن الفضاء العيني هو:

$$(H, H), (H, T), (T, H), (T, T)$$

**تحقق من فهمي:**

استعمل مخطط الشجرة لتحديد الفضاء العيني لتجربة رمي قطعة نقد وحجر نرد مرة واحدة عشوائياً.

يمكن أيضاً استعمال الجدول لإيجاد الفضاء العيني للتجارب العشوائية.

## مثال 2



استعمل الجدول لتحديد الفضاء العيني لتجربة رمي قطعة نقد مرة واحدة عشوائياً، ثم تدوير مؤشر قرص عشوائياً مقسم إلى 4 قطاعات متطابقة كتبت عليها الأعداد 1, 2, 3, 4.

أرسم جدولًا، وأسجل في الصف الأعلى منه نواتج تدوير مؤشر القرص المرقم، وفي العمود إلى اليسار نواتج إلقاء قطعة النقد، ثم أملأ الجدول.

		القرص المرقم			
		1	2	3	4
قطعة النقد	H		H, 2		
	T			T, 3	

→

		القرص المرقم			
		1	2	3	4
قطعة النقد	H	H, 1	H, 2	H, 3	H, 4
	T	T, 1	T, 2	T, 3	T, 4

أجد من الجدول أن لهذه التجربة 8 نواتج ممكنة؛ لذا فإن الفضاء العيني هو:

$$(H, 1), (H, 2), (H, 3), (H, 4), (T, 1), (T, 2), (T, 3), (T, 4)$$

**تحقق من فهمي:**

استعمل الجدول لتحديد الفضاء العيني لتجربة رمي قطعة نقد مرة واحدة عشوائياً وسحب بطاقة عشوائياً من كيس يحتوي 3 بطاقات متماثلة كتبت عليها الأعداد 1, 2, 3.


يمكنني أيضاً استعمال مخطط الاحتمال (possibility diagram) لإيجاد الفضاء العيني للتجارب العشوائية.

## الوحدة 9

### مثال 3




أستعمل مخطط الاحتمال لتحديد الفضاء العيني لتجربة رمي حجر نرد لونه أحمر مرتاحدة عشوائياً، ثم رمي حجر نرد لونه أزرق مرتاحدة عشوائياً.



أرسم محورين، ثم أكتب نواتج رمي حجر النرد الأحمر على المحور  $x$ ، ونواتج رمي حجر النرد الأزرق على المحور  $y$ ، كما في الشكل المجاور، حيث يمثل تقاطع خطوط مخطط الاحتمال الفضاء العيني للتجربة.

### أتحقق من فهمي:



قرص دائري مقسم إلى 3 قطاعات متطابقة كتبت عليها الأحرف  $A, B, C$  كما في الشكل المجاور. أستعمل مخطط الاحتمال لتحديد الفضاء العيني لتجربة تدوير مؤشر القرص مرتاحتين عشوائياً.


### مثال 4: من الحياة



**عصير طبيعي:** تريدين عصير شراء عصير طبيعي من محل بيع العصير في أكواب بثلاثة أحجام مختلفة: صغير، ووسط، وكبير، ولديه 3 أنواع مختلفة من الفاكهة: فراولة، وموز، وبرتقال. كم خياراً مختلفاً أمامك لشراء العصير؟

يمكنني استعمال الشجرة البيانية لتحديد عدد الخيارات الممكنة أمامك.

الناتج      حجم الكوب      نوع الفاكهة




إذن، لدى عصير 9 بدائل مختلفة للعصير.

## أتحققُ من فهمي:



**بوشارٌ**: يرغُبُ مهندُّ في شراءِ بُوشارٍ يُباعُ في علبةٍ بثلاثةِ أحجامٍ مُختلفةٍ: صغيرٌ، ووسطٌ، وكبيرٌ، وأمامَهُ نكهتانٍ مُختلفتانٍ: الملحُ، والزبدةُ، كمْ خيارًا مُختلفًا أمامَ مهندٍ لشراءِ البُوشارِ؟

## أتدربُ وأحلُّ المسائل




أستعملُ مخططَ الشجرةِ لتحديدِ الفضاءِ العينيِّ لتجربةِ تدويرِ مؤشرِ القرصِ المجاورِ مرتَينِ عشوائياً.




سُجِّبَتْ كُرتانٍ عشوائياً على التوالي دونَ إرجاعٍ منْ صندوقٍ يحتويُ الكُراتِ الأربعِ المتماثلةِ المجاورةَ:

أستعملُ الجدولَ لتحديدِ الفضاءِ العينيِّ لتجربةِ.

أجدُ عددَ عناصرِ الفضاءِ العينيِّ.



القرصُ A



القرصُ B

أستعملُ مخططَ الشجرةِ لتحديدِ الفضاءِ العينيِّ للتجاربِ العشوائيةِ الآتيةِ المعتمدةِ علىِ القرصَينِ الدائريَّينِ المجاورَيْنِ، علماً بأنَّهما مُقسَّمانِ إلى أجزاءٍ مُتطابِقةٍ:

تدويرِ مؤشرِ القرصِ A مرتَينِ عشوائياً، ثمَّ تدويرِ مؤشرِ القرصِ B مرتَينِ عشوائياً.

تدويرِ مؤشرِ القرصِ A مرتَينِ عشوائياً.

تدويرِ مؤشرِ القرصِ B مرتَينِ عشوائياً.

تدويرِ مؤشرِ القرصِ B ثلَاثَ مراتٍ عشوائياً.

## إرشادٌ

أمزِّ إلى اللونِ الأحمرِ بالحرفِ R، واللونِ الأخضرِ بالحرفِ G، واللونِ الأزرقِ بالحرفِ B، واللونِ الأصفرِ بالحرفِ Y، وهيَ الحروفُ الأولى مِنْ أسماءِ هذهِ الألوانِ باللغةِ الإنجليزيةِ:

Red → R

Green → G

Blue → B

Yellow → Y

## أفكُرُ

هل يمكنُ تمثيلُ التجربةِ العشوائيةِ في السؤالِ 8 باستعمالِ مخططِ الاحتمالِ؟

## الوحدة 9

دُورٌ مؤشّرٌ قرصٌ مقسّمٌ إلى 3 قطاعاتٍ متطابقةٍ ألوانُها: أحمرٌ (R)، وأزرقٌ (B)، وأبيضٌ (W) مرّةً واحدةً عشوائياً، ثمَّ دُورٌ مؤشّرٌ قرصٌ آخرٌ مقسّمٌ إلى 4 قطاعاتٍ متطابقةٍ كُتِبَتْ عليها الأعداد 4, 3, 2, 1 مرّةً واحدةً عشوائياً.

أستعمل مخططَ الاحتمالِ لتحديدِ الفضاءِ العينيِّ للتجربةِ العشوائيةِ.

9

أجدُ عددَ عناصرِ الفضاءِ العينيِّ.

10



**وحدةٌ تخزينٌ:** يرغبُ يوسفُ في شراءِ مشغلٍ (مقاطعِ صوتيةٍ)، ولديه 4 ساعاتٍ مختلفةٍ بالجيجابايتِ: 2GB, 4GB, 8GB, 16GB مختلفةٍ: الفضيٌّ، والأخضر، والأزرق، والزهريٌّ، والأسودِ:

أستعملُ الجدولَ لتحديدِ جميعِ البديلِ الممكِنةِ ليوسفَ عندَ اختيارِ المشغلِ.

11

أجدُ عددَ الخياراتِ الممكِنةِ أمامَ يوسفَ.

12



يقدمُ مطعمٌ قائمةً الطعامِ المجاورةَ لزبائنهِ:

13

أستعملُ مخططَ الشجرةِ لتحديدِ جميعِ الخياراتِ الممكِنةِ لوجبةِ طعامٍ مكونةٍ منْ: طبقٍ مقبلاتٍ، وطبقٍ رئيسٍ، وطبقٍ تحليةٍ.

14

أجدُ عددَ الخياراتِ الممكِنةِ لوجبةِ الطعامِ.

15

أعودُ إلى فقرةِ (أستكشفُ)، وأحلُّ المسألةَ الواردةَ فيها.

### مهارات التفكير العليا

**تحدّ:** قرصٌ مقسّمٌ إلى  $n$  منَ القطاعاتِ المتطابقةِ، أجدُ عددَ عناصرِ الفضاءِ العينيِّ لتجربةِ تدويرِ مؤشّرِه مرّتينِ.

16

**مسألةٌ مفتوحةٌ:** أعطي مثلاً على تجربةِ عشوائيةٍ عددَ عناصرِ الفضاءِ العينيِّ لها 30

17

كيفَ أحّدُ الفضاءَ العينيِّ لتجربةِ عشوائيةٍ؟

18



### استكشف

نسیَ أَحْمَدُ أَوْلَ رَقْمَيْنِ مِنْ رَمْزِ الدُخُولِ إِلَى بَرِيدِهِ الْإِلْكْتْرُونِيِّ، لَكِنَّهُ تَذَكَّرُ أَنَّ الرَّفْمَ الْأَوَّلَ فَرْدِيٌّ وَالرَّفْمَ الْثَّانِيَ زَوْجِيٌّ. مَا احْتَمَالُ أَنْ يَخْتَارَ أَحْمَدُ الرَّقْمَيْنِ الصَّحِيحَيْنِ لِرَمْزِ الدُخُولِ؟

### فكرة الدرس

- أَجْدُ احْتِمَالَاتِ حَوَادِثِ مَرْكَبَةٍ.

### المصطلحات

- الحادِثُ البَسيِطُ  
الحادِثُ المَرْكَبُ.


يُسَمِّيُ الْحَادِثُ الَّذِي يَحْتَوِي نَاتِجًا وَاحِدًا فَقْطًا حَادِثًا بَسيِطًا (simple event)، أَمَّا الْحَادِثُ المَرْكَبُ (compound event) فَهُوَ حَادِثٌ يَتَكَوَّنُ مِنْ حَادِثَيْنِ بَسيِطَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ.

تَعْلَمْتُ سَابِقًا أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ نَوْاتِجُ التَّجْرِيَةِ العَشْوَائِيَّةِ مُتَسَاوِيَّةُ الْاحْتِمَالِ، فَإِنَّ احْتِمَالَ وَقْوَعِ أَيِّ حَادِثٍ يُسَاَوِي نَسْبَةَ عَدِّ عَنَاصِرِهِ إِلَى عَدِّ عَنَاصِرِ الْفَضَاءِ الْعَيْنِيِّ:


$$P(A) = \frac{(\text{عدد عناصر الحادث})}{(\text{عدد عناصر الفضاء العيني})}$$

يمكُنُ استِعْمَالُ مُخْطَطِ الشَّجَرَةِ لِإِيَجادِ احْتِمَالَاتِ حَوَادِثِ المَرْكَبَةِ.

### مثال 1



قرصٌ مُقَسَّمٌ إِلَى 3 قَطَاعَاتٍ مُتَطَابِقَةٍ كُتِبَتْ عَلَيْهَا الْأَحْرَفُ  $L, M, N$  كَمَا فِي الشَّكْلِ الْمُجَارِ. دُوَرَ مؤَشِّرُ الْقَرَصِ مَرَّتَيْنِ عَشْوَائِيًّا، وَسُجِّلَ الْحَرْفَانِ اللَّذَانِ وَقَفَ عَنْهُمَا المؤَشِّرُ، أَسْتَعْمَلُ مُخْطَطَ الشَّجَرَةِ لِأَجْدَ:



1 احْتِمَالَ وَقْوَعِ المؤَشِّرِ عَنْدَ الْحَرْفِ نَفْسِهِ فِي الْمَرَّتَيْنِ.


أَمْثُلُ الْفَضَاءِ الْعَيْنِيِّ لِلتَّجْرِيَةِ بِاستِعْمَالِ مُخْطَطِ الشَّجَرَةِ.

أَلَاحِظُ أَنَّ عَدَدَ عَنَاصِرِ الْفَضَاءِ الْعَيْنِيِّ 9

أَفْتَرُضُ أَنَّ الْحَادِثَ  $A$  هُوَ وَقْوَعُ المؤَشِّرِ عَنْدَ الْحَرْفِ نَفْسِهِ مَرَّتَيْنِ، إِذْنُ عَدْدِ عَنَاصِرِ هَذَا الْحَادِثِ يُسَاَوِي 3؛ لَذَا فَإِنَّ احْتِمَالَ الْحَادِثِ  $A$  هُوَ:

$$P(A) = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

## الوحدة 9



2 احتمال وقوف المؤشر عند الحرف  $L$  في أيٍ من المرتدين أو كلِّيهما.

افتراض أنَّ الحادث  $B$  هو وقوف المؤشر عند الحرف  $L$  في أيٍ من المرتدين أو كلِّيهما، إذن عدد عناصر هذا الحادث  $5$ ؛ لذا فإنَّ احتمال الحادث  $B$  هو:

$$P(B) = \frac{5}{9}$$


أتحقق من فهمي:

3 احتمال وقوف المؤشر عند الحرف  $M$  في المرة الأولى فقط.

4 احتمال وقوف المؤشر عند الحرف  $N$  في أيٍ من المرتدين أو كلِّيهما.

يمكنُ استعمال الجدول في إيجاد احتمالات الحوادث المركبة.

### مثال 2



يوضِّح الشكل المجاور كيسين يحتويان قطعَ حلوى. إذا سحبت قطعة حلوى عشوائياً من الكيس  $A$ ، ثم سحبت قطعة حلوى عشوائياً من الكيس  $B$ ، فاستعمل الجدول لأجد:

1 احتمال سحب قطعَيْ حلوى من اللون نفسه.

أمثلُ الفضاء العيني للتجربة باستعمال جدولٍ. الاحظُ أنَّ عدد عناصر الفضاء العيني  $12$

		الكيس		
		$R$	$B$	$Y$
الكيس $A$	$R$	$R, R$	$R, B$	$R, Y$
	$Y$	$Y, R$	$Y, B$	$Y, Y$
	$B$	$B, R$	$B, B$	$B, Y$
	$G$	$G, R$	$G, B$	$G, Y$

افتراض أنَّ الحادث  $A$  هو سحب قطعَيْ حلوى لهُما اللون نفسه، إذن عدد عناصر هذا الحادث  $3$ ؛ لذا فإنَّ احتمال الحادث  $A$  يُساوي:

$$P(A) = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$$

2

احتمال سحب قطعٍ حلوى ليسَتْ أيٌّ مِنْهُما زرقاءً أو خضراءً.

		الكيٌس		
		R	B	Y
الكيٌس A	R	R, R	R, B	R, Y
	Y	Y, R	Y, B	Y, Y
	B	B, R	B, B	B, Y
	G	G, R	G, B	G, Y

افتراض أنَّ الحادث يمثل سحب قطعٍ حلوى ليسَتْ أيٌّ مِنْهُما زرقاءً أو خضراءً.

الاحظ من الجدول أنَّه توجد 4 نواتج لا تحتوي قطعةً حلوى زرقاءً أو خضراءً؛ لذا فإنَّ احتمال الحادث B يساوي:

$$P(B) = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$$

### تحقق من فهمي:

3

احتمال سحب قطعةٍ حلوى خضراءً.

يمكن أيضًا استعمال مخططِ الاحتمال لإيجاد احتمالاتِ الحوادث المركبة.

### مثال 3



في تجربة رمي حجر نرد لونه أخضر مرّةً واحدةً عشوائياً، ثمَّ رمي حجر نرد لونه بنفسجيٍّ عشوائياً، استعمل مخططَ الاحتمال لأجد:


1

احتمال ظهور العدد 3 على كلا الحجرتين.


أمثلُ الفضاء العينيَّ للتجربة باستعمال مخططِ الاحتمال. الاحظ أنَّ عددَ عناصرِ الفضاء العينيٌّ 36

افتراض أنَّ الحادث A هو ظهورُ العدد 3 على كلا الحجرتين، إذن عددَ عناصرِ هذا الحادث 1؛ لذا فإنَّ احتمالَ الحادث A هو:

$$P(A) = \frac{1}{36}$$



## الوحدة 9



احتمال ظهور العدد 3 مرتًّا واحدةً فقط.

أفترض أنَّ الحادث  $B$  هو ظهور العدد 3 مرتًّا واحدةً فقط.

الاحظِّ من مخططِ الاحتمال وجود 10 ناتجٍ ظهرَ فيها العدد 3 مرتًّا واحدةً فقط؛ لذا فإنَّ احتمال الحادث  $B$  يُساوي:


$$P(B) = \frac{10}{36} = \frac{5}{18}$$

**تحقق من فهمي:**

4 احتمال عدم ظهور العدد 3

احتمال ظهور العدد 3 مرتًّا واحدةً على الأقل.

**مثال 4** في تجربة رمي حجري نرد متمايزين مرةً واحدةً عشوائياً وإيجاد ناتج جمع العددين الظاهرين، أجدُ:




احتمال أنْ يكون مجموع العددين الظاهرين يُساوي 8

يمكُّني استعمال مخططِ الاحتمال لكتابَة المجموع لـ كل ناتجٍ.

الاحظُّ أنَّ عددَ عناصرِ الفضاءِ العينيٍّ 36  
أفترض أنَّ الحادث  $A$  هو ظهورُ عددين مجموعُهما 8،  
إذنْ عددُ عناصرِ الحادث 5؛ لذا فإنَّ احتمال الحادث  $A$  يُساوي:

$$P(A) = \frac{5}{36}$$



احتمال أنْ يكون مجموع العددين الظاهرين أكبرَ منْ أوَّل يُساوي 8

أفترض أنَّ الحادث  $B$  هو ظهورُ عددين مجموعُهما أكبرُ أوَّل يُساوي 8  
الاحظُّ منْ مخططِ الاحتمال وجود 10 ناتجٍ مجموعُها أكبرُ منْ 8،  
وـ 5 ناتجٍ مجموعُها 8، إذنْ عددُ عناصرِ الحادث 15؛ لذا فإنَّ احتمال  
الحادث  $B$  يُساوي:

$$P(B) = \frac{15}{36} = \frac{5}{12}$$

## تحقق من فهمي:

احتمال أن يكون مجموع العدددين الظاهرين أقل من 8 3

احتمال أن يكون مجموع العدددين الظاهرين أقل من أو يساوي 8 4

## أتدرب وأحل المسائل

في تجربة رمي قطعتي نقد منتظمتين ومتمايزتين عشوائياً مرة واحدة، أستعمل مخطط الشجرة لإيجاد احتمال:

ظهور صورة وكتابه. 2

عدم ظهور صورة. 4

ظهور صورتين. 1

ظهور صورة واحدة على الأقل. 3

في تجربة رمي حجري نرد متمايزين مرة واحدة عشوائياً، أستعمل الجدول لإيجاد احتمال أن يكون:

العدان الظاهران زوجيين. 6

العدان الظاهران أقل من 5 5

أحد العدددين الظاهرين فقط أولياً. 7

سحبت دينا عشوائياً بطاقة من 4 بطاقات كتبت عليها الأعداد 4, 3, 2, 1، ثم رمت حجر نرد مرة واحدة عشوائياً، ثم أوجدت مجموع العدددين الظاهرين. أستعمل مخطط الاحتمال لأجد احتمال أن يكون مجموع العدددين:

أكبر من 6 9

يساوي 5 8

في تجربة رمي حجري نرد مرة واحدة عشوائياً وإيجاد ناتج جمع العدددين الظاهرين، أجد احتمال أن يكون مجموع العدددين الظاهرين:


أقل من 4 12

يساوي 4 10

مربعاً كاملاً. 15

عددًا زوجياً. 13

من مضاعفات العدد 3 14



في إحدى الألعاب، يدور مؤشر كل من الشكلين المجاورين مرة واحدة عشوائياً، ويحصل اللاعب على نقطة إذا توقف مؤشر كلا الشكلين على الحرف نفسه. ما احتمال الحصول على نقطة؟ 16

## الوحدة 9




يحتوي كيس 4 حبات كعك، اثنان منها بحشوة المربى، وواحدة بحشوة الشوكولاتة، وواحدة بحشوة الكريمة. اختار محمود كعكة عشوائياً من الكيس وأكلها، ثم أخذ كعكة أخرى. أستعمل الجدول لأجد احتمال:

أن تكون حبتا الكعك بحشوة المربى. 17

أن تكون إحدى حباتي الكعك بحشوة الكريمة. 18

أن تكون حبتا الكعك بحشوة الشوكولاتة. 19



قرصان دائريان كل منهما مقسّم إلى 4 قطاعات متطابقة كُتِبَتْ عليها الأعداد 1, 2, 3, 4، كما يظهر في الشكل المجاور. تم تدوير مؤشريهما معاً مرة واحدة عشوائياً وإيجاد ناتج ضرب العددين اللذين يقفُ عندهما المؤشران، أجد احتمال أن يكون ناتج ضرب العددين:

3 يُساوي 21

4 يُساوي 20

### مهارات التفكير العليا

**تبرير:** قرصان دائريان كل منهما مقسّم إلى 8 قطاعات متطابقة كُتِبَتْ عليها الأعداد من 1 إلى 8. تم تدوير مؤشريهما معاً مرة واحدة عشوائياً، وإيجاد ناتج ضرب العددين اللذين يقفُ عندهما المؤشران. أجد احتمال أن يكون ناتج ضرب العددين مربعاً كاملاً زوجياً، وأبرر إجابتي.

**تبرير:** رمَتْ لمياء حجرٍ نَرِدٍ متمايزين مرتَّة واحدة عشوائياً، ثم أوجَدَتْ ناتج ضرب العددين الظاهرين. أجد احتمالاً لا يكون ناتج الضرب بين 19 و35، وأبرر إجابتي.

**مسألة مفتوحة:** أصف تجربة عشوائية، ثم أحدّد حادثاً مركباً فيها وأجد احتماله.

كيف أجد احتمال حادث مركب باستعمال مخطط الشجرة؟


أكتب

24

25

# اختبار نهاية الوحدة

أستعمل التمثيل بالصندوق ذي العارضتين أدناه للإجابة عن الأسئلة 7، 8، 9:




أجد القيمتين: العظمى، والصغرى، والربع الأعلى، والربع الأدنى، والوسطى، للبيانات الممثلة.

8 أصف توزيع البيانات.

9 أجد القيمة المتطرفة في البيانات (إن وجدت).

صُمِّمَت رَنا استبانةً حول عدد الكتب التي قرأتها طالبات صفتها خلال شهر، ومثلت النتائج بالخطط التكراري الآتي. أكتب استدلالاً بالاعتماد على التمثيل.



في تجربة رمي حجري نردي متمايزين عشوائياً، أستعمل الجدول لإيجاد احتمال أن يكون:

11 العددان الظاهران أكبر من 4

12 العددان الظاهران زوجيين.


أختار رمز الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي:

1 مدى البيانات الآتية يُساوي:

53, 57, 62, 48, 45, 65, 40, 42, 55


a) 11 b) 25 c) 53 d) 65

2 الربع الأعلى للبيانات الممثلة بالصندوق ذي العارضتين أدناه هو:



a) 0 b) 10 c) 25 d) 45

أستعمل التمثيل بالصندوق ذي العارضتين الآتي للإجابة عن السؤالين 3 و 4:



3 نسبة البيانات التي تزيد على 20:

a) 25% b) 50% c) 75% d) 100%

4 نسبة البيانات التي تقل عن 15:

a) 25% b) 50% c) 75% d) 100%

أجد المدى والربعيات والمدى الرباعي لكل مجموعة بيانات مما يأتي:

5 40, 33, 37, 54, 41, 3, 27, 39, 35

6 132, 127, 106, 140, 158, 135, 129, 138

### تدريب على الاختبارات الدولية

أيُّ القيَمِ في مجموعَةِ البياناتِ الآتيةِ متطرِفةٌ؟

3.7, 3.0, 3.4, 3.6, 5.2, 5.4,  
3.2, 3.8, 4.3, 4.5, 4.2, 3.7

- a) 3.0      b) 5.4  
c) 3.0, 5.4      d) لا توجُدْ قِيمٌ متطرِفةٌ

وسيطُ البياناتِ الآتيةِ هو:

7, 8, 14, 3, 2, 1, 24, 18, 9, 15

- a) 8.5      b) 10.1      c) 11.5      d) 23


أيُّ مجموعَاتِ البياناتِ الآتيةِ المَدِي الرَّبِيعيُّ لَهَا  
يُساوي 10؟

- a) 3, 4, 9, 16, 17, 24, 31  
b) 41, 43, 49, 49, 50, 53, 55  
c) 12, 14, 17, 19, 19, 20, 21  
d) 55, 56, 56, 57, 58, 59, 62

أربعُ بطاقةٍ كُتِبَتْ علىها الأَعْدَادُ 1, 2, 3, 4، إذَا  
سُجِّبَتْ منها بطاقةٌ عشوائياً وأُرْجِعَتْ، ثُمَّ سُجِّبَتْ  
بطاقةٌ أُخْرَى عشوائياً، فما احتمالُ أَنْ تَحْمَلُ الْبَطَاقَتَانِ  
العَدَدَ 2؟

- a)  $\frac{1}{2}$       b)  $\frac{1}{4}$       c)  $\frac{1}{8}$       d)  $\frac{1}{16}$


**درجات حرارة:** يبيّن تمثيل الصندوق ذي العارضتين  
المزدوج أدناءً درجة الحرارة وقت الظَّهيرَةِ في  
المناطقَ السياحيَّتين (أ) و (ب) على مدارِ العامِ:



أصْفُ الفروقَ بَيْنَ مجموعَتَيِ البياناتِ.

ترغُبُ رِيمُ في قضاءِ شَهْرِ تَمُوزَ في إحدى المَنَاطِقَيْنِ،  
فأيُّ المَنَاطِقَيْنِ أَنْصَحُهَا بِهَا؟ أَبْرُرُ إِجَابَتِي.

قرصانٌ كُلُّ مِنْهُمَا مَقَسَّمٌ إِلَى 5 قطاعاتٍ مُتَطابِقةٍ كُتِبَتْ  
عَلَيْهَا الأَعْدَادُ 1, 2, 3, 4, 5. دُوَرَ مؤَشِّرَا هُمَا معاً مَرَّةٌ  
وَاحِدَةٌ عَشوائِيًّا وَأُوْجِدَ نَاتِجُ جَمِيعِ الْعَدَدَيْنِ الَّذِيْنِ يَقْفَانِ  
عَنْهُمَا. أَكْمَلُ مَخْطَطَ الْاحْتِمَالِ الْمَجاوِرِ،  
ثُمَّ أَجْدُ احْتِمَالَ أَنْ  
يَكُونَ مَجْمُوعُ الْعَدَدَيْنِ  
الظَّاهِرَيْنِ:



16      يُساوي 5      15      عدَّا زوجيًّا.

أَقْلَى مِنْ 7      17