



المركز الوطني  
لتطوير المناهج  
National Center  
for Curriculum  
Development

# علوم الأرض والبيئة

الصف الثاني عشر - المسار الأكاديمي

كتاب الأنشطة والتجارب العملية

الفصل الدراسي الثاني

12

فريق التأليف

د. موسى عطا الله الطراونة (رئيساً)

سكينة محى الدين جبر (منسقاً)

د. مروة خميس عبد الفتاح

د. محمود عبد اللطيف حبوش

لؤي أحمد منصور

الناشر: المركز الوطني لتطوير المناهج

يسُرُّ المركز الوطني لتطوير المناهج استقبال آرائكم وملحوظاتكم على هذا الكتاب عن طريق العنوانين الآتية:



06-5376262 / 237



06-5376266



P.O.Box: 2088 Amman 11941



@nccdjour



feedback@nccd.gov.jo



www.nccd.gov.jo

قررت وزارة التربية والتعليم تدريس هذا الكتاب في مدارس المملكة الأردنية الهاشمية جميعها، بناءً على قرار المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج في جلسته رقم (7) 2025/9/15، وقرار مجلس التربية والتعليم رقم (170) 2025، تاريخ 15/10/2025 م، بدءاً من العام الدراسي 2025 / 2026 م.

© HarperCollins Publishers Limited 2025.

- Prepared Originally in English for the National Center for Curriculum Development. Amman - Jordan  
- Translated to Arabic, adapted, customised and published by the National Center for Curriculum Development. Amman - Jordan

**ISBN: 978 - 9923 - 41 - 810 - 9**

المملكة الأردنية الهاشمية  
رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية  
(2025/1/398)

بيانات الفهرسة الأولية للكتاب:

عنوان الكتاب	علوم الأرض والبيئة، كتاب الأنشطة والتجارب العملية: الصف الثاني عشر، المسار الأكاديمي، الفصل الدراسي الثاني
إعداد / هيئة	الاردن. المركز الوطني لتطوير المناهج
بيانات النشر	عمان: المركز الوطني لتطوير المناهج، 2025
رقم التصنيف	373,19
الواصفات	/علوم الأرض//أساليب التدريس//المناهج// التعليم الثانوي/
الطبعة	الطبعة الأولى

يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصنفه ولا يعبر هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة الوطنية.

#### المراجعة والتعديل

سكنينة محى الدين جبر

د. خولة يوسف الأطرم

د. محمود عبد اللطيف حبوش

#### المراجعة التربوية

أ.د. حسن عليبني دومي

#### تصميم وإخراج

نايف محمد أمين مراسدة

#### التحرير اللغوي

د. خليل إبراهيم القعيسي

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, sorted in retrieval system, or transmitted in any form by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise , without the prior written permission of the publisher or a license permitting restricted copying in the United Kingdom issued by the Copyright Licensing Agency Ltd, Barnard's Inn, 86 Fetter Lane, London, EC4A 1EN.

British Library Cataloguing -in- Publication Data

A catalogue record for this publication is available from the Library.

# قائمة المحتويات

رقم الصفحة	الموضوع
<b>الوحدة الخامسة: المجرات ونشأة الكون</b>	
4	تجربة استهلالية: نمذجة توسيع الكون
6	نشاط: خصائص مجرة درب التبانة
8	نشاط: تصنيف المجرات
10	نشاط: تباعد المجرات
12	نشاط: دور المادة المظلمة والطاقة المظلمة في توسيع الكون
14	نشاط: الأحداث التي مرّ بها الكون منذ بدء الانفجار العظيم
16	أسئلة مثيرة للتفكير
<b>الوحدة السادسة: أحوال الطقس القاسية</b>	
26	تجربة استهلالية: توليد إعصار قُمعي
28	تجربة 1: ملاحظة قوّة الرياح ومقارنتها مع مقياس بيفورت
30	نشاط: أماكن حدوث الأعاصير المدارية في العالم
32	تجربة 2: نمذجة حدوث الفيضان
34	أسئلة مثيرة للتفكير
<b>الوحدة السابعة: تاريخ الأرض</b>	
41	تجربة استهلالية: أهمية الأحافير في التتابعات الطبقية
43	نشاط: مبدأ القاطع والمقطوع
45	نشاط: مبدأ الاحتواء
47	نشاط: مبادئ التاريخ النسبي
48	تجربة 1: نمذجة الأضمحلال الإشعاعي
50	نشاط: إعطاء الصخور الرسوبيّة أعماراً مطلقةً
52	نشاط: بناء سلّم زمن جيولوجي في الأردن
54	أسئلة مثيرة للتفكير

# تجربة استهلاكية

## نمذجة توسيع الكون

### الخلفية العلمية:

منذ اللحظة الأولى التي نشأ فيها الكون وفقاً لنظرية الانفجار العظيم بدأ بالتوسيع، ورافق ذلك زيادة في حجمه ونقصان في كثافته مع بقاء كتلته ثابتة، في هذه التجربة سيجري استخدام بالون لمحاكاة توسيع الكون.

### الهدف:

تعرّف كيفية توسيع الكون.

### المواد والأدوات:

باللون، قلم تخطيط (فلوماستر)، مسطرة أو شريط قياس مترى.

### إرشادات السلامة:

تونّي الحذر عند نفخ البالون لأكبر حجم تجنّباً لأنفجاره.

### خطوات العمل:

1. أُنفخُ البالون (الفضاء) جزئياً إلى حجم قبضة يدي تقربياً من دون أن أغلقه نهائياً؛ ليتسنى لي تكرار نفخه.

2. أرسمُ على البالون المنفوخ خطّاً بقلم التخطيط، ثم أحدد عليه سبع نقاط (المجرات): (A, B, C, X, D, E, F)،

تفصل بين كل نقطة وأخرى مسافة 1 cm، بحيث تمثل كل نقطة مجرّة، وأحرص على أن تكون النقطة (X) نقطةً مركزيةً وسط تلك النقاط تمثل مجرّتنا (مجرّة درب التبانة).

أنظر الشكل المجاور.

3. أُنفخُ البالون مرة أخرى لأكبر حجم ممكن، ثم أقيسُ المسافة بين النقطة (X) وبين كل نقطة من النقاط الأخرى.

4. أدوّن ملاحظاتي في الجدول الآتي:

الفرق بين المسافتين الابتدائية والنهائية للمجرة عن مجرة درب التبانة (X) بوحدة (cm)	المسافة النهائية للمجرة عن مجرة درب التبانة (X) بوحدة (cm)	المسافة الابتدائية للمجرة عن مجرة درب التبانة (X) بوحدة (cm)	المجرة
		3	A
		2	B
		1	C
		1	D
		2	E
		3	F



## التحليل والاستنتاج:

1. أرسم بيانيًّا العلاقة بين المسافة الابتدائية للمجربة عن مجرة درب التبانة والفرق بين المسافتين الابتدائية والنهائية للمجربة عن مجرة درب التبانة.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. أصفُ الاتجاه الذي تتحرّك فيه المجرات جميعها نسبًةً إلى مجرة درب التبانة.

.....

.....

.....

3. أستنتجُ العلاقة بين ما توصلتُ إليه في هذه التجربة وكيفية توسيع الكون.

.....

.....

.....

# خصائص مجرة درب التبانة



الهدف:

تعرّف بعض خصائص مجرة درب التبانة.

لم يستطع علماء الفلك رؤية شكل مجرة درب التبانة كاملاً؛ لأنَّ الأرض جزء منها، لكنَّهم تعرَّفوا خصائصها باستخدام المقاريب (التلسكوبات) التي تستقبل الأشعة الراديوية، والأشعة تحت الحمراء المنبعثة عنها، ومقارنتها بأشكال المجرات الأخرى. يُمثِّل الجدول الآتي بعض البيانات والقيم التقريرية التي جُمعت عن المجرة والتي قد تختلف مع الاكتشافات الحديثة أدرس الجدول جيداً، ثم أجيب عن الأسئلة التي تليه:

خصائص مجرة درب التبانة	
حلزونية خطية النواة	نوع المجرة
13.6 billion years	العمر
100000 light years	القطر
12000 light years	السُّمك
$5.8 \times 10^{11}$ ضعف كتلة الشمس	الكتلة
250 million years	زمن دوران المجرة حول نفسها
225 million years	زمن دوران الشمس حول مركز المجرة

\* السنة الضوئية Light Year: وحدة قياس تُستخدم لوصف المسافات البعيدة بين الأجرام السماوية، وتُعرَّف بأنَّها المسافة التي يقطعها الضوء في سنة واحدة، وتعادل  $9.4 \times 10^{12}$  km

## التحليل والاستنتاج:



1. أُحدِّد نوع مجرة درب التَّبانة.

2. أحْسُب قُطْر مجرة درب التَّبانة بوحدة km.

3. أحْسُب عدد الدورات التي أكملتها الشمس حول مركز مجرة درب التَّبانة حتى الآن، علمًا بأنَّ عمر الشمس كما يقدِّره علماء الفلك 4.7 billion years.

4. أَتَوْقَع: ماذا يُطلَق على المُدَّة الزمنية التي تُكَمِّل فيها الشمس دورة كاملة حول مركز المجرة؟

# تصنيف المجرات


الهدف:

تصنيف المجرات وفق أشكالها.

يُمثل الشكل الآتي مُخطّطاً صمّمه العالم هابل لدراسة مختلف أنواع المجرات: (الإهليجية، والحلزونية، وغير المُنظمة). أتأمل المُخطّط جيداً، ملحوظاً شكل المجرات فيه، وكيفية ترتيبها، ثم أجيب عن الأسئلة التي تليه:

تزايد عمر المجرات.

تناقص كمية الغازات والأغبرة الكونية.



التحليل والاستنتاج:

- أتوقع الاسم الذي أطلقه العالم الفلكي إدويين هابل على المُخطّط تبعاً لشكله.



2. أُبَيِّن رمز المجرة التي لها نواة كروية في المركز وأذرعها شديدة الانفتاح.

3. أُقارِن بين المجرتين:  $\text{SBa}$  و  $\text{Sb}$  من حيث شكلها، وكمّية الغازات فيها، وعُمرها.

4. أُصِف المجرة  $E0$  من حيث العمر، وكمّية الغازات والأغبرة الكونية التي تحويها.

٩ المدرسة الجعة


# تباعد المجرات



الهدف:

التوصل إلى العلاقة بين سرعة المجرات وبعدها عن الأرض.

يُمثل الشكل الآتي مجموعة من المجرات (س، ص، ع، ف) التي تبعد مسافات مختلفة عن الأرض. أدرس الشكل جيداً، ثم أجيب عن الأسئلة التي تليه:



التحليل والاستنتاج:



1. أحدد المسافة التي تبعدها المجرة (ص) عن الأرض.

2. أيّن: أي المجرات تتحرّك بسرعة أكبر: (س)، أم (ص)، أم (ع)، أم (ف)؟



3. أتوقع: عند تحليل الطيف الكهرومغناطيسي الصادر عن المجرتين: (س) و (ف)، لوحظ أنَّ الطيف الكهرومغناطيسي للتجربة (س) ينزاح نحو الطول الموجي الأطول. أفسِّر ذلك.

4. أستنتج العلاقة بين سرعة المجرات، وبُعْدها عن الأرض، وانزياحها نحو الطول الموجي الأطول (نحو الأحمر).


# الوحدة 5: المجرات ونشأة الكون

# دور المادة المظلمة والطاقة المظلمة في توسيع الكون

الهدف:

تعرّف دور المادة المظلمة والطاقة المظلمة في توسيع الكون.

تحتوي أغلب المجرّات على مادة مظلمة لا تعكس الضوء أو تمتّصه مثلما تفعل المادة العاديّة، وعلى الرغم من أننا لم نكتشف المادة المظلمة بعد في مختبرات البحوث العلمية، إلا أن وجودها أصبح معروفاً عن طريق تأثيراتها الجاذبية. لتعريّف الفرق بينَ المادة المظلمة والطاقة المظلمة وأثر كلّ منها في توسيع الكون، أتّمّل الشكل الآتي الذي يوضّح نموذجاً للكون، ثم أجيّب عن الأسئلة التي تليه:





## التحليل والاستنتاج:

1. أُحدِّد أي النقطَات الآتية (أ، ب، ج، د) يكون عندها تأثير الطاقة المظلمة أكبر ما يمكن، وأبْرِر السبب.

.....

.....

.....

2. أقارن بين النقطتين: (هـ) و (جـ) من حيث تأثير المادة المظلمة في كلٍّ منها.

.....

.....

.....

3. أُرتِّب النقاط: (أ، ب، ج، د، هـ) تنازليًّا بحسب تأثير المادة المظلمة في كلٍّ منها.

.....

.....

.....

4. أرسم سهمين يدل كل منهما على الاتجاه الذي يزداد به تأثير كلٍّ من الطاقة المظلمة والمادة المظلمة.

.....


.....

# الأحداث التي مَرَّ بها الكون منذ بدء الانفجار العظيم

الهدف:

تتبع الأحداث التي مَرَّ بها الكون منذ بدء الانفجار العظيم حتى الآن.

تُعدّ نشأة الكون من الأمور التي حيرت العلماء، وعلى الرغم من ذلك، فقد بذلت جهود كبيرة في البحث وتطوير أدوات المعرفة من أجل تفسيرها، وتمكن العلماء من جمع جدول زمني تقريري للأحداث الرئيسية التي مَرَّ بها الكون منذ لحظة الانفجار العظيم حتى الآن. ويمثل المخطط الآتي بعض البيانات التي جُمِعَت عن أهم الأحداث التي مَرَّ بها الكون. أدرسه جيداً، ثم أجيب عن الأسئلة التي تليه.



التحليل والاستنتاج:

1. أستنتج التغيرات التي حدثت على كلّ من: حجم الكون، وكثافته مع الزمن.



2. أوضح دلالة الأحداث التي تمثلها الرموز (أ، ب، ج، د، ه).

.....

.....

.....

3. أحدد الأحداث التي مرّ بها الكون بحسب نظرية الانفجار العظيم منذ الزمان ( $10^{-43}$  s) حتى الزمن (380,000 years) بعد الانفجار.

.....

.....

.....

4. أتوقع ما سيحدث لكميّات غازٍ الهيدروجين والهيليوم بعد مضيّ مئات ملايين السنين من الآن.

.....

.....

.....


الوحدة 5 : المجرات ونشأة الكون



# أسئلة مثيرة لتفكير

## السؤال الأول:

أدرس الأشكال الآتية التي تمثل مجموعة من المجرات المختلفة في أشكالها، ثم أجيب عن السؤالين التاليين:



(ج)



(ب)



(أ)



(و)



(هـ)



(د)



(ط)



(ح)



(ز)

1. أتوقع: هل يمكن أن يتحول نوع من المجرات إلى نوع آخر؟

2. أبين رأيي في تصنيف العالم هابل للمجرات في (مخطط الشوكة الرنانة)، ثم أصمم مخططًا خاصًا بي للمجرات: (أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ط) التي في الشكل الأعلى، ثم أعرضه على زملائي / زميلاتي.

### السؤال الثاني:


درس العالم هابل أطياف عدد من المجرات، ولاحظ أنها تحرّك بعيداً عنّا، وأنّ سرعتها تزداد كلّما زاد بعدها عنّا.

أفكّر: هل تتغيّر سرعة الموجات المنبعثة من المجرات التي ترصدها المقاريب المختلفة؟

### السؤال الثالث:

يُمثّل الشكل المجاور العلاقة بين بُعد المجرات وسرعة تباعدها.

ادرس الشكل جيّداً، ثم أجيب عن الأسئلة الآتية:



1. أحسب ميل الخط المستقيم للخط البياني (ص).

2. أحسب ميل الخط المستقيم للخط البياني (س).

3. أحسب المتوسط الحسابي لميل الخط المستقيم للخطين البيانيين (س) و (ص).

4. أبّين: ماذا يُمثّل الخطان البيانيان (س) و (ص)؟

5. أشرح نصّ القانون الذي يحدّد العلاقة بين سرعة تباعد المجرة وبعدها عنّا.

**السؤال الرابع:**

أدرس الجدول الآتي الذي يوضح بعض مراحل تكون الكون وتطوره في بداية نشأته، ثم أجيب عن الأسئلة التي تليه:

عمر الكون	درجة الحرارة (K)	مراحل تكون الكون
$10^{-43}$ s	$10^{32}$	المرحلة الأولى
3 s	$5 \times 10^9$	المرحلة الثانية
380,000 years	$3 \times 10^3$	المرحلة الثالثة

1. أستنتج العلاقة بين درجة حرارة الكون وعمره.

2. أتوقع المرحلة التي بدأ فيها تكون الجسيمات البدائية، ثم أبرر سبب توقعني.

3. أتبّع الأحداث التي تكونت في المرحلة الثالثة.

4. أنشئ جدولًا أكمل فيه مراحل تكون الكون في ضوء ما درست.

5. أقارن بين مراحل تكون الكون الثلاث، وبين مراحل تكون الكون وفق نظرية الكون المستقر.

6. أتواصل مع زملائي / زميلاتي في التائج التي توصلت إليها.

**السؤال الخامس:**

**أتوّقّع ما يمكن أن يحدث في الحالتين الآتتين:**

**أ.** إذا كانت نسبة المادة المظلمة المكوّنة للكون أقلّ من نسبة المادة العاديّة.

**ب.** إذا كانت درجة حرارة إشعاع الخلفية الكونيّة الآن تساوي (3000 K).

**السؤال السادس:**

أدرس الجدول الآتي الذي وضعه أحد الطلبة حين وُجّه سؤال له عن الأدلة المؤيّدة لنظرية الانفجار العظيم، ثم أجب

عمما يليه:

إشعاع الخلفية الكونيّة	نسب الهيدروجين والهيليوم المتوافرة في الكون	درجة حرارة الكون الآن (2.7 K)
اكتشاف الكوازارات	انزياح أطياف النجوم فوق المستعرة نحو الأحمر	طاقة المظلمة

**أ.** أتقدّم الجدول الذي وضعه أحد الطلبة.

**ب.** أقترح تعديلات يمكن إجراؤها على الجدول.


**السؤال السابع:**

تدّعي الطالبة ليان بأنّ تسميات مكوّنات الكون، وهي: الطاقة المظلمة، والمادة المظلمة، والمادة العاديّة، لها تفسيرات تتعلّق بدورها في توسيع الكون. أقوّم صحة ادعاء ليان.

## السؤال الثامن:

أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة في ما يأتي:


1. العبارة التي تصف تكون الدوائر الأولية مثل الإلكترونات والبروتونات والنيترونات وصفاً صحيحاً هي:  
أ. يوجد فارق زمني بين تكون تلك الدوائر وأنوية كل من الهيدروجين والهيليوم يساوي (380,000 years).  
ب. يوجد فارق زمني بين تكون تلك الدوائر وأنوية كل من الهيدروجين والهيليوم يساوي دقائق قليلة.  
ج. تكونت تلك الدوائر عندما كانت درجة حرارة الكون تساوي (3000 K).  
د. تكونت تلك الدوائر لحظة الانفجار العظيم في الزمن ( $10^{-43} \text{ s}$ ).



2. يوضح الرسم البياني المجاور العلاقة بين:

- أ. درجة حرارة الكون وكتلته.  
ب. درجة حرارة الكون وعمره.  
ج. كثافة الكون وكتلته.  
د. كثافة الكون ودرجة حرارته.


3. وفقاً لنظرية الانفجار العظيم، فإن الرسم البياني الذي يمثل أفضل تمثيل للعلاقة بين الزمن وحجم الكون من بداية الكون إلى الوقت الحاضر هو:



4. أول المجرات التي رصدها العالم عبد الرحمن الصوفي من الأرض هي:  
أ. مجرة ماجلان الكبرى.  
ب. مجرة ماجلان الصغرى.  
ج. مجرة مسييه 59.  
د. مجرة المرأة المسلسلة.

5. أظهرت الدراسات التي أجريت على النجوم أنَّ مجرة درب التبانة تتكون من:  
أ. نوعين من النجوم: نجوم زرقاء قديمة، ونجوم حمراء حديثة.  
ب. نوعين من النجوم: نجوم حمراء قديمة، ونجوم زرقاء حديثة.  
ج. نوع واحد من النجوم وهو نجوم حمراء قديمة.  
د. نوع واحد من النجوم وهو نجوم زرقاء حديثة.

6. من الأمثلة على المجرات الإهليليجية:  
 أ. مجرة ماجلان الكبرى.      ب. مجرة ماجلان الصغرى.  
 ج. مجرة مسييه 59.      د. مجرة المرأة المسلسلة.



7. يتموضع النظام الشمسي في مجرة درب التبانة على الذراع:


ب. 2

أ. 1

د. 4

ج. 3

\* أتأمل الشكل المجاور الذي يمثل مخطط الشوكة الرنانة، ثم أجيب عن الفقرات (10، 9، 8) التي تليه:



8. الرمز الذي يشير إلى أحدث المجرات عمرًا هو:

د. ل

ج. ع

ب. ص

أ. س

9. الرمز الذي يشير إلى المجرة التي تحتوي أقل كمية من الغازات هو:

د. ل

ج. ع

ب. ص

أ. س

10. الرمز الذي يشير إلى أكثر المجرات الإهليليجية استطالة هو:

د. ل

ج. و

ب. ع

أ. ص

\* يمثل الجدول الآتي أنواعاً مختلفة من المجرات: (4، 3، 1)، أتأمله جيداً، ثم أجيب عن الفقرتين: (12، 11):

نوع المجرة	المجرة
حلزونية كروية النواة ذات أذرع شديدة الانفتاح.	1
حلزونية خطية النواة ذات أذرع متوسطة الانفتاح.	2
حلزونية كروية النواة ذات أذرع قليلة الانفتاح.	3
حلزونية خطية النواة ذات أذرع قليلة الانفتاح.	4

11. الرمز الذي يمثل المجرة (١) هو:

SBa . د.

Sa . ج.

Sc . ب.

SBb . أ.

12. المجرة ذات الرمز SBb هي المجرة:

د. 4

ج. 3

ب. 2


أ. 1

13. نوع المجرة التي يسهل رصدها مقارنة بأنواع المجرات الأخرى هي:

ب. المجرات غير المنتظمة.

د. المجرات الحلزونية كروية النواة.

ج. المجرات الحلزونية خطية النواة.



14. المجرة الظاهرة في الشكل المجاور هي:

أ. مجرة إهليليجية.


ب. مجرة حلزونية كروية النواة.

ج. مجرة حلزونية خطية النواة.

د. مجرة غير منتظمة.

15. الشكل الآتي يمثل تأثير دوبرل، تحرّك سيارة الإسعاف باتجاه الشخص (أ). واحدة من العبارات الآتية تُعبّر عن

التغيير في التردد والطول الموجي للموجات الصوتية الصادرة منها نسبيًّا إلى الشخص (ب):



ب. يقلّ التردد ويزداد الطول الموجي.

د. يقلّ كل من التردد والطول الموجي.

أ. يزداد التردد ويقلّ الطول الموجي.

ج. يزداد كل من التردد والطول الموجي.



\* أجيبي عن الفقرتين: (16، 17) مستعيناً بالشكل المجاور الذي يمثل

ثلاثة أطياف رُصدت لثلاثة أجرام سماوية (3، 2، 1):

16. إذا كان الجرم السماوي (2) يمثل حالة الثبات، فإنَّ الجرم

السماوي (1):

أ. يتحرك مُبعِدًا عن الجرم السماوي (2).

ب. يتحرك مُقتربًا من الجرم السماوي (2).

ج. يبقى ثابتاً ولا يتحرك.

د. يتحرك مُقتربًا تارَةً ومبعدًا تارَةً أخرى.

17. إذا كان الجرم السماوي (3) يمثل حالة الثبات، فإنَّ الجرم السماوي (2):

أ. يتحرك مُبعِدًا عن الجرم السماوي (3).

ب. يتحرك مُقتربًا من الجرم السماوي (3).

ج. يبقى ثابتاً ولا يتحرك.

د. يتحرك مُقتربًا من الجرم السماوي (3) تارَةً ومبعدًا عنه تارَةً أخرى.

18. إذا كانت سرعة تباعد إحدى المجرات هي  $1500 \text{ km/s}$  فإنَّ بُعد هذه المجرة عنا

بوحدة الفرسخ الفلكي هو:

أ.  $4 \times 10^6$       ب.  $2 \times 10^{12}$       ج.  $2 \times 10^7$       د.  $4 \times 10^8$

19. يمثل الجدول الآتي المجرات (4، 3، 2، 1)، حيث يشير طول السهم إلى شدة انزياح أطيافها نحو الأحمر، وعليه،


فإنَّ رقم المجرة التي تحوي أقلَّ كمية من الغازات هو:

رقم المجرة	لون الطيف	أزرق	أصفر	أحمر
1		←		
2		←		
3		←		
4		←		

أ. 1      ب. 2      ج. 3      د. 4

20. يفسر العلماء أنَّ سبب تسارع توسيع الكون هو وجود:

أ. المادة المألوفة.      ب. المادة العادية.      ج. المادة المظلمة.      د. الطاقة المظلمة.



21. يوضح المخطط البياني المجاور نسب مكونات الكون من مادة وطاقة، وعليه، يشير الرمز (س) إلى:
- المادة العادية.
  - المادة المظلمة.
  - الطاقة المظلمة.
  - المادة المألفة.

22. ما تأثير كل من المادة المظلمة والطاقة المظلمة في مكونات الكون مع ازدياد عمر الكون؟
- يقل تأثير المادة المظلمة ويزداد تأثير الطاقة المظلمة.
  - يزداد تأثير المادة المظلمة ويقل تأثير الطاقة المظلمة.
  - يزداد تأثير كل من المادة المظلمة والطاقة المظلمة.
  - يقل تأثير كل من المادة المظلمة والطاقة المظلمة.

23. يمثل الخط الزمني الآتي الوقت منذ 9 billion years حتى الوقت الحالي والمستقبل، الرمز على الخط الذي يمثل أقل تأثير للمادة المظلمة هو:



- ج. C      ب. B      أ. A  
د. D

24. إذا كان ثابت هابل يساوي  $73 \text{ km/s/Mpc}$  فإن عمر الكون بالسنوات هو:
- $$1.3698 \times 10^8$$
- $$136.98 \times 10^9$$
- $$13.698 \times 10^8$$
- $$13.698 \times 10^9$$

- د. يتغير بين زيادة ونقصان.  
ج. يبقى ثابتاً.  
ب. يقل.  
أ. يزداد.

25. كلما زادت قيمة ثابت هابل، فإن عمر الكون:
- يتوسع وتزداد كتلته وحجمه وتبقى كثافته ثابتة.
  - يتوسع وتزداد كتلته ويحافظ على حجمه ثابتاً دون تغير.
  - يبقى ثابتاً دون توسيع، فيحافظ على كثافة ثابتة وحجم ثابت.
  - يبقى ثابتاً دون توسيع، لكن كتلته وكثافته تتغير مع الوقت.

27. إحدى العبارات الآتية صحيحة في ما يتعلق بالكوازارات ما عدا:

أ . تعد أنوية مجرات نشطة وتصدر كميات هائلة من الطاقة.

ب . تتميز بلمعانها الشديد.

ج. تتموضع على بُعد مسافات شاسعة من مجرة درب التبانة.

د . تقل أعدادها كلما ابتعدت عنها باتجاه حافة الكون المرصود.

28. تشير الدراسات إلى أن إشعاع الخلفية الكونية تكون بعد مضي زمن من الانفجار العظيم، والذي يقدر بـ:

9 billion years      3 billion years      300 million years      380,000 years      أ .

29. الغاز الأكثر وفرة في الكون المرئي هو:

د . النيتروجين.      ج. الأكسجين.      ب . الهيدروجين.      أ . الهيليوم.

30. تكونت مادة الكون بدأية نشأته وفقاً لنظرية الانفجار العظيم من:

أ . الغوتونات والنيوترونات والإلكترونات.      ب . جسيمات بدائية غير موجودة الآن.

ج. نوى عناصر الهيدروجين والهيليوم.      د . النجوم الأولى.

31. كل العبارات الآتية صحيحة في ما يتعلق بمفهوم إشعاع الخلفية الكونية ما عدا:

ب . يمثل إشارات ميكروية غير منتظمة الخصائص.      أ . يُعد إشعاعاً كهرومغناطيسيّاً.

د . موجود باستمرار دون توقف أو تغيير.      ج. قادم من الاتجاهات كلها في الفضاء.

# تجربة استهلاكية

## توليد إعصار قمعي

### الخلفية العلمية:

تحدث الأعاصير القمعية بصورة رئيسة في الأماكن المعتدلة، إذ تُعد درجة الحرارة المرتفعة من أساسيات تكوين هذا النوع من الأعاصير، وتحدث في أي وقت خلال العام، لكن أكثر حدوث لها يكون خلال فصل الربيع والصيف في أوقات ما بعد الظهر من اليوم.

### الهدف:

تعرف شكل الإعصار القمعي ونشأته.

### المواد والأدوات:



قنيتان بلاستيكتان شفافتان سعة L<sup>2</sup>، ماء، ملون طعام، شريط لاصق شفاف أو سيليكون.

### إرشادات السلامة:



- غسل اليدين جيداً بعد استخدام ملون الطعام.
- التأكد من لصق الفوهتين بإحكام خوفاً من انسكاب الماء الملون على الطلبة.
- إجراء التجربة فوق صينية أو حوض لاحتواء أي انسكاب للماء.

### خطوات العمل:



1. أملأ ثلثي إحدى القنيتين بالماء، وألوّنه ببعض قطرات من ملون الطعام، وأنرك القنية الأخرى فارغة.
2. أثبتت فوهة القنية الفارغة على فوهة القنية التي تحتوي الماء الملون، وألصق الفوهتين بإحكام باللاصق الشفاف أو بالسيليكون حتى تصبحا كأنهما قنية واحدة.
3. أحمل القنيتين من عنقيهما، ثم أقلبهما رأساً على عقب بحيث تصبح القنية التي تحتوي على الماء الملون في الأعلى.
4. ألحوظ ما يحدث لحركة الماء الملون في القنية التي تقع في الأعلى.



## التحليل والاستنتاج:

1. أصف شكل الماء المتحرك في الخطوة رقم 4.

.....

.....

.....

2. أفسّر سبب اندفاع الماء من القنيّنة التي تحتوي على الماء الملؤن في الأعلى إلى القنيّنة الفارغة في الأسفل.

.....

.....

.....

3. أتوقع كيف تتغير نتائج التجربة لو وضع القنيّتان أفقياً من دون تحريك.

.....

.....

.....

4. أربط بين نتائج التجربة وبين حركة الإعصار القيمي.

.....

.....

.....

# التجربة 1

## ملاحظة قوّة الرياح ومقارنتها مع مقياس بيفورت

### الخلفية العلمية:

مقياس بيفورت هو مقياس وصفي يعتمد على ملاحظة تأثير حركة الرياح في الأشياء، وهو ذو أهمية كبيرة في تحديد حركة الطائرات والسفن ومزارع الرياح وغيرها من أنشطة الناس، ويمكن تقدير قوّة الرياح بالمشاهدة المباشرة لحركة الرياح حولنا، مثل مراقبة حركة أوراق الأشجار وأغصانها.

### الهدف:

ملاحظة قوّة الرياح بناءً على الملاحظة المباشرة وقياس سرعة الرياح.

### المواد والأدوات:

جهاز قياس سرعة الرياح (أنيمومتر)، ورق، قلم، مقياس بيفورت.

### إرشادات السلامة:

تونّي الدقة والحذر في التعامل مع المواد والأدوات، وتجنب التعرض للريح الشديدة.

### خطوات العمل:

1. أخرج إلى ساحة المدرسة، ثم أبدأ باكتشاف أيّ حركة للهواء، مثل الإحساس بحركته على وجهي، أو سماع صوت حركة الأشياء التي يؤثر فيها، أو حركة أوراق الأشجار وأغصانها، وأصف الريح اعتماداً على ملاحظتي، ثم أدوّن ملاحظاتي في الجدول الوارد في الصفحة اللاحقة.

2. أقدر قوّة الرياح بحسب مقياس بيفورت لذلك الوقت اعتماداً على ملاحظتي، وأدوّن ملاحظاتي في الجدول.

3. أقيس سرعة الريح باستخدام جهاز (الأنيومتر) وأدوّنها في الجدول.

4. أقدر قوّة الرياح بحسب مقياس بيفورت اعتماداً على قِيم سرعة الريح التي حصلت عليها.



5. أكّر الخطوات (٤،٣،٢) خلال أوقات متعددة من اليوم:

الأوقات	الملحوظات والقياسات		
12 ظهراً	10 صباحاً	8 صباحاً	
			وصف الرياح اعتماداً على ملاحظاتي.
			قوّة الرياح بحسب مقياس بيفورت اعتماداً على الوصف.
			سرعة الرياح (km/h).
			قوّة الرياح بحسب مقياس بيفورت اعتماداً على قيم سرعة الرياح المقيسة.

6. أقارن قيم قوّة الرياح التي حصلت عليها بالمشاهدة المباشرة بالقيمة التي حصلت عليها عن طريق قياس سرعة الرياح.

.....

.....

.....



### التحليل والاستنتاج:

1. أستنتج إمكانية تقدير قوّة الرياح بناءً على الملاحظة المباشرة.

.....

.....

.....

2. أستنتاج العلاقة بين قوّة الرياح وسرعتها بحسب مقياس بيفورت.

.....

.....

.....

3. أفسّر سبب اختلاف قوّة الرياح من وقت لآخر.

.....


.....

.....

الهدف:

تحديد أماكن انتشار الأعاصير المدارية في العالم.

تجتاح الأعاصير المدارية مناطق محددة في العالم وفي أوقات محددة. أدرسُ الشكل الآتي الذي يمثل أماكن حدوث الأعاصير المدارية (المشار إليها بالشكل الحلزوني الأسود) في العالم وأماكن انتشارها (الموضحة باللون الرمادي الداكن)، ثم أجيّب عن الأسئلة التي تليه:



التحليل والاستنتاج:



1. أحدد مناطق حدوث الأعاصير المدارية وانتشارها على الخريطة.

2. استنتج سبب حدوث الأعاصير المدارية في المناطق المحددة في السؤال السابق.



3. أستنتج سبب عدم نشأة الأعاصير المدارية فوق اليابسة.

.....

.....

.....

4. أفسّر لماذا لا تنشأ الأعاصير المدارية بالقرب من المناطق القطبية.

.....

.....

.....

5. أتوقع دوائر العرض التي ستكون الأعاصير المدارية أكثر قوة تدميرية عندها.

.....

.....

.....

6. أتوقع ماذا سيحدث اذا ارتفعت درجة حرارة مياه المحيطات بمقدار  $3^{\circ}\text{C}$  بشكل دائم على توسيع مناطق تشكل الأعاصير.

.....

.....

.....

### نموذج حدوث الفيضان

#### الخلفية العلمية:

تُعدّ الفيضانات من أكثر الكوارث الطبيعية المرتبطة بالطقس والمناخ انتشاراً، وقد تحدث الفيضانات نتيجة استمرار هطل الأمطار الخفيفة على المنطقة نفسها نتيجة تراكم المياه وعمرها اليابسة. كيف يؤدي هطل الأمطار الخفيفة إلى حدوث الفيضان في منطقة ما؟ وما العوامل المؤثرة في حدوث الفيضان؟

#### الهدف:

نموذج كيفية تأثير مدة الـهـطل في حدوث الفيضان.

#### المواد والأدوات:

قالب مكعبات ثلج فارغ، حوض بلاستيكي، قنينة بلاستيكية، ماء.

#### إرشادات السلامة:

- توخي الدقة والحذر في التعامل مع المواد والأدوات.
- توخي الحذر في أثناء ثقب غطاء القنينة البلاستيكية.

#### خطوات العمل:

1. أضع قالب مكعبات الثلج الفارغ في قاع الحوض البلاستيكي.
2. أحدث ثقوباً متعددة في غطاء القنينة البلاستيكية.
3. أملأ القنينة البلاستيكية في الماء بمقدار ثلثتها وأحکم إغلاقها.
4. أقلب القنينة وأضعها على ارتفاع 8 cm فوق أحد طرفي قالب مكعبات الثلج وأحرركها ببطء باتجاه الطرف الآخر للقالب مع المحافظة على تدفق ثابت للمياه فوق القالب، وأكرر ذلك ذهاباً وإياباً مدة 30 s.
5. أقيس عمق الماء في كل حجرة من حجرات قالب مكعبات الثلج، ثم أحسب متوسط العمق لجميع الحجرات.
- .....
- .....
6. أكرر خطوات التجربة مع تحريك القنينة فوق قالب مكعبات الثلج ولمدة 60 s.



## التحليل والاستنتاج:



1. أقارِنُ بين متوسط عمق الماء في الحالتين.

.....

.....

.....

2. أُفَسِّرُ: لماذا يوجد اختلاف بالعمق في الحالتين؟

.....

.....

.....

3. أستتَّجُ: كيف تؤثِّر مدة هَطل الأمطار في حدوث الفيضان؟

.....

.....


.....

4. أتوَقِعُ: كيف تؤثِّر غزارة هَطل الأمطار في عمق الماء وسرعة جريانه وحدوث الفيضان؟

.....

.....

.....



## أسئلة مثيرة للتفكير

السؤال الأول:

أدرس الجدول الآتي الذي يوضح سرعة الرياح المرافق للأعاصير القِمْعِيَّة (س، ص، ع، ك)، ثم أجيِّب عن الأسئلة التي تليه:

سرعة الرياح (km/h)	اسم الإعصار
102	س
190	ص
85	ع
300	ك

1. أُقارِنْ بَيْنَ الإعصارين: (س) و (ع) من حيث حجم الأضرار التي يسبِّبُها كُلُّ منهما.

2. أتوقع شكل هَطْل المطر المرافق للإعصار (ص) إذا كان معدَّل هَطْل المطر يساوي (50 mm/h).

3. أصف العلاقة بَيْنَ مقياسي فوجيتا ويفورت بالاعتماد على المعلومات الواردة في الجدول.

4. أستنتاج الأعاصير التي يمكن أن تُشكّل تهديداً مباشراً لحياتي وأنا في المنزل.

5. أفسّر: لماذا تسبّب الإعصار (ك) في إحداث أضرار كبيرة في أثناء عبوره منطقة ما في حين كانت الأضرار أقلّ في أثناء عبوره منطقة أخرى، علمًا أنَّ سرعة الإعصار ثابتة؟

6. أتواصل مع زملائي / زميلاتي في التائج التي توصلت إليها.

**السؤال الثاني:**

يدعى الطالب أحمد أنَّ الأردن مُعرَّض لحدوث الأعاصير الْقِمْعِيَّة، إلا أنَّه غير مُعرَّض لحدوث الأعاصير المدارية، أمّا زميله خالد، فيرى أنَّ الأردن مُعرَّض لحدوث الأعاصير الْقِمْعِيَّة والمدارية، في حين يرى زميلهم علاء أنَّ الأردن غير مُعرَّض لحدوث هذه الأعاصير. أفند صحة آراء الطلبة الثلاثة.

### السؤال الثالث:

أفترض أنني أعيش في منطقة مهدّدة بحدوث الأعاصير المدارية التي ترافقها رياح سرعتها (250 km/h). في ضوء ذلك؛  
أجيب عن السؤالين الآتيين:

أ. أتوقع خطورة هذا الإعصار على حياة الأفراد القاطنين في المنطقة.

ب. أصف المكان المناسب للعيش فيه من حيث يُبعد المبني عن الشاطئ وارتفاعه، وتوافر الغطاء النباتي، وبما يضمن  
السلامة والأمان من مخاطر الإعصار.

### السؤال الرابع:

أُقرّر أيُّ الإعصارين أكثر تدميراً: الإعصار (أ) الذي قطع مسافة (4000 km) في (9 days)، أم الإعصار (ب) الذي قطع  
مسافة (50 km) في (8 min)، موضحاً المبررات التي استعنتُ بها في إجابتي.

## السؤال الخامس:

أضاع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة في ما يأتي:

1. العاصفة الكبيرة المستمرة منذ أسبوعين وعلى وشك أن تضرب منطقة جديدة هي على الأغلب عاصفة:  
أ. مدارية.      ب. قِمعية.      ج. رِيحية.      د. ثلوجية.

2. أفترض أنني التقاطت صورة واضحة لعين الإعصار المداري، فإنني سألاحظ في الصورة:  
أ. رياحاً قوية جداً.      ب. رياحاً هادئة جداً.      ج. أمطاراً غزيرة.      د. رعداً وبرقاً.

3. تضعف الأعاصير المدارية بسرعة حين تنتقل إلى:  
أ. المحيطات الدافئة.      ب. اليابسة.      ج. المحيطات الباردة.      د. مدار الجدي.

4. الأداة التي تُستخدم في قياس سرعة الرياح هي:  
أ. مخروط الرياح.      ب. الأنيمومتر.      ج. سهم الرياح الدوار.      د. مسطرة القياس.

5. توصف الرياح بأنها (رياح قوية إلى عاصفة عنيفة) إذا كانت قوتها بحسب مقياس بيفورت:  
أ. من (0-1).      ب. من (5-12).      ج. من (6-11).      د. من (11-12).

6. عندما يزيد معدل الهَطل على ( $50 \text{ mm/h}$ )، فإن الهَطل يوصف بأنه:  
أ. رذاذ.      ب. أمطار خفيفة.      ج. زخات مطر شديدة جداً.      د. زخات مطر خفيفة.



7. اتجاه الرياح في الشكل المجاور هو:  
أ. شرق.      ب. غرب.      ج. شمال شرق.      د. جنوب غرب.

8. يتشكل البرد عندما:  
أ. تحمل التيارات الهوائية الصاعدة قطرات المطر إلى الأعلى وتتجمد.  
ب. تنخفض درجة حرارة الهواء في الغيمة إلى  $0^{\circ}\text{C}$  أو أقل.  
ج. تصبح الغيمة مُشبعة تماماً بقطرات الماء وثقيلة جداً فتتخلص من حمولتها.  
د. تتصادم بلورات الثلج وتتحد معًا مكونة بلورات أكبر حجمًا.

9. كمية المطر التي يجمعها القِمع في مقياس المطر نسبة إلى كمية المطر التي يجمعها الأنبوب الزجاجي هي:  
أ. 5 أضعاف.      ب. 8 أضعاف.      ج. 10 أضعاف.      د. 12 ضعفًا.


10. عندما تنخفض درجة حرارة الهواء في الغيمة إلى  $0^{\circ}\text{C}$  أو أقل، فإن بخار الماء يتكتاف مُكونًا:  
أ. المطر.      ب. البرد.      ج. الثلج.      د. الندى.

11. تفاصي كمية الثلوج المتساقط باستخدام:  
 أ. مقياس المطر.      ب. مسطرة القياس.  
 ج. الأنيمومتر.      د. مقياس بيفورت.

12. تصنف الرياح وفقاً لمقياس بيفورت بحسب:  
 أ. موقعها.      ب. زمن حدوتها.  
 ج. اتجاهها.      د. قوتها.


13. تنشأ الأعاصير المدارية في فصل:  
 أ. الخريف.      ب. الربيع.  
 ج. الصيف.      د. الشتاء.

14. إذا حدثت أضرار معتدلة وإزاحة للسيارات المتحركة من الطرق، فإن شدة الإعصار القمعي وفقاً لمقياس فوجيتا هو:  
 F0.      F1.      F2.      F3.



15. الرمز الذي يشير إلى عين الإعصار في الشكل المجاور الذي يمثل تشكل الإعصار المداري هو:  
 أ. س  
 ب. ص  
 ج. ع  
 د. و

\* أجيب عن الفقرة (16)، معتمدًا على الشكل الآتي الذي يمثل الأعاصير القمعية.



16. أي من مراحل الإعصار القمعي الآتية ناتجة عن حركة الرياح الدافئة بالقرب من سطح الأرض والباردة في طبقات الجو العليا وفي اتجاهين مختلفين?  
 أ. العواصف الفاقعة.  
 ب. الدّوامة الهوائية الرأسية.  
 ج. رياح القصّ.  
 د. الإعصار المخروطي.

17. تحدث الأعاصير القمعية غالباً على:


- أ. اليابسة خلال فصلي الربيع والصيف في أوقات ما بعد الظهر.
- ب. المحيطات خلال فصل الشتاء في أوقات الصباح الباكر.
- ج. اليابسة والمحيطات في فصل الشتاء في أوقات ما بعد الظهر.
- د. المحيطات خلال فصلي الربيع والصيف في أوقات الصباح الباكر.

18. تحدث الأعاصير المدارية في العالم فوق:

- ب. المحيطات قُرب دائرة الاستواء.
- د. القارات قُرب دائرة الاستواء.
- أ. المحيطات قُرب القطب الشمالي.
- ج. القارات قُرب القطب الجنوبي.

19. إحدى العبارات الآتية تصف الإعصار المداري بعْدَ أَنْ يتَوَغل مسافات طويلة فوق اليابسة:

- ب. تزداد الطاقة الكامنة فيه.
- د. تهطل الأمطار بغزاره.
- أ. يقل تزويده ببخار الماء.
- ج. تنشأ رياح شديدة وقوية.



20. يصنف الإعصار المداري الذي يدمر البنية التحتية والمناطق السكنية دائمًا كما في الشكل المجاور وفقاً لمقاييس سفير سمبسون إلى:

- ب. الفئة الثالثة.
- د. الفئة الخامسة.
- أ. الفئة الثانية.
- ج. الفئة الرابعة.

21. تتشكل الأعاصير المدارية فوق المحيطات، وتُسمّى هذه الأعاصير إعصار (التيふون) عندما تتشكل فوق:

- ب. المحيط الأطلسي.
- د. المحيط الهندي.
- أ. المحيط المتجمد الشمالي.
- ج. المحيط الهادئ.

22. تنشأ الأعاصير المدارية في فصل الصيف فوق المحيطات الاستوائية عند:

- أ. ارتفاع الهواء الرطب إلى الأعلى وتكاثفه مُشكلاً السُّحب الركامية.
- ب. ارتفاع الهواء الجاف إلى الأعلى وتكاثفه مُشكلاً السُّحب الطبقية.
- ج. هبوط الهواء الرطب إلى الأسفل نحو منطقة الضغط المرتفع.
- د. هبوط الهواء الجاف إلى الأسفل نحو منطقة الضغط المرتفع.

23. الدرجة التي تشير إلى الإعصار الأكثر شدّة في مقاييس فوجيتا هي:

- د. F1.
- ج. F0.
- ب. F6.
- أ. F5.

24. تتشكل الأعاصير المدارية المدمّرة قُرب دائرة العرض:

- د.  $90^{\circ}$  جنوباً.
- ج.  $90^{\circ}$  شمالاً.
- ب.  $60^{\circ}$  شمالاً وجنوباً.
- أ.  $0^{\circ}$ .

25. جميع العوامل الآتية تزيد من فرص حدوث الفيضان ماعدا:

- ب. زيادة زمن الهطل.
- أ. قلة الغطاء النباتي.
- د. تشبع التربة بالماء.
- ج. تساقط أمطار خفيفة في مدة زمنية قصيرة.

26. من الأسباب الطبيعية لحدوث الجفاف:

- ب. الإفراط في الزراعة.
- أ. قطع الغابات.
- د. الضخ الجائر للمياه الجوفية.
- ج. تغيير أنماط الطقس.

27. تشكل موجات الحر عندما:

- أ. تكون أنظمة الضغط المرتفع تيارات صاعدة تعمل على تضاغط الهواء وتسخينه.
- ب. تكون أنظمة الضغط المرتفع تيارات هابطة تعمل على تضاغط الهواء وتسخينه.
- ج. تكون أنظمة الضغط المنخفض تيارات هابطة تعمل على تضاغط الهواء وتسخينه.
- د. تكون أنظمة الضغط المنخفض تيارات صاعدة تعمل على تضاغط الهواء وتسخينه.

28. العبارات الآتية جمیعاً من الآثار الناتجة من حدوث الجفاف ماعدا:

- ب. الأضرار بالممتلكات والبنية التحتية.
- أ. نضوب مصادر المياه المختلفة.
- د. تأكل التربة.
- ج. موت الكائنات الحية.

29. توصف موجة الحر التي تستمر أكثر من 7 أيام وتكون فيها فروقات درجة الحرارة أكثر من  $10^{\circ}\text{C}$  بأنّها:

- ب. موجة حر شديدة جداً وطويلة المدة.
- أ. موجة حر شديدة جداً وطويلة المدة.
- د. موجة حر متوازنة الشدة وقصيرة المدة.
- ج. موجة حر متوازنة الشدة وقصيرة المدة.

30. تُحدّد موجات الحر في الأردن كل عام ابتداءً من:

- ب. شهر أيار إلى شهر حزيران.
- أ. شهر حزيران إلى شهر تشرين الثاني.
- د. شهر أيار إلى شهر تشرين الأول.
- ج. شهر حزيران إلى شهر آب.

# تجربة استهلاكية

## أهمية الأحافير في التتابعات الطبقية

### الخلفية العلمية:

توجد الصخور الرسوبيّة في الطبيعة على هيئة طبقات متتالية، ويمكن أن يحتوي العديد منها أحافير محددة.

### الهدف:

تعرّف أهمية الأحافير في التتابعات الطبقية.

### المواد والأدوات:

وعاء بلاستيكي سعّته 1 L، 250 ml ماء، 100 ml ملح، قطعة إسفنج صغيرة، 500 ml رمل.

### إرشادات السلامة:



- تونّخي الحذر عند سكب المواد في الوعاء البلاستيكي.
- غسل اليدين بعد الانتهاء من تنفيذ التجربة.

### خطوات العمل:



1. أسكب 250 mL من الرمل في الوعاء البلاستيكي.
2. أضع القطعة الإسفنجية في الوعاء البلاستيكي، ثم أسكب فوقها 250 mL من الرمل بحيث تتشكل طبقة رملية تحوي بداخلها قطعة الإسفنج.
3. أسكب 250 mL من الماء الدافئ في كوب سعّته 500 mL.
4. أقيس 100 mL من الملح، ثم أضيف الملح إلى الماء أحركهما جيداً حتى يذوب الملح.
5. أسكب محلول الملح فوق الرمل في الوعاء البلاستيكي، ثم أغطي الوعاء البلاستيكي بشبك وأضعه تحت أشعة الشمس مدة أسبوع.
6. أستخرج قطعة الإسفنج من الرمل.



## التحليل والاستنتاج:



1. أصف ماذا حدث لقطعة الإسفنج.

.....

.....

.....

2. أقارن بين تصلب قطعة الإسفنج وتشكل الأحافير في الصخور.

.....

.....

.....

3. أقارن بين عمر طبقة الرمل والأحفورة التي شكلتها باستخدام قطعة الإسفنج.

.....

.....

.....

4. استنتج: إذا وضع طبقة أخرى من الرمل فوق الطبقة الأولى، أي الطبقتين هي الأحدث؟

.....

.....

.....


# مبدأ القاطع والمقطوع

الهدف:


تطبيق مبدأ القاطع والمقطوع في تحديد تسلسل الأحداث الجيولوجية.

أتأمل الشكلين الآتيين (أ) و(ب)، علماً أنَّ الشكل (أ) يوضح طبقات من صخور رسوبية (س، ع، و) والطفح البركاني (ص)، والشكل (ب) يوضح طبقات من صخور رسوبية (س، ص) والقاطع الناري (ع)، ثم أجيِّب عن الأسئلة التي

تليهما:



الشكل (ب)



الشكل (أ)

التحليل والاستنتاج:

- أُحدِّد أيَّ الأحداث الجيولوجية أَحْدثت في الشكل (أ)، الطفح البركاني (ص) أم الصخر الرسوبي (س). فأُجِّبِي.



2. أصلد حكماً على صحة العبارة الآتية، مبرراً إجابتي.  
«الصخران الرسوبيان (س، ص) في الشكل (ب) أحدث عمراً من القاطع الناري (ع)».

3. أوضح: ما تأثير القاطع الناري (ع) على الصخور الرسوبية في الشكل (ب)؟

4. أحدد عدد التعاقبات الرسوبية في الشكلين (أ) و(ب).


5. أرتّب الأحداث الجيولوجية في الشكلين (أ) و(ب) من الأقدم إلى الأحدث.

## مبدأ الاحتواء


الهدف:

تعرّف أشكال الاحتواء التي قد تحدث بين أنواع الصخور المختلفة.


أدرس الأشكال الآتية التي تبيّن كيفية الاحتواء بين أنواع الصخور المختلفة، ثم أجيب عن الأسئلة التي تليها:




(ب): قِطَعٌ من الصخر الرسوبي (س)  
داخل الصخر الرسوبي (ص).



(أ): قِطَعٌ من الصخر الناري (س)  
داخل الصخر الرسوبي (ص).



(د): قِطَعٌ من الصخر الرسوبي (ص)  
داخل الصخر الناري (س).



(ج): قِطَعٌ من الصخر الناري (س)  
داخل الصخر الناري (ص).



## التحليل والاستنتاج:



1. أُحدِّد الصخر الأقدم والصخر الأحدث في الشكلين (أ) و (ج).

.....

.....

.....

2. أتوقع: ما سبب حدوث الاحتواء في الشكل (ب)؟

.....

.....

.....

3. أفسّر: كيف يحيي الصخر الناري (س) قطعاً من الصخر الرسوبي (ص) في الشكل (د)؟

.....

.....

.....

والمراجعة


# مبادئ التأريخ النسبي

الهدف:

استخدام مبادئ التأريخ النسبي لإيجاد الأعمار النسبية للصخور الرسوبيّة.

أتأمل المقطع الآتي الذي يُمثل تعاقبات من الصخور الرسوبيّة (أ، ج، د)، والقاطع الناري (ع) والطفح البركاني (ب)،

ثم أجيب عن الأسئلة التي تليه:



التحليل والاستنتاج:

1. أحدد عدد سطوح عدم التوافق وأنواعها.

2. أستنتج من الشكل عدد التعاقبات الرسوبيّة.

3. أربّب الأحداث الجيولوجية: (أ، ب، ج، د، ع) من الأقدم إلى الأحدث؛ ذاكراً المبادئ التي اعتمدت عليها.

4. أوضح تأثير القاطع الناري في الطبقات الرسوبيّة: (أ، ج، د).

# تجربة 1

## نمذجة الأضمحلال الإشعاعي

### الخلفية العلمية:

تستمر الذرات المشعة بالاضمحلال بحسب عمر النصف الثابت لها. يُعرَّف عمر النصف بأنه الزمن اللازم لاضمحلال نصف عدد ذرات النظير الأُمّ المشعة في العينة إلى نظيرة وليدة أكثر استقراراً، أو مستقرة. فماذا يحصل لعدد ذرات النظير الأُمّ المشعة والنظيره وليدة بمرور الزمن؟

### الهدف:

نمذجة آلية الأضمحلال الإشعاعي في العناصر المشعة، وتعُرف مفهوم عمر النصف.

### المواد والأدوات:

مِقصٌ، شريط ورقي، مسطرة مترية، لوح من الكرتون، أقلام مختلفة الألوان.

### إرشادات السلامة:

- توخي الحذر عند استخدام المِقص.

### خطوات العمل:

- أحضر لوح الكرتون لتمثيل منحنى الأضمحلال الإشعاعي، ثم أرسم عليه محورين (سيني، وصادي)، بحيث يُمثل المحور السيوني عدد مُدة عمر النصف، ويُمثل المحور الصادي عدد الذرات.
- أقى طول الشريط الورقي، ثم أُمثل قيمته على الرسم البياني، بحيث يُمثل عدد ذرات النظير الأُمّ المشعة الأصلية عند مُدة عمر النصف (صفر).
- أقى الشريط قسمين متساوين: أحدهما يُمثل النظير الأُمّ المشعة المتبقية، والآخر يُمثل النظيره وليدة المستقرة، وأقى طولهما، ثم أُمثل قيمتهما على الرسم البياني في مُدة عمر النصف الأولى.
- أقى الشريط الناتج الذي يُمثل النظير الأُمّ المشعة المتبقية جزأين متساوين، بحيث يُمثل أحدهما النظير الأُمّ المشعة المتبقية، وأقى طوله، ثم أُمثل قيمته على الرسم البياني في مُدة عمر النصف الثانية.
- أجمع طول الشريط الآخر الناتج في الخطوة 4 الذي يُمثل النظيره وليدة المستقرة مع الطول الناتج لها في الخطوة 3، ثم أُمثل قيمة المجموع على الرسم البياني في مُدة عمر النصف الثانية.
- أكّر الخطوة 4 لتمثيل ذرات النظير الأُمّ المشعة المتبقية في مُدة عمر النصف الثالثة.



7. أجمع طول الشريط الناتج في الخطوة 6 مع الطول الناتج في الخطوة 5؛ لتمثيل عدد ذرات النظيرة الوليدة المستقرة في مدة عمر النصف الثالثة.

8. أُمِّلِّي البيانات للدلالة على مُدَّة عمر نصف رابعة بقص الشريط الناتج، وقياس طوله لتمثيل النظيرة الأم المشعة المتبقية. بعد ذلك أجمع طول الشريط الآخر الذي يُمثّل النظيرة الوليدة المستقرة مع الطول الناتج في الخطوة 7 ثم أُمِّلِّي قيمتهما على الرسم البياني.

9. أرسم المنحنى الذي يُمثّل النظيرة الأم المشعة المتبقية، والمنحنى الذي يُمثّل النظيرة الوليدة المستقرة.

#### التحليل والاستنتاج:

1. أُحدِّد ماذا تُسمّى النظيرة المشعة عند مُدَّة عمر النصف صفر؟

.....  
.....  
.....

2. أحسب النسبة بين النظيرة الأم المشعة المتبقية والنظيرة الوليدة المستقرة عند مُدَّة عمر النصف الثالثة.

.....  
.....  
.....

3. أقارِن بين منحنى النظيرة الأم المشعة المتبقية ومنحنى النظيرة الوليدة المستقرة.

.....  
.....  
.....

4. أستنتاج قيمة النظيرة الوليدة المستقرة بعد مُدَّة عمر النصف الخامسة.

.....  
.....  
.....


# إعطاء الصخور الرسوبية أعماراً مطلقةً

الهدف:

إعطاء الصخور في التتابعات الطبقية أعماراً مطلقةً باستخدام صخور نارية معروفة أعمارها.

تُستخدم الصخور النارية في تحديد أعمار الصخور الرسوبية على نحوٍ غير مباشر. ويُمثل الشكل الآتي تتابعات من الصخور الرسوبية (أ، ب، ج، د، هـ)، والصخر الناري (ص)، والقاطعين الناريين (ع، ل)، والطفح البركاني (س)، علماً أنَّ جميع أعمارها المطلقة مقيسة بـملايين السنين (million years). أدرس الشكل، ثم أجيِّب عن الأسئلة التي

تليه:





### التحليل والاستنتاج:

1. أُحدّد مبدئين للتاريخ النسبي يمكن استخدامهما في الشكل لترتيب الطبقات والأحداث الجيولوجية من الأقدم إلى الأحدث.

2. أستنتج عمر التعاقب الطيفي (أ، ب، ج).

3. أستنتاج عمر الطبقة (هـ).

# بناء سُلَّم زَمْن جِيُولُوْجِي فِي الْأَرْدَن

## الهدف:

تطبيق المبادئ النسبية في بناء سُلَّم زَمْن جِيُولُوْجِي للصخور والأحداث الجيولوجية التي شهدتها الأردن.

يُمثّل سُلَّم الزَّمْن الجِيُولُوْجِي سُجَّلاً للصخور والأحداث التي شهدتها سطح الأرض منذ نشأتها حتى اليوم، وتعَدُّ الصخور والأحداث التي شهدتها الأردن جزءاً من تلك الأحداث.

## خطوات العمل:

- أرسم جدولًا على لوح من الكرتون يحوي أعمدة تمثل العناوين الآتية: الحقبة، العصر، أنواع الصخور، الأحداث الجيولوجية.

الأحداث الجيولوجية	أنواع الصخور	العصر	الحقبة
		الرباعي (بلستوسين، هولوسين)	
		الثلاثي (باليوسين، إيوسين، أوليغوسين، ميوسين)	حقبة الحياة الحديثة
			.....

- أقسّم الجدول صفوفاً بحسب المدّة الزمنية من الأقدم في الأسفل إلى الأحدث في الأعلى.

- أكمل الفراغ في الجدول بما درسْتُه عن الصخور والأحداث التي شهدتها الأردن.

ملحوظة: يمكن الاستعانة بالإنترنت والمراجع العلمية لتعريف المزيد عن ذلك.




التحليل والاستنتاج:

1. أُحدّد أقدم أعمار قُدرت لصخور الأردن.

2. أقارن بين صخور حقبة ما قبل الكامبري وصخور حقبة الحياة المتوسطة من حيث النوع.


3. أفسّر سبب اختلاف أنواع الصخور في العصر الكريتاسي السفلي عنها في العصر الكريتاسي العلوي.



## أسئلة مثيرة للفحص

### السؤال الأول:

يُمثّل الشكل الآتي أحد تكشّفات صخور الركيزة في جنوب الأردن، وهو يتكون من صخور تابعة لمعقد العقبة، وهي صخور نسق اليتم الغرانيتية التي قدرت أعمارها بنحو 608 million years، وصخور نسق فينان - الحمراء الغرانيتية التي تتبع معقد العربة، وتقدّر أعمارها بنحو 586 million years، والقواطع النارية ذات التركيب البازلتية التي قدرت أعمارها بنحو 545 million years، والصخور الرملية التي تتبع العصر الكامبري. أدرس الشكل، ثم أجيب عن الأسئلة التي تليه:




1. أُحدّد: ما نوع سطح عدم التوافق بين الصخر الرملي وصخور نسق اليتم الغرانيتية؟

2. أقارِن بين القواطع البازلتية وصخور نسق فينان - الحمراء الغرانيتية من حيث العمر.

3. أُرتب الأحداث الجيولوجية التي شهدتها المنطقة من الأقدم إلى الأحدث.

**السؤال الثاني:**

يُمثّل الشكل الآتي تعاقبات من الصخور الرسوبيّة: (أ، ب، ج، د)، والصخر الناري (ص)، والقاطع الناري: (ع، هـ، س). أدرس الشكل، ثم أجيّب عن الأسئلة التي تليه:



1. أُحدّد رمز أحدث قاطع ناري في الشكل.

2. أقارِنْ بين القاطعين الناريَّين: (ع) و (هـ) من حيث العُمر النسبي.

3. أُرتب الأحداث الجيولوجية الواردة في الشكل من الأقدم إلى الأحدث.

4. أذْكُر مبدأً من مبادئ التأريخ النسبي استُخدِّماً في ترتيب الأعماres النسبي للأحداث الجيولوجية الواردة في الشكل.


### السؤال الثالث:

**أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة في ما يأتي:**

1. المبدأ الذي ينصّ على أنَّ «الصخور الرسوبيَّة تمتدُ جانبيًّا في جميع الاتجاهات على امتداد حوض الترسيب، ويقلُّ سُمكُها تدريجيًّا عند أطراف الحوض، وأنَّ للطبقة الواحدة عمُراً جيولوجيًّا واحدًا في أيِّ مكان توجد فيه ضمن الحوض الترسبيِّ» هو مبدأً:


أ. القاطع والمقطوع.      ب. التعاقب الطبقي.      ج. الاستمرارية الجانبيَّة.      د. الاحتواء.

2. بالرجوع إلى الشكل المجاور الذي يمثلُ احتواء الصخر الرسوبي (ص) قِطْعاً من الصخر الناري (س)، فإنَّ الرمز (و) يشير إلى سطح:



- أ.** توافق.      **ب.** لا توافق.      **ج.** عدم توافق حتى.      **د.** عدم توافق زاوي.

3. الاحتواء الذي يحدث في حوض الترسيب في أثناء عملية الترسيب يحدث فيه:  
أ. احتواء صخر ناري قطعاً من صخر رسوبى.  
ب. احتواء صخر متتحول قطعاً من صخر ناري.  
ج. احتواء صخر رسوبى قطعاً من صخر رسوبى آخر. د. احتواء صخر ناري قطعاً من صخر ناري آخر.



\* يمثل الشكل المجاور المقطعين (A) و (B) أجريت بينهما مضاهاة صخرية. إذا علمت أن الصخر (س) هو أحد الصخور النارية، وبقية الصخور هي صخور رسوبية، أتأمل الشكل، ثم أجي布 عن الفقرة: (4, 5).

٤. عدد أسطح الالاتوافق في الشكل هو:  
 أ. ١      ب. ٢      ج. ٣      د. ٤


5. عدد أسطح عدم التوافق حتى في الشكل هو:

أ . 4

ب . 3

ج . 2

د . 1




6. عدد أسطح عدم التوافق في الشكل المجاور الذي يمثل مضاهاة أحفورية بين مقطعين صخريين رسوبيين (A) و(B) هو:

أ . 1

ب . 2

ج . 3

د . 4



\* أجب عن الفقرات (7, 8, 9, 10)، معتمدًا على الشكل المجاور الذي يمثل تعاقبات من الصخور الرسوبيّة (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)، وقطاعين ناريّين (س، ص)، والصداعين (ع، و):

7. عدد سطوح عدم التوافق هو:

أ . 1

ب . 2

ج . 3

د . 4

8. عدد التعاقبات الرسوبيّة في الشكل هو:

أ . 2

ب . 3

ج . 4

د . 5

9. ترتيب الأحداث الجيولوجية (و، ص، 2، 4، 5) من الأقدم إلى الأحدث من اليمين إلى اليسار هو:  
أ . 2، 4، 5 ، ص، و      ب . ص، و، 2، 4 ، 5      ج . ص، 2، 4 ، و، 5      د . 2، ص، و


10. إذا علمت أن عمر القاطع الناري (ص) هو 350 million years وعمر القاطع الناري (ص) هو فإن عمر التعاقب الطبقي (ص، 2، 4) هو:

أ . أكبر من 200 million years

ب . أقل من 200 million years


ج . أكبر من 350 million years

د . يساوي 350 million years



11. يبيّن الشكل المجاور تعلقيات من الصخور الرسوبيّة (س، ص، ع، ل، و) والصدع (1) والقاطع الناري (2). بناءً على ذلك، فإنَّ ترتيب المعالم الجيولوجية (س، ص، ل، 2، 1) من الأقدم إلى الأحدث من اليمين إلى اليسار هو:

- أ. س، ص، ل، 1، 2  
ب. س، ص، ل، 1، 2  
ج. س، ص، 1، 2، ل  
د. 1، س، ص، ل، 2



\* يبيّن الشكل المجاور منحنى الأضمحلال الإشعاعي لأحد العناصر المشعة بعد تحليل إحدى العينات الصخرية، أتمّل الشكل، ثم أجيّب عن الفقرتين (13 و 12).

13

12. عمر النصف لهذه العينة هو:

- أ. 2 million years      ب. 3 million years      ج. 4 million years      د. 6 million years

13. عدد الذرات المتبقية بعد مرور 12 million years هو:

- أ.  $20 \times 10^{12}$       ب.  $30 \times 10^{12}$       ج.  $10 \times 10^{12}$       د.  $50 \times 10^{12}$

14. بدأت عينة من عنصر مشع بالتحلل، إذا تحلل  $(\frac{3}{4})$  العينة خلال 24 years، فإن عدد فترات عمر النصف هو:

- أ. 1      ب. 2      ج. 3      د. 4

15. حلّلت عينة تمثل بلورة لأحد المعادن بمطياف الكتلة، فوُجد أنَّ كمية الرصاص نسبيَّة إلى اليورانيوم في العينة هو 1:15، فإذا علمْتُ أنَّ عمر النصف لليورانيوم هو 4.5 billion years، فإنَّ عمر البلورة هو:


- أ. 16 billion years      ب. 4.5 billion years      ج. 18 billion years      د. 13.5 billion years

16. تتكون معظم صخور نهاية العصرين الأوردو فيشي والسيلوري من صخور:  
أ . البازلت.      ب. الغرانيت.      ج. الغضار.      د . الكونغلو ميريت.

17. يتكشف صخر الجبس التابع لحقبة الحياة المتوسطة في منطقة:  
أ . نهر الزرقاء.      ب. شمال مصب وادي الموجب.      ج. وادي عربة.      د . شيحان.

18. من المعادن أو الصخور التابعة لحقبة الحياة القديمة في الأردن:  
أ . الذهب.      ب. الدولوميت.      ج. الزيوليت.      د . الزركون.

19. بناءً على الشكل المجاور الذي يمثل سطح التسوية، فإنَّ الرمزين (س) و(ص) يشيران بالترتيب إلى:



أ . صخور البازلت، الصخور الرملية.  
ب. صخور الكونغلو ميريت، الصخور الجيرية.  
ج. صخور رملية، صخور الركيزة النارية.  
د . صخور الركيزة النارية، صخور رملية.

20. المعدن الذي يستخدم في تنقية المياه العادمة هو:  
أ . الزيوليت.      ب. الكاؤولين .  
ج. الزركون.      د . الفلسيبار.

21. تميل صخور الركيزة بزاوية مقدارها  $5^{\circ}$  إلى:  
أ . الجنوب والشرق والشمال الشرقي.  
ب. الشمال والشرق والجنوب الشرقي.  
ج. الجنوب والغرب والشمال الغربي.  
د . الشمال والغرب والشمال الغربي.

22. يتموضع صخر الطباشير في العديد من التكوينات الجيولوجية الطبقية التابعة للعصر:  
أ . الكريتاسي العلوي      ب. الكامبيري  
ج. الأوردو فيشي      د . البيرمي

- أ. الصخر الجيري.  
ب. البازلت.  
ج. الغرانيت.  
د. الكاولين.

23. الصخر الذي يستخدم في صناعة الصوف الصخري هو:

أ. الكاولين.  
ب. البازلت.  
ج. الغرانيت.  
د. الصخر الجيري.

24. ترتيب كل من وحدات سُلْمِ الزَّمْنِ الجِيُو لُوْجِيِّي من الْوَحْدَةِ الْكَبْرِيِّيِّ إِلَى الْوَحْدَةِ الصَّغِيرِيِّ هُوَ:

أ. الدهر، الحقبة، العصر.  
ب. العصر، الحقبة، الدهر.  
ج. الحقبة، الدهر، العصر.  
د. الدهر، العصر، الحقبة.

25. قاس العلماء أعمار أكثر من 70 نيزكاً، ووجدوا أنّ أعمارها تتراوح بين:

أ. (3.7 – 3.8) billion years  
ب. (4.53 – 4.58) billion years  
ج. (800 – 540) billion years  
د. (540 – 225) billion years

26. أراد باحث جيولوجي دراسة صخور تكوين البرج، الصخور التي سيجدها الباحث في هذا التكوين هي:

أ. الصخور الجيرية والصخور الدولوميتية.  
ب. صخور الكونغلوميريت والصخور الجيرية.  
ج. صخور الغرانيت والصخور الجيرية.  
د. الصخور الدولوميتية وصخور البازلت.

27. سبب تموُّض صخور الكريتاسي العلوي في معظم مناطق الأردن هو:

أ. طغيان محيط التيشس في معظم مناطق الأردن.  
ب. سيادة البيئة النهرية في معظم مناطق الأردن.  
ج. انحسار محيط التيشس نحو الشمال.  
د. تكُشُّف الصخور بفعل عمليات الرفع.

28. في أثناء رحلة علمية لفريق من الجيولوجيين في عدة مناطق من الأردن، لوحظ وجود من الصخور الملحية في إحدى المناطق، الزمن الذي تتبع له هذه الصخور هو:

أ. ما قبل الكامبيري.  
ب. حقبة الحياة القديمة.  
ج. حقبة الحياة الحديثة.  
د. حقبة الحياة المتوسطة.

29. أقدم الصخور التي عُثِرَ عليها في الأرض هي:

أ. صخور الشيسست المتكتشفة في وادي أبو برقه.  
ب. صخور الركizza المتكتشفة في الأردن.  
ج. صخور حزام الحجر الأخضر إيسوا غرب غرينلاند.  
د. صخور النايس شمال غرب كندا.

30. من استخدامات صخور الكاولين التابعة لحقبة الحياة القديمة:

أ. صناعة السيراميك.  
ب. إنتاج كربونات الكالسيوم.  
ج. صناعة الأسلاك.  
د. صناعة الصوف الصخري.